

Ένζυμα Εισαγωγή

1. Χαρακτηριστικά ενζύμων
2. Ταξινόμηση ενζύμων
3. Συνένζυμα

Χαρακτηριστικά ενζύμων

Βιολογικοί καταλύτες με εκπληκτική:

- i. Καταλυτική ισχύ**
- ii. Εξειδίκευση**
- iii. Δυνατότητα ρύθμισης της δράσης τους**

Η συντριπτική πλειοψηφία ενζύμων είναι πρωτεΐνες αλλά υπάρχουν και μόρια RNA με καταλυτική δράση (ριβοένζυμα)

Καταλυτική Ισχύς Ενζύμων

Τα ένζυμα επιταχύνουν εντυπωσιακά βιοχημικές αντιδράσεις που είναι εφικτές από θερμοδυναμικής άποψης ($\Delta G < 0$)


ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 Αύξηση ταχύτητας από επιλεγμένα ένζυμα.

Ένζυμο	Μη ενζυμική ημιζωή	Μη καταλυόμενη ταχύτητα (k_{un} , s^{-1})	Καταλυόμενη ταχύτητα (k_{cat} , s^{-1})	Αύξηση ταχύτητας (k_{cat}/k_{un})	
Αποκαρβοξυλάση της OMP	78.000.000	χρόνια	$2,8 \times 10^{-16}$	39	$1,4 \times 10^{17}$
Σταφυλοκοκκική νουκλεάση	130.000	χρόνια	$1,7 \times 10^{-13}$	95	$5,6 \times 10^{14}$
Νουκλεοζιτάση της AMP	69.000	χρόνια	$1,0 \times 10^{-11}$	60	$6,0 \times 10^{12}$
<u>Καρβοξυπεπτιδάση A</u>	<u>7,3</u>	<u>χρόνια</u>	$3,0 \times 10^{-9}$	<u>578</u>	$1,9 \times 10^{11}$
Ισομεράση των κετοστεροειδών	7	εβδομάδες	$1,7 \times 10^{-7}$	66.000	$3,9 \times 10^{11}$
Ισομεράση των φωσφορικών τριοζών	1,9	ημέρες	$4,3 \times 10^{-6}$	4.300	$1,0 \times 10^9$
Μουτάση του χορισμικού	7,4	ώρες	$2,6 \times 10^{-5}$	50	$1,9 \times 10^6$
<u>Ανθρακική ανυδράση</u>	<u>5</u>	<u>δευτερόλεπτα</u>	$1,3 \times 10^{-1}$	<u>1×10^6</u>	$7,7 \times 10^6$

Συντομογραφίες: OMP, μονοφωσφορική οροτιδίνη· AMP, μονοφωσφορική αδενοσίνη.

Πηγή: Κατά A. Radzicka and R. Wofenden. *Science* 267 (1995):90-93.

Η καταλυτική ισχύς των ενζύμων βασίζεται στην μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης (E_A) η οποία επιτυγχάνεται μέσω της σταθεροποίησης της κατάστασης μεταπτώσεως ES^{\ddagger}



Εξειδίκευση

Τα ένζυμα έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν στερεοϊσομερή
Το υπόστρωμα που αναγνωρίζεται με μεγάλη ειδικότητα από κάθε ένζυμο
είναι συνήθως μοναδικό και προσδένεται στο ενεργό κέντρο του ένζυμου

Δύο θεωρίες εξηγούν την ειδικότητα της πρόσδεσης των υποστρωμάτων στο ένζυμο

1. Κλειδαριά-κλειδί
2. Επαγόμενη εφαρμογή

Lock-and-Key



Induced-fit



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ


1. Οξειδοαναγώγασες

(αφυδρογονάσες,
οξειδάσες, υπεροξειδάσες,
αναγωγάσες)




2. Τρανσφεράσες

(αμινοτρανσφεράσες,
φωσφοτρανσφεράσες)




3. Υδρολάσες

(εστεράσες, πεπτιδάσες,
γλυκοσιδάσες)




4. Λυάσες




5. Ισομεράσες

(επιμεράσες, cis-trans
ισομεράσες)



6. Λιγάσες



Καταλύουν αντιδράσεις
οξείδωσης-αναγώγης

Καταλύουν τη **μεταφορά**
ομάδων που περιέχουν C, N, P

Καταλύουν τη **σχάση**
δεσμών με προσθήκη
νερού


Καταλύουν **σχάση/δημιουργία δεσμών, όπου**
προκύπτουν/εξαφανίζονται
διπλοί δεσμοί

Καταλύουν αντιδράσεις
ισομερισμού

Καταλύουν **τη δημιουργίας**
δεσμών μεταξύ C και O, S,
ή P με υδρόλυση φωσφορικών ομάδων υψηλής
ενέργειας

Συμπαράγοντες

Η καταλυτική δραστικότητα πολλών ενζύμων εξαρτάται από την παρουσία μικρών μορίων που ονομάζονται συμπαράγοντες. Ένα ένζυμο χωρίς τον συμπαράγοντά του καλείται αποένζυμο ενώ το πλήρως καταλυτικά ενεργό ένζυμο καλείται ολοένζυμο.



Συμπαράγοντες: μέταλλα -συνένζυμα –προσθετικές ομάδες

Οι συμπαράγοντες υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες:

- μέταλλα και**
- συνένζυμα (μικρά οργανικά μόρια)**

Τα συνένζυμα συχνά παράγονται από βιταμίνες και μπορεί να είναι είτε χαλαρά είτε σφιχτά προσδεμένα στο ένζυμο.

Τα χαλαρά προσδεμένα συνένζυμα απελευθερώνονται από το ένζυμο ακριβώς όπως τα υποστρώματα και τα προϊόντα.

Τα σφιχτά προσδεμένα (συνήθως με ομοιοπολικούς δεσμούς) συνένζυμα καλούνται προσθετικές ομάδες και δεν απελευθερώνονται από το ένζυμο.

Οι συμπαράγοντες προσφέρουν χημικές ομάδες και αντιδράσεις που δεν είναι διαθέσιμες στα αμινοξέα.

Πολύ συχνά εμπλέκονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις

Παραδείγματα Συμπαραγόντων

Συμπαράγοντας	Ένζυμο
Συνένζυμο	
Πυροφωσφορική θειαμίνη	Πυροσταφιλική αφυδρογονάση
Φλαβινο-αδενινο-νουκλεοτίδιο	Οξειδάση των μονοαμινών
Νικοτιναμίδο-αδενινο-νουκλεοτίδιο	Γαλακτική αφυδρογονάση
Φωσφορική πιεριδοξάλη	Φωσφορυλάση του γλυκογόνου
Συνένζυμο A (CoA)	Καρβοξυλάση του ακετυλο-CoA
Βιοτίνη	Πυροσταφιλική καρβοξυλάση
5'-Δεοξιαδενοσιλο-κοβαλαμίνη	Μουτάση του μεθυλομπλονικού
Τετραϋδροφυλλικό	Συνθάση του θυμιδυλικού
Μέταλλο	
Zn ²⁺	Ανθρακική ανυδράση
Zn ²⁺	Καρβοξυπεπτιδάση
Mg ²⁺	EcoRV
Mg ²⁺	Εξοκινάση
Ni ²⁺	Ουρεάση
Mo	Αναγωγάση του νιτρικού
Se	Υπεροξειδάση του γλουταθείου
Mn ²⁺	Δισμουτάση του σουπεροξειδίου
K ⁺	Καρβοξυλάση του προπιονυλο-CoA