

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ STRESS

ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”

Ιπποκράτης

Λήψη καλού και πλήρους ιατρικού ιστορικού

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι πιο συχνές νευρολογικές παθήσεις που απασχολούν τον Οδοντίατρο στην καθημερινή κλινική οδοντιατρική πράξη είναι οι κατωτέρω:

Άνοια

Σκλήρυνση κατά πλάκας

Νόσος του Parkinson

Επιληψία

Η πιο σοβαρή από αυτές που ως επείγουσα κατάσταση στο Οδοντιατρείο χρήζει της πιο ιδιαίτερης αντιμετώπισης είναι η Επιληψία.

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Στις αμέσως επόμενες διαφάνειες θα παρουσιαστούν και κυρίως θα συζητηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν στην επιληπτική κρίση, ενώ μετά θα γίνει αναφορά στην λιποθυμική προσβολή, που συχνά μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της αγχώδους κατάστασης και του stress, που πολλοί ευαίσθητοι ασθενείς βιώνουν στην αίθουσα αναμονής του Οδοντιατρείου και κυρίως κατά την διάρκεια της οδοντιατρικής εργασίας στην οδοντιατρική καρέκλα.

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Παρ' όλα, επειδή το νόημα της παρουσίασης είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών, ως επείγουσες καταστάσεις στο Οδοντιατρείο, ο αναγνώστης και κυρίως ο φοιτητής, προκειμένου να εμβαθύνει στην φιλοσοφία της αντιμετώπισης, στον τρόπο προσέγγισης του ασθενούς που χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης, στις ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο Οδοντίατρος, στην χρήση των κατάλληλων φαρμάκων και προκειμένου να είναι ολοκληρωμένο το παρόν μάθημα σε επίπεδο διδασκαλίας, παραπέμπεται συγχρόνως στην μελέτη του μαθήματος “ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Χρόνια εγκεφαλική βλάβη – επαναλαμβανόμενες κρίσεις λόγω υπερλειτουργίας εγκεφαλικών νευρώνων

Ιδιοπαθής και σπανιότερα λόγω συγκεκριμένης αιτίας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- ❖ **Εντοπισμένη κινητική κρίση:** κλονικοί σπασμοί ομάδας μυών
- ❖ **Επιληψία Petite Mal:** ξαφνική διακοπή κινήσεων και ομιλίας – απώλεια προσοχής
- ❖ Διάρκεια 5-10 sec
 - **Αντιμετώπιση:** Διακοπή συνεδρίας
 - Διερεύνηση ιστορικού
 - Επικοινωνία με θεράποντα Νευρολόγο

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

- ❖ **Επιληψία Grand Mal:** επιληπτική αύρα – ευερεθιστότητα – οσφρητικές – ακουστικές – οπτικές διαταραχές – απώλεια συνείδησης – τονικοί σπασμοί – κλονικοί σπασμοί – σημεία απόφραξης αναπνευστικής οδού – έμετος – ακράτεια ούρων και κοπράνων – σταδιακή επάνοδος
 - **Αντιμετώπιση:** Διακοπή συνεδρίας
 - Τοποθέτηση σε ύπτια θέση
 - Προσπάθεια προστασίας του ασθενούς από τραυματισμό – διατήρηση του αεραγωγού ανοικτού
- **Status Epilepticus:** Διάρκεια πάνω από 1 ώρα, χωρίς ανάκτηση συνείδησης
 - **Αντιμετώπιση:** Πλην των άλλων χορήγηση 5 mg διαζεπάμης iv

ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Η απλή λιποθυμία ή αγγειοκατασταλτική συγκοπή ορίζεται ως ξαφνική παροδική απώλεια της συνείδησης που εμφανίζεται δευτερογενώς μετά από παροδική ισχαιμία του εγκεφάλου σε υγιείς ασθενείς

ΑΙΤΙΑ: Άγχος, φόβος, πόνος, ακινησία σε όρθια θέση κλπ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Αίσθημα ζέστης και παλμών – ωχρότητα – εφίδρωση – υπόταση – ταχυκαρδία – ταχύπνοια – ναυτία – αδυναμία – ψυχρά άκρα – βραδυκαρδία - απώλεια συνείδησης – μπορεί να παρατηρηθούν τονικοί και κλονικοί σπασμοί.

ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Αγγειοπνευμονογαστρική κρίση ή παρασυμπαθητικοτονική κρίση ή αγγειοκατασταλτική συγκοπή (vasovagal syncope)

Από ορθοστατική υπόταση

Από μειωμένη καρδιακή παροχή

Από αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης

ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Συχνότερη σε νεαρούς άνδρες. Γιατί;

Πρόληψη: Άρση των προδιαθεσικών παραγόντων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Τοποθέτηση του ασθενούς σε ύπτια θέση