





**Δερματικοί μύες κεφαλής και προσώπου.
Αρτηρίες – Φλέβες- Λεμφική αποχέτευση**

**Σύνθεση: Μάρα Πιάγκου
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ



AESTHETIC FACIAL ANATOMY ESSENTIALS FOR INJECTIONS



EDITED BY


ALI PIRAYESH
DARIO BERTOSSI
IZOLDA HEYDENRYCH



Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head and Neck

Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck

Koichi Watanabe
Mohammadali M. Shoja
Marios Loukas
K. Shumei Tsuboi



Thieme

Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head and Neck 1st Edition
by Koichi Watanabe (Editor), Mohammadali M. Shoja (Editor), Marios Loukas (Editor)

Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck details the complex regional anatomy of the face, head and neck, providing plastic surgery and otolaryngology residents with a solid anatomical knowledge base. There are many danger zones involved in operating on the head and neck, and the detailed knowledge of anatomy that readers gain from this reference will help them avoid the surgical mishaps that often result in patient disfigurement.

Key Features:

Complex regional anatomy of the head and neck detailed with drawings, intraoperative photos and radiologic images

Online access to videos in which authors walk readers through the anatomy of the face, head and neck

Covers the latest anatomical topics, including arterial supply of the facial skin and sensory nerves of the head and neck

This excellent anatomical reference will be read cover to cover by young plastic surgeons and otolaryngologists, as well as residents in these specialties. More experienced surgeons will refer to it whenever they need to learn about an unfamiliar area of the head

To download pdf - click on the link under the video

The Face Pictorial Atlas of Clinical Anatomy

KVM



Second Edition

Ralf J. Radlanski
Karl H. Wesker

Quintessence Publishing Group

second edition





Surgical Anatomy of the Face

Wayne F. Larrabee, Jr.
Kathleen H. Makielski
Jennifer L. Henderson

Προτάσεις για μελέτη.....

περιοχή προσώπου ανατομικά είναι πολύ περίπλοκη


- Πύλες εισόδου αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος
- Έκκριση σάλιου και επεξεργασία της τροφής (παρωτιδικός αδένας-παρωτιδικός πόρος)
- αισθήσεις όρασης, ακοής, όσφρησης και γεύσης



BRANCHIAL STRUCTURES


(their myogenic material probably originate from the occipital myotomes):

- Muscles of the I. Branchial arch (V. trigeminus)
- Muscles of the II. Branchial arch (VII. facialis)
- Muscles of the III. Branchial arch (IX. X. XI., glossopharyngeus, vagus,



III. arch:

Cranial part: participate in forming of the laryngeal and pharyngeal muscles
Distal part: forming of the trapezius and sternocleidomastoid muscles



Ανωμαλίες διάπλασης

2 κύρια μέρη συνιστούν το πρόσωπο

4^η εμβρυική εβδομάδα σε έμβρυο μήκους 3mm

Μετωπορρινική απόφυση (μεσαίο τμήμα) και 2 πρώτα φαρυγγικά τόξα (γναθιαίο και υοειδές) πλάγια μέρη του προσώπου

άνω γναθιαία απόφυση ενώνεται έμμεσα με την παρεμβολή του κάτω τμήματος της μετωπορρινικής απόφυσης και σχηματίζεται το **άνω γναθιαίο τόξο**


Κάτω γναθιαία απόφυση ενώνεται με την αντίθετη στη μέση γραμμή και σχηματίζεται το **κάτω γναθιαίο τόξο**

Μεταξύ των 2 γναθιαίων τόξων περιλαμβάνεται η **στοματική σχισμή**

Από μετωπορρινική απόφυση: μετωπιαίο οστό, ηθμοειδές, ρινικά οστά, ύνιδα, χόνδρινο ρινικό διάφραγμα και κάλλαιο

Από μεσέγχυμα 1^{ου} φαρυγγικού τόξου: άνω γνάθοι, κάτω γνάθος, μασητήριοι μύες, η σφύρα, ο άκμονας, το τρίδυμο νεύρο, ο θύλακος του Rathke, το θυρεοειδές εκκόλπωμα, πρόσθιο τμήμα γλώσσας, χόνδρος του Meckel, πτερύγιο ωτός, κοιλότητα μέσου ωτός και ο σφηνογναθικός σύνδεσμος


Από μεσέγχυμα 2^{ου} φαρυγγικού τόξου : υοειδές οστό, αναβολέας, μύες υοειδούς, μιμικοί μύες, μυώδες πλάτυσμα, προσωπικό νεύρο, βελονοειδής απόφυση και ρίζα της γλώσσας



Ανωμαλίες διάπλασης

Σύνδρομο Crouzon

Σύνδρομο Pierre Robin



Γναθοπροσωπική δυσόστωση (σύνδρομο Treacher Collins), λοξές βλεφαρικές σχισμές, υποπλασία ζυγωματικών οστών, έλλειψη ζυγωματικών τόξων, ανωμαλίες μέσου ωτός, υποπλαστικοί κλάδοι και κόνδυλοι κάτω γνάθου

Κρανιοπροσωπική δυσόστωση (σύνδρομο Crouzon και Apert), πρώιμη σύγκλειση ραφών, βραχυκεφαλία και επιμήκυνση εγκεφαλικού κρανίου (πυργοκεφαλία), πρόπτωση οφθαλμικών βολβών, συνδακτυλία χεριών και ποδιών


Σχιιστίες προσώπου (χειλοσχιιστία, υπερωιοσχιιστία, λοξή σχισμή προσώπου)

Σύνδρομο 1^{ου} βραγχιακού τόξου (έλλειψη πτερυγίου ωτός, ακουστικών οσταρίων, κλάδου και του κονδύλου της κάτω γνάθου). Οφείλεται σε αιμάτωμα που πρόέρχεται από την αρχέγονη αρτηρία του αναβολέα


Η περιοχή του προσώπου ανατομικά είναι πολύ περίπλοκη
- λεπτοφυείς μιμικοί μύες






- Λεπτοί κλάδοι 7^{ης} εγκεφαλικής συζυγίας (προσωπικό νεύρο)



Διεγχειρητικά...








19.11.2008 10:04


Επιπολής και μέση στιβάδα των μυών του προσώπου

Μιμικοί ή δερματικοί μύες
(προσωπικό ν.)

Μασητήριοι μύες
(τρίδυμο ν.)
(Κροταφίτης, μασητήρας)



3. Procerus
4. Depressor supercilii
5. Orbicularis oculi
(superior lateral)
6. Orbicularis oculi (lateral)
7. Nasalis
8. Levator labii superioris
alaeque nasi
9. Levator labii superioris
10. Zygomaticus minor
11. Zygomaticus major
12. Orbicularis oris
13. Buccinator
14. Risorius
15. Masseter
16. Depressor anguli oris
17. Depressor labii inferioris
18. Platysma
19. Mentalis



Superficial

Deep




1. Frontalis m.
2. Temporalis m.
3. Corrugator supercilii m.
4. Procerus m.
5. Depressor supercilii m.
6. Orbicularis oculi m.
7. Nasalis m.

8. Levator labii superioris
alaeque nasi m.
9. Zygomaticus minor m.
10. Zygomaticus major m.
11. Orbicularis oris m.
12. Modiolus
13. Risorius m.

14. Platysma m.
15. Depressor anguli oris m.
16. Mentalis m.
17. Depressor labii inferioris m.
18. Masseter m.
19. Buccinator m.
20. Levator anguli oris m.
21. Levator labii superioris m.

The facial mimetic muscles are protected in deep plane facelift surgery because they are innervated from their inferior (under) surfaces. The exception is the buccinator, levator labii superioris, and the mentalis, which are the deepest lying muscles and are innervated on their outer surfaces.



Layer 1

1. Depressor anguli oris
2. Zygomaticus minor
3. Orbicularis oculi

Layer 2

4. Depressor labii inferioris
5. Risorius
6. Terminal platysma fibers
7. Zygomaticus major
8. Levator labii superioris alaeque nasi

Layer 3

9. Orbicularis oris
10. Levator labii superioris

Layer 4

11. Mentalis
12. Levator anguli oris
13. Buccinator



HAPPY



SAD



SURPRISED



ANGRY



DISGUSTED



FEARFUL



FEARFULLY ANGRY



FEARFULLY SURPRISED



FEARFULLY DISGUSTED





Frontalis



Orbicularis oris



Mentalis



Depressor anguli oris



Zygomaticus major



Risorius



Corrugator supercilii





Nasalis




Procerus

- αγγειοβρίθεια περιοχής





Αναστόμωση έσω και έξω καρωτίδας




Facial artery

Submental artery

- βοηθάει στην ταχεία επούλωση των τραυματισθέντων μαλακών μορίων και τη γρηγορότερη πώρωση των καταγμάτων των οστών του σπλαγχνικού κρανίου



Πυκνοβρίθεια ανατομικών στοιχείων





Επιπολής ανατομία



δέρμα προσώπου

- Λείο και ελαστικό παρακολουθεί τις κινήσεις των υποκείμενων μιμικών μυών
- Άριστη επουλωτική ικανότητα
- Λεπτή υφή δέρματος



δέρμα προσώπου

- χρώμα δέρματος πιο ροδαλό από του υπόλοιπου σώματος
- Δότεριες περιοχές μοσχευμάτων (οπισθοωτιαία και υπερκλείδια περιοχή)
- Σε απώλεια ολικού πάχους απαιτείται δερματικός κρημνός ολικού πάχους (δερματικός κρημνός και υποδόριος ιστός από άλλη περιοχή του προσώπου)
- Ποικιλία μικρών ελεύθερων ή αξονικών κρημνών









TABLE 41-1. Flaps in Head and Neck Reconstruction

Flap	Type	Vascular Supply	Sensory
Pectoralis major	Pedicled	Thoracoacromial a.	Insensate
Trapezius	Pedicled	Transverse cervical, dorsal scapular, occipital a., perforating branches of the paraspinous vasculature	Insensate
Sternocleidomastoid	Pedicled	Occipital, suprascapular, external carotid/superior thyroid a.	Insensate
Deltopectoral	Pedicled	Internal mammary a.	Insensate
Temporalis	Pedicled	Deep temporal a.	Insensate
Platysma	Pedicled	Facial a.	Insensate
Latissimus dorsi	Pedicled or free	Thoracodorsal a.	Long thoracic n.
Gastric pull-up	Pedicled	Right gastric and gastroepiploic a.	Insensate
Radial forearm	Free	Radial a.	Lateral antibrachial cutaneous n.
Lateral arm	Free	Posterior branch of the radial collateral a.	Inferior lateral brachial cutaneous n.
Lateral thigh	Free	Perforators of the profunda femoris a.	Lateral femoral cutaneous n.
Rectus abdominis	Free	Deep inferior epigastric a.	Insensate
Fibula	Free	Peroneal a.	Lateral sural cutaneous n., sural communicating n.
Iliac crest	Free	Deep circumflex iliac a.	Insensate
Scapula/parascapula	Free	Circumflex scapular a.	Insensate
Ileum	Free	Superior mesenteric a.	Insensate
Gastro-omental	Free	Right gastroepiploic a.	Insensate



Γραμμές ελαχίστης τάσης

- κατεύθυνση τομών και ατρακτοειδών εκτομών **να είναι παράλληλη προς τις γραμμές ελαχίστης τάσης**
- Οι γραμμές ελαχίστης τάσης συμπίπτουν με τις γραμμές έκφρασης του προσώπου και τις φυσιολογικές πτυχές
- Οι ουλές παράλληλα προς αυτές τις γραμμές της ελαχίστης τάσης είναι καλής ποιότητας και λιγότερο εμφανείς




Δερματικές κινητικές πτυχές (γραμμές του Langer)

Πτυχές δέρματος: υφαίες (ρινοχειλική, γενειοχειλική)

Κινητικές (λόγω των υποκείμενων μυών)- μυϊκές υπό ορθή γωνία προς τη φορά
ενέργειας μιμικών μυών





Kraissl's and
Langer's cleavage lines



ΚΡΗΜΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Μεσομετωπιαίος κρημνός (απώλειες στη μύτη- υπερτροχίλια, υπερκόγχια αρτηρία, πρόσθιος κλάδος επιπολής κροταφικής αρτηρίας)
2. Ρινοχειλικός κρημνός (μικροί κλάδοι προσωπικής και υποκόγχιας αρτηρίας, αποκατάσταση πτερυγίων ρινός)
3. Κρημνός του Abbe (από το κάτω χείλος σε υπερωιοσχιστίες- κάτω χειλικός κλάδος προσωπικής αρτηρίας)

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΤΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ
(σύγκλειση μικρών ελλειμμάτων)



A-B ΥΠΟΓΝΑΘΙΑ ΤΟΜΗ (κατάγματα κάτω γνάθου, εξαίρεση υπογναθίου αδένα- ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ)

A-E ΔΙΑΧΕΙΛΙΚΗ ΤΟΜΗ (προσπέλαση εδάφους στόματος)


G-J ΠΛΑΓΙΑ ΡΙΝΟΤΟΜΙΑ (προσπέλαση έξω επιφάνειας ρινός και σύστοιχης ρινικής θαλάμης)

J-L ΤΟΜΗ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (2mm κάτω από το χείλος του κάτω βλεφάρου-προσπέλαση εδάφους οφθαλμικού κόγχου)

F-L ΤΟΜΗ WEBER-FERGUSON (προσπέλαση άνω γνάθου-ημιγναθεκτομή)

M-N ΠΡΟΩΤΙΑΙΑ ΤΟΜΗ (προσπέλαση ΚΓΔ σε επεμβάσεις για αγκύλωση ή σε ενδοαρθρικές βλάβες)







M-Q ΑΜΦΙΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ (για υψηλή οστεοτομία άνω γνάθου – LeFort III)




Recipient Pre-Transplant

Recipient Post-Transplant






A



B



C



D



E



F









**First face transplant patient,
Isabelle Dinoire, dies at 49 (2016)**





Υποδόριος ιστός και λίπος προσώπου


- Λίγο υποδόριο λίπος και άφθονα αγγεία - ροδόχρουν χρώμα
- Στρογγυλότητα παρειάς-λιπώδης σφαίρα Bichat (εξωτερική επιφάνεια βυκανητού, στη γωνία μεταξύ αυτού και του προσθίου χείλους του μασητήρα) με επέκταση προς τα άνω στην κροταφική χώρα
- Τάση πρόπτωσης λιπώδους σφαίρας διαμέσου των ενδοστοματικών τομών ή θλαστικών τραυμάτων της παρειάς με διάσχιση του βυκανητού




Λιπώδης σφαίρα Bichat




Υποδόριο λίπος προσώπου σε διάφορα ανατομικά διαμερίσματα




1. Rohrich RJ & Pessa JE. *Plast Reconstr Surg* 2007;119:2219–27. 2. Alghoul M & Codner MA. *Aesthet Surg J* 2013;33(6):769–82.






Τα μαξιλαράκια λίπους βρίσκονται υποδερμάτια και βοηθούν στον όγκο, την πληρότητα του προσώπου και στο περίγραμμά του. Καθώς γερνάμε, το λίπος λεπταίνει και κατέρχεται, με αποτέλεσμα το πρόσωπο να χάνει τη στρογγυλότητά του και να σχηματίζονται «σακούλες» κάτω από τα μάτια.




Fat Pads

by Adan Antaloczy

Fat pads are a significant contributor to form in the aging or overweigh face. In a youthful face, the pads are smooth and almost a continuous layer. As we age some pads loose fat, such as the forehead (not shown) and cheeks, while others gain fat and sag, like those around the mouth and jaw. In addition these compartments tend to become farther apart and appear as separate structures.



I have left out several fat pads, mainly in the forehead because they are thin and do not contribute to the overall form of the face.




Retaining Ligaments


A highly organized and consistent three-dimensional connective tissue framework supports the overlying skin and soft tissues.



The retaining ligaments of the face can be likened to a tree. The ligaments attach the soft tissues to the facial skeleton or deep muscle fascia, passing through all five layers of the soft tissues. It fans out in a series of branches and inserts into the dermis. At different levels of dissection, it is given different names, such as the retinacular cutis in the subcutaneous layer and ligaments in the subSMAS level .




The regional nerves and vessels display constant and Predictable relationships with both the fascial planes and their ligamentous attachments.



* The main retaining ligaments that may require division for mobilization of the face during a face-lift .

These must be released for mobilization of the brow and periorbital tissues as part of upper facial rejuvenation procedures such as brow lift and blepharoplasty.



Regions of the face

- ❑ The **mobile anterior face** is adapted for facial expressions
- ❑ the relatively **fixed lateral face** (shaded), which overlies masticatory structures.


separated by

A vertical line of retaining ligaments (red) from above:

temporal, lateral orbital, zygomatic, masseteric, and mandibular ligaments.


In **the anterior face**, **the mid-cheek** is split obliquely into two separate functional parts by the mid-cheek groove (dotted line) related to two cavities:

1. the **periorbital part** above (blue)
2. the **perioral part** below (yellow).



Επιπολής μυϊκή στιβάδα (δερματικοί ή μιμικοί μύες)

Λεπτοφυείς και ευκίνητοι μιμικοί μύες βρίσκονται κάτω από το χόριο του δέρματος στο οποίο καταφύονται




Επιπολής μυϊκή στιβάδα

(δερματικοί ή
μιμικοί μύες)

σφιγκτήρες γύρω από
βλεφαρική σχισμή

μυκτήρες μύτης
(σφιγκτήρας
βλεφάρων, στόματος
και ρινικός μυς)

διαστολείς σχισμών
(ανευρύνων τη ρίνα
μυς, κυνικός ή
ανελκτήρας της
γωνίας του στόματος)



ΜΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ



3D plexiform
net of
collagenous
and muscular
fibers
containing fat
cells


SMAS type


I - thin septal
layer containing fat
lobules

SMAS type

II - deep located
with intermingling
muscular and
collagenous fibers

SMAS superficial (subcutaneous) musculoaponeurotic system








ΜΕΤΩΠΟΪΝΙΑΚΟΣ Ή ΕΠΙΚΡΑΝΙΟΣ ΜΥΣ


ΙΝΙΑΚΗ ΓΑΣΤΕΡΑ- ΑΝΩ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ- ΟΠΙΣΘΙΟ ΧΕΙΛΟΣ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ- ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΩΤΙΑΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΣΘΙΟ ΧΕΙΛΟΣ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ ΜΥΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΔΕΡΜΑ ΜΕΣΟΦΡΥΟΥ ΚΑΙ ΦΡΥΔΙΩΝ- ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ



SCALP






SENSORY NERVES

VESSELS



Leží v subaponeurotickém prostoru



Venae are opened into
v.jugularis ext., v.
supraorbitalis, v.
occipitalis

Arteriae are come
from the aa.
supraorbitales,
superficiales
temporales,
auriculares
posteriores, occipitales

Nerveas are branches
of the cervical
segments V₁, V₂




ΚΡΟΤΑΦΟΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΥΣ


ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ-ΠΛΑΓΙΟ ΧΕΙΛΟΣ ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ

ΑΝΥΨΩΝΕΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ-ΔΙΑΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ


ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ



**ΠΡΟΣΘΙΟΣ, ΑΝΩ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΣ
ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ-
ΤΕΛΙΚΑ, ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΥΤΙΟΥ, ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΥΤΙΟΥ
ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΩΤΙΑΙΟΣ**



Orbicularis oculi



Orbicularis oculi muscle forms a broad ring-like muscular layer around the eyes, spreading downwards on the cheeks. The area of the muscle that occupies the eyelids is called the palpebral portion. The area covering the entire eye socket is known as the orbital portion.

The orbicularis oculi muscle closes the eyes and spreads tears over the cornea. The palpebral portion closes the eyelids gently, but when more force is required, when closing the eyes tightly and squinting, the orbital portion is also engaged. Contraction of the orbicularis oculi muscle causes lines around the eyes.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΚΟΓΧΙΚΗ ΜΟΙΡΑ-ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΟΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΝΑΘΙΑΙΟ ΧΕΙΛΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ- ΧΕΙΛΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ- ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ – ΞΕΝΤΟΝΑ ΣΥΓΚΛΕΙΕΙ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
 ΒΛΕΦΑΡΙΚΗ ΜΟΙΡΑ- ΞΕΝΤΟΝ ΒΛΕΦΑΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΞΕΝΤΟΝ ΒΛΕΦΑΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ)-ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ- ΑΠΑΛΑ ΣΥΓΚΛΕΙΕΙ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
 ΔΑΚΡΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ-ΔΑΚΡΥΪΚΟ ΟΣΤΟ-ΞΕΝΤΟΝ ΒΛΕΦΑΡΙΚΗ ΡΑΦΗ-ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ-ΕΚΚΡΙΣΗ ΔΑΚΡΥΩΝ







FIG. 119. — Muscle orbiculaire des paupières. Œil gauche








ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΔΕΡΜΑ ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ



Ανελκτήρας άνω βλεφάρου



Ανελκτήρας άνω βλεφάρου






A) **Corrugator supercilii muscle** (frowning muscle) pulls the eyebrows together and makes vertical skinfolds and lines between the eyebrows. It lies deep to the procerus and frontalis muscles.

B) **Depressor supercilii muscle** works with the corrugator supercilii muscle, pulling the eyebrows together downwards. It is located just below corrugator muscle.






ΕΠΙΣΚΥΝΙΟΣ ΜΥΣ
ΈΣΩ ΠΕΡΑΣ ΥΠΕΡΟΦΡΥΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΥΠΟ
ΤΗΝ ΚΟΓΧΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
ΒΛΕΦΑΡΩΝ
ΔΕΡΜΑ ΈΣΩ ΜΟΙΡΑΣ ΦΡΥΔΙΟΥ
ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΥ









**ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ
ΡΑΧΗ ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ- ΔΕΡΜΑ ΜΕΣΟΦΡΥΟΥ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΥ**






**ΡΙΝΙΚΟΣ ΜΥΣ
ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ- ΠΕΡΙΚΑΜΠΤΕΙ
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΗ ΡΑΧΗ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΥΚΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΙΝΟΗ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΥ**






© Dr. Joe Muscolino (www.learnmuscles.com)
art by Giovanni Rimasti

**ΚΑΘΕΛΚΤΗΡΑΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΜΙΚΟ ΒΟΘΡΙΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ- ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΥΚΤΗΡΩΝ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ**



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΎΕΩ ΔΕΣΜΗ-ΦΑΤΝΙΑΚΟ ΧΕΙΛΟΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΎΕΩ ΔΕΣΜΗ-ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
ΚΑΤΩ ΜΟΙΡΑ- ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΥΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΙΣΜΗΣ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ



Orbicularis oris muscle consists of many layers of muscle fibres surrounding the mouth and creates the basic structure of the lips. Many of its fibres are connected with the fibres of other facial **muscles** such as the buccinator muscle and the other **muscles** at the corner of the mouth. This complex arrangement makes possible the varied movements of the lips such as closing or pressing the lips together, protruding them forward in a 'kissing' action and all the precise changes of the shape of the mouth needed in pronunciation.

- **Protracts the lips**


- If the orbicularis oris were to concentrically contract and shorten, what would happen to the overall length of the muscle fibers?
 - *They would decrease in length.*
- If the shorter muscle fibers were to create a circle, would they create a larger or a smaller circle?
 - *They would create a smaller circle.*
- What would happen to the mouth if the orbicularis oris concentrically contracted and shortened?
 - *The mouth would close if it were open, and, as the muscle continued to contract, the lips would protract.*



levator labii superioris



levator labii superioris
alaeque nasi



Copyright © 2018 Exoncus, Inc. All Rights Reserved www.anatomynext.com

Levator labii
superioris

Orbicularis
oris



Medial slip

Lateral slip

Levator labii
superioris
alaeque nasi

© Dr. Joe Muscolino (www.learnmuscles.com)

art by Giovanni Rimasti

ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ (ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ-ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΡΙΝΟΣ


ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΑΠΟΦΥΣΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΟΣΤΟ- ΜΕΙΖΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΙΑΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

ΥΠΟΚΟΓΧΙΑ ΜΟΙΡΑ

ΥΠΟΚΟΓΧΙΟ ΧΕΙΛΟΣ-ΜΥΕΣ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ




Levator labii superioris muscle is inserted into the skin of the upper lip. It elevates the upper lip and rolls the upper lip outward.




Levator labii superioris alaeque nasi muscle is attached to the upper lip and to the lateral part of the nostrils. It elevates the upper lip and aids in dilation of the nostrils.

ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ
(ΚΥΝΙΚΟΣ ΜΥΣ)
ΚΥΝΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΛΚΕΙ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΥ





Levator anguli oris muscle is inserted into the corner of the mouth and pulls it upward.
It is positioned beneath the levator labii superioris and zygomaticus major **muscles**.





Muscolino (www.learnmuscles.com)
art by Giovanni Rimasti

ΜΕΙΖΩΝ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΥΣ
ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΟΣΤΟ-ΓΩΝΙΑ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛΚΕΙ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΑΝΩ ΚΑΙ ΎΕΩ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ




© Dr. Joe Muscolino (www.learnmuscles.com)
art by Giovanni Rimasti





A) Zygomaticus major muscle

B) Zygomaticus minor muscle

These **muscles** receive their names from the bone they are attached to, the zygomatic bone (cheekbone), and are used for smiling and laughing. Zygomaticus major runs into the corner of the mouth and zygomaticus minor into the upper lip. Zygomaticus major is longer and thicker than zygomaticus minor.





A) Zygomaticus major muscle


B) Zygomaticus minor muscle

These **muscles** receive their names from the bone they are attached to, the zygomatic bone (cheekbone), and are used for smiling and laughing. Zygomaticus major runs into the corner of the mouth and zygomaticus minor into the upper lip. Zygomaticus major is longer and thicker than zygomaticus minor.

ΕΛΑΣΣΩΝ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΥΣ (ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ)

ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΟΣΤΟ- ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ ΕΠΙ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΤΗΡΑ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ

**ΕΛΚΕΙ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΎΞΩ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ**



A) Buccinator muscle is situated deep and makes up the inner wall of the cheek. It pulls the corners of the mouth sideways and compresses the cheek against the molar teeth. The buccinator muscle is also employed in blowing, hence its name 'the trumpet muscle'.

B) Risorius muscle pulls the corners of the mouth sideways. The risorius muscle can produce dimples in some individuals.




Risorius

Orbicularis
oris


ΓΕΛΑΣΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΣΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ-
ΔΕΡΜΑ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΈΛΚΕΙ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΞΕΩ (ΧΑΜΟΓΕΛΟ)
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

© Dr. Joe Muscolino (www.learnmuscles.com)


art by Giovanni Rimasti



Depressor labii inferioris muscle is a quadrangular-shaped muscle. It depresses the lower lip and protrudes it, as in pouting.




ΚΑΘΕΛΚΤΗΡΑΣ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΤΡΗΜΑΤΟΣ)
ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
ΏΛΚΕΙ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΎΞΩ
ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ




Depressor anguli oris muscle is a triangular- draws it downward. Contraction of the depre

ΚΑΘΕΛΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΛΟΞΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΩ
ΓΝΑΘΟΥ-ΓΩΝΙΑ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΕΛΚΕΙ ΓΩΝΙΑ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ




© Dr. Joe Muscolino (www.learnmuscles.com)

art by Giovanni Rimasti




Mentalis muscle (chin muscle) is inserted into the skin on the of the chin upwards, causes a transverse line in the chin and w when a person is about to cry.


ΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
ΚΥΝΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ-
ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΕΙΟΥ
ΑΝΥΨΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΑΤΩ
ΧΕΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΥ




Regio labialis et mentalis

Lip Chin





© Dr. Joe Muscolino (www.learnmuscles.com)
art by Giovanni Rimasti




C: Buccinator

ΒΥΚΑΝΗΤΗΣ ΜΥΣ

ΈΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ-ΕΝ ΤΩ
ΒΑΘΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΥΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ
ΒΥΚΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

ΜΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ


(πλάγια άποψη Ι και ΙΙ)




**Μέση στιβάδα
μιμικών μυών**

ΜΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

(πλάγια άποψη III και IV)




**Εν τω βάθει στιβάδα
Μασητήρας
Κροταφίτης**






**Εν τω βάθει στιβάδα
Αφαίρεση του κλάδου
της κάτω γνάθου.**


**ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ-ΚΟΡΩΝΟΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΦΥΣΗ, ΠΡΟΣΘΙΟ ΧΕΙΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΚΡΟΤΑΦΙΚΑ ΝΕΥΡΑ**





Κροταφίτης










**ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΣΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ,
ΈΣΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ-
ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ,
ΈΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΡΩΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΜΑΣΗΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟ**




Μασητήρας




M. masseter






Ἐξω πτερυγοειδής

ἈΝΩ ΚΕΦΑΛΗ-ἙΞΩ
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ
 ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΗ-ἙΞΩ
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ἙΞΩ ΠΕΤΑΛΟΥ
 ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ
 ΚΟΝΔΥΛΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ-
 ΚΓΔ
 ἙΞΩ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΕΣ ΝΕΥΡΟ






Articulatio temporo- mandibularis

ATM lat.
TM , TMJ engl.

Morphological findings:



- The great variability of all the articular structures
- The absence of hyaline cartilage
- The two separate compartments, allowing a wider range of mandibular movements
- The marked weakness of the articular ligaments, allowing hypertranslation and dislocation without tearing the capsule

Temporomandibular (craniomandibular) joint



Compound joint


Similar to hinge joint type


A**B**

© Dr.N.Mugunthan

Έξω πτερυγοειδής μυς


- Ο μυς προσφύεται στον αυχένα του κονδύλου και στον αρθρικό θύλακο και τον διάρθριο δίσκο, ώστε και οι δύο να μπορούν να κινούνται συγχρόνως
- Η προς τα πίσω επιστροφή του διάρθριου δίσκου είναι εφικτή λόγω της ελαστικότητας του διπέταλου ινοελαστικού οπισθίου χαλινού του διάρθριου δίσκου
- σύνδεσμοι ΚΓΔ (έξω πλάγιος ή κροταφογναθικός) είναι χαλαροί, ώστε ο κόνδυλος μπορεί να μετατοπίζεται προς τα μπροστά και πέρα από το πρόσθιο χείλος του αρθρικού φύματος και ακινητοποιείται προσωρινά σε αυτή τη θέση






ΎΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΎΞΩ
 ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΟΥΣ
 ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ,
 ΥΠΕΡΩΙΟ ΟΣΤΟ, ΓΝΑΘΙΑΙΟ
 ΚΥΡΤΩΜΑ- ΎΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
 ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ
 ΓΝΑΘΟΥ
 ΎΞΩ ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΕΣ ΝΕΥΡΟ



ΎΞω πτερυγοειδής



Επιπολής ή υποδόρια περιτονία

- Λεπτότατο στρώμα υποδόριου ιστού καλύπτει τους μιμικούς μυς
- στο μεγαλύτερο μέρος του προσώπου δεν υπάρχει εν τω βάθει περιτονία
- Στην υποδόρια περιτονία πορεύονται οι λεπτοί κλάδοι του προσωπικού νεύρου
- Στις ανορθωτικές επεμβάσεις προσώπου είναι δυνατός ο αμβλύς διαχωρισμός του δέρματος από την υποδόρια περιτονία χωρίς να υποστούν βλάβη οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου (μέσω πρωτυαίας τομής στην πρωτυαία πτυχή που επεκτείνεται στο τριχωτό κεφαλής και έλξη προς τα άνω χαλαρού δέρματος του προσώπου που έχει αποκολληθεί)







Facial Anatomy Layers

1. Skin (epidermis and dermis) layer
2. Superficial fat (subcutaneous) layer
3. SMAS (superficial musculoaponeurotic system)
4. Retaining ligaments and spaces
5. Deep fat layer (absent on the forehead)
6. Periosteum, deep fascia
7. Bones

Copyright © 2017 MAIPS







1: Layers of the face: Skin (blue), Superficial Fatty Layer (green), SMAS (yellow), Deep Areolar Tissue Layer (red), Deep Facial Fascia (red)




Εν τω βάθει περιτονία


- Εν τω βάθει περιτονία υπάρχει άνωθεν της παρωτίδας (παρωτιδική περιτονία) και άνωθεν του βυκανητού μυός (βυκανητο-φαρυγγική περιτονία)



Posteriorly, the pretracheal layer is referred to as the **buccopharyngeal fascia** (a fascia enclosing the pharynx, superior continuation of the fascia covering the buccinator muscle) and separates the pharynx and the esophagus from the prevertebral layer.



Pretracheal/ Buccopharyngeal fascia




- Continuous with the buccopharyngeal fascia

- Blends laterally with carotid sheaths but does not contain them



- Inferiorly blends with fibrous pericardium

 Buccopharyngeal fascia




Νεύρωση μιμικών μυών

- Κινητική νεύρωση μιμικών μυών από κλάδους του προσωπικού νεύρου (VII)
- Διατομή ή τρώση κάποιου κλάδου-δυσμορφία από παράλυση αντιστοιχών μυών
- Εξαίρεση: 2 βυκανητικοί κλάδοι (άνω και κάτω)
- Άμεση συρραφή στο επινεύριο με nylon 10/0, ενώ σε διακοπή συνέχειας του νεύρου πρέπει να επιχειρηθεί νευρική μεταμόσχευση
- Σε θλαστικό τραύμα, εντόπιση λεπτών κλάδων νεύρου με νευροδιεγέρτη τις πρώτες 36 ώρες (εντόπιση περιφερικού κολοβώματος)





Παρωτίδα και προσωπικό νεύρο





Εν τω βάθει μοίρα παρωτίδας




- προσεκβολή μεταξύ ΣΚΜ και οπίσθιας γαστέρας διγάστορα, όπισθεν του έσω πτερυγοειδούς και έμπροσθεν του κλάδου της κάτω γνάθου
- Έρχεται σε σχέση με βελονοειδή απόφυση και τους εκφυόμενους από αυτή μύες, οι οποίοι τη χωρίζουν από τον άνω σφιγκτήρα του φάρυγγα
- Όγκος εν τω βάθει λοβού: προβολή στον στοματοφάρυγγα, ασυμμετρία μαλθακής υπερώας και παρεκτόπιση αμυγδαλής προς τα έσω



Σχέσεις παρωτίδας και προσωπικού νεύρου



- Το προσωπικό νεύρο και το ενδοπαρωτιδικό πλέγμα του υποδιαιρούν χειρουργικά το παρέγχυμα της παρωτίδας σε **επιπολής λοβό** (μεγαλύτερος) και **εν τω βάθει λοβό** (μικρότερος)
- Το παρωτιδικό αδενικό παρέγχυμα περιβάλλει το προσωπικό νεύρο






προσωπικό V.



Ανάδυση III-ΧΙΙΙ από στέλεχος εγκεφάλου



ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΝΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΝΙΟ έσω ακουστικός πόρος - πόρος προσωπικού (Fallopian) - βελονομαστοειδές τρήμα




Έσω ακουστικός πόρος:
λαβυρινθική αρτηρία και φλέβα
Προσωπικό νεύρο (VII)
Στατικοακουστικό νεύρο
(κοχλιακό και αιθουσαίο) (VIII)




MAKING ENT EASY WITH YOUR OWN HANDS
 DR.D.VIJAYAGOVINDARAJAN,
 VELLORE,TAMILNADU,INDIA.
 +91 9894953959


YOUR RIGHT INTERNAL ACOUSTIC MEATUS(I.A.M.)
INTERNAL AUDITORY CANAL(I.A.C.)






Το προσωπικό νεύρο εισέρχεται σε ιδιαίτερο σωλήνα στο λιθοειδές οστό (πόρος Fallopius)




Ενδοκρανιακή πορεία
Διέλευση από τον πόρο του προσωπικού
Έξοδος από βελονομαστοειδές τρήμα



Οπίσθια δεξιά άποψη




**Καμπές του πόρου- 3 μοίρες:
οβελιαία, εγκάρσια και κατιούσα
Μεταξύ οβελιαίας και εγκάρσιας
μοίρας- αγκύλη- έξω γόνυ του
προσωπικού**



Πορεία και κλάδοι του Προσωπικού νεύρου



- **μετά την έξοδό του από το τρήμα όλοι οι κλάδοι κινητικοί**
- **Οπίσθιο ωτιαίο νεύρο** (ινιακή μοίρα του μετωποϊνιακού μυός & τον οπίσθιο ωτιαίο μυ)





Κλάδοι του προσωπικού νεύρου

Μέσα στον πόρο του προσωπικού νεύρου



2 αισθητικά νεύρα: μείζον επιπολής λιθοειδές & η χορδή του τυμπάνου




το μείζον επιπολής λιθοειδές πορεύεται στην αύλακα του μείζονος επιπολής λιθοειδούς, υπό τη σκληρά μήνιγγα μέχρι το πρόσθιο ρηγματώδες τρήμα όπου και αναστομώνεται με το εν τω βάθει λιθοειδές νεύρο (καρωτιδικό πλέγμα συμπαθητικού) και σχηματίζουν το νεύρο του πτερυγοειδούς πόρου (βιδιανό νεύρο) που εισέρχεται στο σφηνοϋπερώιο γάγγλιο.



- Το προσωπικό νεύρο μόλις εξέλθει από το βελονομαστοειδές τρήμα φέρεται προς τα πρόσω



Έξοδος VII: βελονομαστοειδές τρήμα
Βελονομαστοειδής κλάδος οπίσθιας ωτιαίας αρτηρίας



Νεύρωση από το προσωπικό νεύρο

❖ κινητική νεύρωση

- στον μυ του αναβολέα,
- στο βελονοϋοειδή και την οπίσθια γαστέρα του διγάστορος μυός
- στους μιμικούς μυς προσώπου.

Νεύρωση από το προσωπικό νεύρο



αισθητική νεύρωση
σε έξω ακουστικό πόρο και πτερύγιο
του ωτός

Νεύρωση από το προσωπικό νεύρο

❖ παρασυμπαθητική νεύρωση,



✓ Από τον δακρυορρινικό πυρήνα μέσω μείζονος λιθοειδούς ν., πτερυγοειδούς ν., σφηνοϋπερωίου γαγγλίου, στον δακρυικό αδένα και,

✓ Από άνω σιαλικό πυρήνα, μέσω της χορδής του τυμπάνου, υπογναθίου γαγγλίου, σε υπογνάθιο και υπογλώσσιο αδένα.

Νεύρωση από το προσωπικό νεύρο

❖ αισθητηριακή νεύρωση
γευστικές ίνες, μέσω της χορδής του
τυμπάνου (γλωσσικού ν. V3) από τα δύο
πρόσθια τριτημόρια της γλώσσας








- ✓ Το νεύρο πλησιάζει την οπίσθια & έσω επιφάνεια της παρωτίδας και πριν εισέλθει στον αδένα διαιρείται:
- ✓ σε άνω στέλεχος- ΚΡΟΤΑΦΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ✓ σε κάτω στέλεχος – ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναστόμωση κλάδων μέσα στο παρωτιδικό παρέγχυμα

- 5 κύριοι κλάδοι αναδύονται «**δίκην χηνείου ποδός**»
 - Κροταφικοί κλάδοι
 - Ζυγωματικοί κλάδοι
 - Βυκανητικοί κλάδοι
 - Επιχείλιος κάτω γνάθου
 - Τραχηλικός κλάδος




Παράλυση του προσωπικού νεύρου
Επώδυνη Υπερακουστία λόγω
παράλυσης του μυός του αναβολέα



Ολική περιφερική παράλυση
(τύπου Bell)
του αριστερού προσωπικού
νεύρου



**ΝΕΥΡΑ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Από το
Τρίδυμο**







Figure 1. Distribution of the cranial nerve V: the ophthalmic nerve (V₁), the maxillary nerve (V₂), and the mandibular nerve (V₃).

Δερματικά αισθητικά νεύρα με κλινική σημασία



**Από V2
Υποκόγχιο**


**Από V1
Υπερκόγχιο**

**Από V3
Γενειακό**

Προσβάλλονται από τον οξύ παροξυσμικό πόνο
της νευραλγίας του τριδύμου
που προκαλείται με την πίεση σε ζώνες διέγερσης
του δέρματος του προσώπου

Θεραπεία με αναισθητικό αποκλεισμό τους (τοπική διήθηση αλκοόλης) ή κρυοχειρουργική

Δερματικά αισθητικά νεύρα του προσώπου



Από V2

**Ζυγωματοκροταφικό
Ζυγωματοπροσωπικό
Υποκόγχιο**

Από V3

**Βυκανητικό
Ωτοκροταφικό
Γενειακό**


Από V1

**Υπερτροχίλιο
Υπερκόγχιο
Δακρυϊκό
Υποτροχίλιο
Έξω ρινικά**

**Από το αυχενικό πλέγμα
Το μείζον ωτιαίο
(A2 και A3)**



Το ωτοκροταφικό νεύρο

- Αναδύεται από το άνω χείλος της παρωτίδας
- Διανέμεται στο δέρμα της κροταφικής χώρας
- Τραυματισμός του γύρω από τον αυχένα του κονδύλου της κάτω γνάθου ή εντός της παρωτίδας κατά την παρωτιδεκτομή προκαλεί το σύνδρομο της γευστικής υπεριδρωσίας (σύνδρομο Frey)





Σύνδρομο Frey και ωτοκροταφικό νεύρο


- κατά την παρωτιδεκτομή προκαλεί το σύνδρομο της γευστικής υπεριδρωσίας (σύνδρομο Frey)
- Αυτό συμβαίνει γιατί οι προοριζόμενες για την παρωτίδα εκκριτικοκινητικές ίνες εκτρέπονται από την πορεία τους και φέρονται και νευρώνουν ιδρωτοποιούς αδένες παρακείμενων δερματικών περιοχών
- Τυμπανική νευρεκτομή- διατομή εκκριτικοκινητικών ινών για την παρωτίδα διατέμνονται επί του ακρωτηρίου του μέσου ωτός




το τρίδυμο νεύρο και οι αισθητικοί κλάδοι του



το οφθαλμικό v. (V1) και οι κλάδοι του




το οφθαλμικό ν. (V1) και οι κλάδοι του



Χορηγεί αισθητικούς κλάδους:

- στο βολβό και κερατοειδή, με τα ακτινοειδή νεύρα -αντανακλαστικό κερατοειδούς
- στους κόλπους μετωπιαίο, σφηνοειδή και ηθμοειδείς κυψέλες με το υπερκόγχιο και τα ηθμοειδή νεύρα
- στο δέρμα και τον επιπεφυκότα άνω βλεφάρου και δέρμα και βλεννογόνο μύτης




MAXILLARY NERVE


Trigeminal nerve

Trigeminal ganglion



Purely sensory



το άνω γναθικό ν. (V2) και οι κλάδοι του




το άνω γναθικό ν. (V2) και οι κλάδοι του




Χορηγεί αισθητικούς κλάδους:

- στα δόντια και ούλα άνω γνάθου
- στο δέρμα και επιπεφυκότα κάτω βλεφάρου, δέρμα υποκόγχιας χώρας και πλάγιου μύτης, πρόδομο μύτης, άνω χείλος
- δια του σφηνοϋπερωίου γαγγλίου στο βλεννοπερίοστεο μύτης, υπερώας και οροφής φάρυγγα
- στους κόλπους σφηνοειδή, γναθιαίο και ηθμοειδείς κυψέλες
- δακρυοεκκριτικές ίνες, μέσω σφηνοϋπερωίου γαγγλίου, ζυγωματικού ν.-δακρυικού ν.

το κάτω γναθικό ν. (V3) και οι κλάδοι του





ΤΟ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΙΚΟ Ν. (V3) ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ




Το κάτω γναθικό χορηγεί:

- κινητικούς κλάδους για τους μασητήριους μύς, τον τείνοντα το τύμπανο, τον διατείνοντα την υπερώα, το γναθοϋοειδή και την πρόσθια γαστέρα του διγαστέρα.
- αισθητικούς κλάδους στα δόντια και τα ούλα της κάτω γνάθου, για το δέρμα της γενειακής και ωτοκροταφικής χώρας, της παρείας και του βλεννογόνου της, πτερύγιο αυτιού, έξω ακουστικό πόρο και έξω επιφάνεια τυμπάνου και για τα δύο πρόσθια τριτημόρια της γλώσσας (καθώς και γευστικές ίνες, μέσω της χορδής του τυμπάνου)
- παρασυμπαθητικές ίνες από το ωτικό γάγγλιο στην παρωτίδα



ΝΕΥΡΑ υπογνάθιας χώρας



Υπογλώσσιο ν., που χορηγεί θυρεοϋοειδές ν. και γενειοϋοειδές ν.


Γναθοϋοειδές από κάτω φατνιακό


Γλωσσοφαρυγγικό ν.

Λείπουν επιχείλιος κάτω γνάθου και τραχηλικός κλ. του προσωπικού


Λοιπά στοιχεία : γλωσσικό ν. βελονοϋοειδής συνδ.

- Το υπογλώσσιο ν. επί της έξω καρωτίδας χορηγεί την άνω ρίζα αυχενικής αγκύλης. Μετά, υπό την οπίσθια γαστέρα του διγαστρος, επί του υογλωσσικού και μετά μεταξύ υογλωσσικού και γναθοϋοειδούς
- Το γλωσσοφαρυγγικό ν. επί του βελονοφαρυγγικού, μετά επί τα εντός του υογλωσσικού μ.
- Το γναθοϋοειδές ν. επί του γναθοϋοειδούς





ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ







Fig.1 The arterial blood supply to the face is provided by two sources: the external carotid artery (ECA, red area) and the internal carotid artery (ICA, pink area)

Εξω καρωτίδας - Έσω καρωτίδας



Από την έξω καρωτίδα
- προσώπική
- επιπολής κροταφική
- έσω γναθιαία
Από την έσω καρωτίδα
- υπερκόγχια και μετωπιαία

ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ





Fig.2 Arteries with branches to the face (in red originating from the external carotid artery, in pink originating from the internal carotid artery): 1 = common carotid a.; 2 = external carotid a.; 3 = internal carotid a.; 4 = facial a.; 5 = submental a.; 6 = inferior labial a.; 7 = superior labial a.; 8 = lateral nasal a.; 9 = angular a.; 10 = posterior auricular a.; 11 = maxillary a.; 12 = inferior alveolar a.; 13 = mental a.; 14 = buccal a.; 15 = infraorbital a.; 16 = transverse facial a.; 17 = superficial temporal a. (17.1 = frontal branch, 17.2 = parietal branch); 18 = ophthalmic a.; 19 = supraorbital a.; 20 = supratrochlear a.; 21 = dorsal nasal a.; 22 = anterior ethmoidal a.; 23 = external nasal a.; 24 = lacrimal a.; 25 = zygomatic a.; 26 = zygomaticofacial a.; 27 = zygomaticotemporal a.



Supratrochlear artery

Frontal branch of superficial temporal artery

Supraorbital artery

Superficial temporal artery

Ophthalmic artery

Middle temporal artery

Angular artery

Zygomaticoorbital artery

Infraorbital artery

Transverse facial artery

Buccal artery

Facial artery

Inferior labial artery

Superior labial artery


Mental branch of inferior alveolar artery

External carotid artery

Submental artery

Αγγείωση προσώπου

- Από την προσωπική αρτηρία και την εγκάρσια προσωπική αρτηρία (επιπολής κροταφική)
- Πολλαπλές αναστομώσεις
- Τα τραύματα του προσώπου αιμορραγούν πολύ αλλά σπάνια εμφανίζεται ολιγαιμικό shock
- Ισχαιμική νέκρωση μαλακών μορίων προσώπου σε βαριά ασιτία (αραβοσιτική πελάγρα)









Fig. 3 Arteries contributing to the vascular supply of the face (in red originating from the external carotid artery, in pink originating from the internal carotid artery, in orange arterial anastomoses): 1 = supraorbital a. (1.1 = horizontal frontal branch, 1.2 = superior palpebral branches); 2 = supratrochlear a. (2.1 = superior/inferior palpebral branches); 3 = dorsal nasal a. (3.1 = central a.); 4 = superior/inferior palpebral branches from lacrimal a.; 5 = zygomaticotemporal a.; 6 = zygomaticofacial a.; 7 = external nasal branch from anterior ethmoidal a.; 8 = superficial temporal a. (8.1 = temporo-orbital branch, 8.2 = frontal branch, 8.3 = transverse frontal branch, 8.4 = parietal branch); 9 = anterior auricular a.; 10 = transverse facial a.; 11 = posterior auricular a.; 12 = facial a.; 13 = submental a. (13.1 = vertical labiomental a.); 14 = masseteric branch from facial a.; 15 = inferior labial a.; 16 = horizontal labiomental a.; 17 = superior labial a. (17.1 = inferior alar branch, 17.2 = septal branches); 18 = lateral nasal a. (18.1 = superior alar branches, 18.2 = nostril branches); 19 = angular artery (19.1 = medial palpebral branch); 20 = infraorbital a. (20.1 = inferior palpebral branch, 20.2 = nasal branch, 20.3 = superior labial branches); 21 = mental a.; 22 = buccal a.


Arterial anastomoses: A1 = anastomosis between supraorbital a. and frontal branch of superficial temporal a.; A2 = anastomosis between supraorbital a. and supratrochlear a.; A3 = anastomosis between dorsal nasal a. and angular a.; A4 = anastomosis between lateral nasal a. and external nasal branch from anterior ethmoidal a.; A5 = anastomosis between superior labial a. and lateral nasal a.; A6 = anastomosis between bilateral superior labial a.; A7 = anastomosis between facial a. and infraorbital a.; A8 = anastomosis between inferior labial a. and mental a.; A9 = anastomosis between bilateral inferior labial a.; A10 = anastomosis between facial a. and transverse facial a.; A11 = anastomosis between anterior and posterior auricular a.




Η προσωπική αρτηρία (έξω γναθιαία)



Απαραίτητη η απολίνωση της αρτηρίας σε επεμβάσεις στην περιοχή του υπογναθίου τριγώνου





Sublingual artery

Mylohyoid muscle

Lingual artery

Facial artery






Fig. 4 Lateral view of the arterial facial blood supply. The external carotid artery provides all extracranial branches (formalin-fixed and colored-latex injected cadaveric head).

Περικογχικές και Βλεφαρικές Αρτηρίες



Supraorbital artery

Supratrochlear artery

Dorsal nasal artery

Angular artery


External nasal artery

Infraorbital artery

Lateral nasal artery

Transverse facial artery

Facial artery



ΑΡΤΗΡΙΕΣ υπογνάθιας χώρας




γλωσσική αρτηρία, υπό το υπογλώσσιο νεύρο

**Έξω γναθιαία = προσωπική → ανιούσα υπερώια,
αμυγδαλική και υπογενειίδια**





Γναθοϋοειδής α. , από κάτω φατνιακή

Λοιπά στοιχεία : υπογλώσσιο ν. υπογνάθιος αδένας, βελονοϋοειδής συνδ.






Η άνω γναθιαία αρτηρία






Arteries

- Maxillary a.
 - Posterior superior alveolar a.
 - Anterior superior alveolar a.
 - Infra-orbital a.





Επιπολής Αρτηρίες και Φλέβες




Fig. 9 Veins of the face: 1 = superficial temporal v.; 2 = supraorbital v.; 3 = supratrochlear v.; 4 = angular v.; 5 = superior ophthalmic v.; 6 = inferior ophthalmic v.; 7 = external nasal v.; 8 = infraorbital v.; 9 = superior labial v.; 10 = inferior labial v.; 11 = facial v.; 12 = cavernous sinus; 13 = pterygoid plexus; 14 = inferior alveolar v.; 15 = mental v.; 16 = maxillary v.; 17 = retromandibular v.; 18 = posterior auricular v.; 19 = external jugular v.; 20 = internal jugular v.

and a posterior superficial division. The posterior division merges with the posterior auricular vein to form the external jugular vein, whereas the anterior division merges with the facial vein and drains into the internal jugular vein.

In general, anatomical textbooks report that facial veins are devoid of valves – thus facilitating the spread of infection from the “dangerous triangle” to the intracranial venous sinuses. The so-called “dangerous triangle” of the midface is a triangular-




Fig. 10 Venous drainage of the cranial region. Note the superficial position of the facial nerve and its relationship with the superficial temporal vein (formalin-fixed and colored-latex injected cadaveric head).





FIGURE 8.14. Veins of the head and neck.


- 2** Posterior division of Retromandibular vein, which is joined by the posterior auricular vein and becomes the external jugular vein, Which hen drains into Subclavian vein.



Φλέβες προς έσω σφαγίτιδα

- έσω γναθιαία
- επιπολής κροταφική
- οπισθογναθιαία
- πρόσθια προσωπική
- κοινή προσωπική





Φλέβες Προσώπου





Retromandibular vein





PG



EJV



RMV

FV


SCM

IJV





ΦΛΕΒΕΣ υπογνάθιας χώρας



(στην έσω σφαγίτιδα φλ. εκβάλλει η κοινή προσωπική φλ.)

**Κοινή προσωπική φλ.=από συμβολή προσωπικής,
οπισθογναθιαίας και γλωσσικής**

Υπογενναίδια φλ. σε προσωπική φλ.


Λοιπά στοιχεία : υπογλώσσιο ν. υπογνάθιος αδένας, βελονοϋοειδής συνδ.

**Περικογχικές και
Ενδοκογχικές
αναστομώσεις**

**Δυνητική οδός
μετάδοσης
μικροοργανισμών από
φλεγμονές κάτω
τμήματος του
προσώπου**

**(δοθηνώσεις, οδοντικά
αποστήματα)**

**ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΣΗΡΑΓΓΩΔΟΥΣ
ΚΟΛΠΟΥ**



ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ

και ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ





Fig.11 Vessels and nodes (Ln.) of lymphatic drainage of the face according to PAN ET AL. (2011): 1 = preauricular Ln.; 2 = parotid Ln.; 3 = infra-auricular Ln.; 4 = nasolabial Ln.; 5 = buccinator Ln.; 6 = submandibular Ln.; 7 = submental Ln.; 8 = internal jugular Ln.; 9 = anterior jugular Ln.

Λεμφική αποχέτευση προσώπου-τραχήλου



Ινιακά (πορτοκαλί)

Οπισθοωτιαία-μαστοειδή
(μώβ)

Παρωτιδικά (κόκκινα)

Παρειακά-βυκανητικά (βαθύ
μπλέ)


Υπογνάθια (ρόζ)

Υπογενειΐδια (γκρενά)

**Επιπολής Τραχηλικά
(πράσινα)**

**Εν τω βάθει Τραχηλικά
(άνω και κάτω)(μπλέ)**

Λεμφική αποχέτευση προσώπου-τραχήλου




**Επιπολής
Τραχηλικά**

**Εν τω βάθει
Τραχηλικά
(άνω και κάτω)**


**Σπλαγχνικά
Πρόσθια τραχηλικά
Λαρυγγικά Τραχειακά
Οπισθοφαρυγγικά**

Υπογνάθια λεμφογάγγλια





- ✓ 5-6 υπογνάθια λεμφογάγγλια βρίσκονται μέσα στη θήκη του υπογνάθιου αδένου, σε στενή επαφή μ' αυτόν και δύσκολα ξεχωρίζουν.
- ✓ Δέχονται λεμφαγγεία από τα υπογενεΐδια, από στοματική κοιλότητα και πρόσθια μέρη προσώπου.
- ✓ Προς σφαγιτιδο: -διγαστροικά, -καρωτιδικά και -ωμοϋοειδή

Υπογνάθια λεμφογάγγλια




Δέχονται λεμφαγγεία από τα υπογενεΐδια λεμφογάγγλια, τα πλάγια του κάτω χείλους και της μύτης και από το πρόσθιο μέρος της γλώσσας (όχι από την κορυφή) κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, του ιδίου ημιμορίου, από όλα τα δόντια (εκτός των κάτω τομέων), από το πρόσθιο μέρος των ρινικών τοιχωμάτων και τους παραρρίνιους κόλπους (μετωπιαίο, πρόσθιες και μέσες ηθμοειδείς κυψέλες και γναθιαίο άντρο)

Υπογενεΐδια Υπογνάθια
Σφαγιτιδιδο-διγαστροικά
Εν τω βάθει τραχηλικά
Σφαγιτιδο-ωμοϋοειδή



Συστοιχίες

- Άνω οριζόντια
- Οπίσθια κάθετη
- Μέση κάθετη
(ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ)
- Πρόσθια κάθετη
(ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ)
- Κάτω οριζόντια
(ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΑ)



λεμφογάγγλια κεφαλής –τραχήλου

ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ




- Ινιακά (πορτοκαλί)
- Οπισθοωτιαία-μαστοειδή (μώβ)
- Παρωτιδικά (κόκκινα)
- Παρειακά-βυκανητικά (βαθύ μπλέ)
- Υπογνάθια (ρόζ)
- Υπογενείδια (γκρενά)

Επιπολής Τραχηλικά
(πράσινα)

Εν τω βάθει Τραχηλικά
(κίτρινα)

ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ



**Επιπολής
Τραχηλικά**

**Εν τω βάθει
Τραχηλικά
(άνω και κάτω)**


**Σπλαγχνικά
Πρόσθια τραχηλικά
Λαρυγγικά Τραχειακά
Οπισθοφαρυγγικά**

Λεμφογάγγλια του τραχήλου

ΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Υπογενεΐδια

**Προς: Υπογνάθια,
και Σφαγιτιδική
αλυσίδα
κορυφή γλώσσας**



Λεμφογάγγλια του τραχήλου

ΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Υπογνάθια

Προς: Σφαγιτιδική
αλυσίδα και
εν τω βάθει οπίσθια
τραχηλικά
κάτω χείλους)




Λεμφογάγγλια του τραχήλου

ΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Πρωτιαία-
Παρωτιδικά

Προς: εν τω βάθει
τραχηλικά
και πλάγιό κεφαλής




Λεμφογάγγλια του τραχήλου

ΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Οπισθοωτιαία

**Προς: εν τω βάθει
τραχηλικά
πτερυγίου και
έξω ακουστικό πόρο**




Λεμφογάγγλια του τραχήλου


ΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ινιακό/ά

Προς: εν τω βάθει
τραχηλικά



Λεμφογάγγλια του τραχήλου




ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΑΘΕΤΗ

**Επιπολής οπίσθια
τραχηλικά**

**Κατά μήκος
έξω σφαγίτιδας
νεύρου**

Λεμφογάγγλια του τραχήλου




ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ

Σφαγιτιδοπαρωτιδικά

**Στη γωνία κάτω
γνάθου**

**ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ
ΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ή
ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ
(μέση κάθετη)**

Λεμφογάγγλια του τραχήλου




ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ

Σφαγιτιδοδιγαστορικά
Στη συμβολή κοινής
προσωπικής-έσω
σφαγιτιδας
Από υπερώια αμυγδαλή

ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ
(μέση κάθετη)

Λεμφογάγγλια του τραχήλου



ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ

Σφαγιτιδοκαρωτιδικά

Στο διχασμό της κοινής
καρωτίδας

Από τη γλώσσα (εκτός
της κορυφής της)

(μέση κάθετη)

Λεμφογάγγλια του τραχήλου



ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ
ΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ή

Σφαγιτιδοωμοϋοειδή

**Στη διασταύρωση
ωμοϋοειδούς μυός
με έσω σφαγίτιδα**

**Από την κορυφή
της γλώσσας**


ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ

Λεμφογάγγλια του τραχήλου

Παραφαρυγγικά-
Οπισθοφαρυγγικά

Προς :
Μέση κάθετη –
σφαγιτιδική
αλυσίδα

ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ




Λεμφογάγγλια του τραχήλου

Παραλαρυγγικά

Προς :
Μέση κάθετη –
σφαγιτιδική
αλυσίδα

ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ




Λεμφογάγγλια του τραχήλου

Παρατραχειακά

Προς :
Μέση κάθετη –
σφαγιτιδική
αλυσίδα και
μεσοπνευμόνια

ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ




Λεμφογάγγλια του τραχήλου

Προλαρυγγικά

Προς :
Μέση κάθετη –
σφαγιτιδική
αλυσίδα

ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ




Λεμφογάγγλια του τραχήλου


Προτραχειακά

Προς :
Μέση κάθετη –
σφαγιτιδική
αλυσίδα
και
μεσοπνευμόνια

ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ



Λεμφογάγγλια του τραχήλου




ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ


Προς :
ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ
ΠΟΡΟ (αριστερά)
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ
ΠΟΡΟ (δεξιά)

ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΑ+ΣΚΑΛΗΝΑ


Προσωπικά
Παρωτιδικά
Πρωτιαία
Υπογενεΐδια
Υπογνάθια
Σφαγιτιδιδο-
διγαστρικά
Εν τω βάθει
τραχηλικά




Παραφαρυγγικά – Οπισθοφαρυγγικά Σφαγιτιδική Αλυσίδα



Παρατραχειακά – Υπερκλείδια λεμφογάγγλια Ελάσσων και Μείζων Θωρακικός πόρος




Παρατραχειακά – Παραοισοφαγικά Μείζων Θωρακικός πόρος




**Επιλεγμένη
Χειρουργική
Ανατομική του
προσώπου
κατά στιβάδες**

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (εκτημόρια)

1. Μετωποβρεγματική
2. Μετωπιαία
3. Κροταφοζυγωματική
4. Περικογχική
5. Παρωτιδομασητήρια-Οπισθογνάθια
6. Περιστοματική





3. Κροταφοζυγωματική χώρα

**ΜΥΕΣ
ΑΓΓΕΙΑ
ΝΕΥΡΑ
Κατά
Χώρες
(1-6)**

3.



Κροταφοζυγωματική

4. Περικογυτική χώρα

**ΜΥΕΣ
ΑΓΓΕΙΑ
ΝΕΥΡΑ
Κατά
Χώρες
(1-6)**

4.

Περικογχική



5. Παρωτιδομασητήρια- Οπισθογενάθια χώρα


**ΜΥΕΣ
ΑΓΓΕΙΑ
ΝΕΥΡΑΚ
ατά
Χώρες
(1-6)**

5.



Παρωτιδομασητήρια-Οπισθογνάθια

Παρωτίδα και Γναθοφαρυγγικό διάστημα



6. Περιορισματική χώρα

**ΜΥΕΣ
ΑΓΓΕΙΑ
ΝΕΥΡΑ
Κατά
Χώρες
(1-6)**

6.

Περιοτοματική

