

Εισαγωγή στην Φασματική Θεωρία Αλγεβρών Banach

A. Κατάβολος

Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα, 1999
Μερική Αναθεώρηση, 2017

Περιεχόμενα

1	Πρώτοι ορισμοί	2
2	Παραδείγματα	3
2.1	3
2.2	3
2.3	Άλγεβρες συνεχών συναρτήσεων	4
2.4	Άλγεβρες μετρήσιμων συναρτήσεων	4
2.5	Η άλγεβρα του δίσκου	5
2.6	Η άλγεβρα Banach $(\ell^1(\mathbb{Z}), \ \cdot\ _1, *)$	7
2.7	Η άλγεβρα Banach $(L^1(\mathbb{T}), \ \cdot\ _1, *)$	8
2.8	Η άλγεβρα του Wiener \mathcal{W} ή $\mathcal{A}(\mathbb{T})$	9
2.9	Η άλγεβρα $\mathcal{B}(X)$ των τελεστών σ' ένα χώρο Banach X .	10
3		11
3.1	Κάθε άλγεβρα Banach δρα σε χώρο Banach	11
3.2	Η μοναδοποίηση	13
4	Η ομάδα των αντιστρεψίμων στοιχείων	15
5	Το φάσμα	16
5.1	Ορισμοί και βασικές ιδιότητες	16
5.2	Εξάρτηση του φάσματος από την άλγεβρα	22
6	Παράρτημα:	
	Συναρτήσεις με τιμές σε χώρους Banach	26
6.1	Ολοκλήρωμα συνεχούς συνάρτησης	26
6.2	Ολόμορφες συναρτήσεις	27
6.3	Θεωρήματα Cauchy	31
7	Ο Συναρτησιακός Λογισμός	35

7.1	Εισαγωγή	35
7.2	Ορισμός του Συναρτησιακού Λογισμού	36
7.3	Η απεικόνιση $x \rightarrow \mathbf{f}(x)$	46
7.4	Η προβολή του Riesz	47
8	Η προβολή του Riesz σε άλγεβρες τελεστών	50
8.1	Γενικές ιδιότητες	50
8.2	Μεμονωμένα σημεία του φάσματος	52
8.3	Πόλοι του επιλύοντα τελεστή	53
8.3.1	Ειδική περίπτωση: $\dim(X_\sigma) < \infty$	56
8.4	Αλγεβρικοί τελεστές	56
8.5	Συμπαγείς τελεστές	58
9	Συνέχεια του φάσματος	59
9.1	Η συνάρτηση $x \rightarrow \rho(x)$	59
9.2	Η συνάρτηση $x \rightarrow \sigma(x)$	61
9.2.1	Ολικά μη συνεκτικοί μετρικοί χώροι	64
10	Μεταθετικές άλγεβρες Banach	66
10.1	Ιδεώδη και μορφισμοί	66
10.2	Ο μετασχηματισμός Gelfand	74
10.3	Παραδείγματα	78
10.3.1	Η άλγεβρα $C(K)$	78
10.3.2	Η άλγεβρα του δίσκου $A(\mathbb{D})$	79
10.3.3	Η άλγεβρα Wiener ή άλγεβρα Fourier \mathcal{W}	81
10.3.4	Η άλγεβρα $\ell^1(\mathbb{Z})$	83
10.3.5	Η άλγεβρα $L^1(\mathbb{R})$	84
10.3.6	Μία μεταθετική άλγεβρα Banach που δεν είναι ημιαπλή	90
10.4	Ιδεώδη και φασματική σύνθεση	91
11	C^* άλγεβρες	93

11.1	Ενελίξεις	93
11.1.1	Παραδείγματα	94
11.1.2	Η Μοναδοποίηση	96
11.2	Το Θεώρημα Gelfand-Naimark	97
11.3	Μεταθετικές C^* -άλγεβρες χωρίς μονάδα	100
11.4	Ο συναρτησιακός λογισμός για συνεχείς συναρτήσεις	102
12	Το φασματικό Θεώρημα	108
12.1	Εισαγωγή: Διαγωνοποίηση πινάκων	108
12.2	Ολοκλήρωση ως προς φασματικό μέτρο	110
12.2.1	Φασματικά μέτρα	110
12.2.2	Ολοκλήρωση	112
12.3	Μέτρα και Αναπαραστάσεις	114
12.4	Το Φασματικό Θεώρημα	119

1 Πρώτοι ορισμοί

Για λόγους που θα γίνουν σύντομα σαφείς, όλοι οι γραμμικοί χώροι θα είναι **μυγαδικοί**, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Ορισμός 1.1 Μία (προσεταιριστική) **άλγεβρα** \mathcal{A} είναι ένας (μυγαδικός) γραμμικός χώρος που είναι συγχρόνως δακτύλιος και ισχύει $(\lambda x)y = \lambda(xy) = x(\lambda y)$ για κάθε $x, y \in \mathcal{A}$ και $\lambda \in \mathbb{C}$. Μία άλγεβρα λέγεται **μεταθετική** αν $xy = yx$ για κάθε $x, y \in \mathcal{A}$.

Ένας υπόχωρος $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{A}$ λέγεται (γνήσιο) **αριστερό (αντίστοιχα δεξιό) ιδεώδες** της \mathcal{A} αν $x \in \mathcal{A}, y \in \mathcal{J} \Rightarrow xy \in \mathcal{J}$ (αντίστοιχα $yx \in \mathcal{J}$). Αν ένα ιδεώδες είναι δεξιό και αριστερό τότε λέγεται **αμφίπλευρο ιδεώδες** ή απλά **ιδεώδες**.

Παράδειγμα 1.1 (α) Αν X είναι γραμμικός χώρος και Ω είναι μη κενό σύνολο, το σύνολο $\mathcal{F}(\Omega, X)$ όλων των συναρτήσεων $f : \Omega \rightarrow X$ γίνεται γραμμικός χώρος αν εφοδιασθεί με τις πράξεις κατά σημείο,

$$(f + \lambda g)(t) = f(t) + \lambda g(t)$$

($f, g \in \mathcal{F}(\Omega, X), \lambda \in \mathbb{C}, t \in \Omega$). Αν $X = \mathbb{C}$, επειδή το \mathbb{C} είναι άλγεβρα, ο χώρος $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{C})$ είναι άλγεβρα με πολλαπλασιασμό

$$(f \cdot g)(t) = f(t) \cdot g(t)$$

Γενικότερα, αν $X = \mathcal{A}$ είναι άλγεβρα, τότε ο χώρος $\mathcal{F}(\Omega, \mathcal{A})$ είναι άλγεβρα ως προς το κατά σημείο γινόμενο.

Τέτοιες άλγεβρες λέγονται **άλγεβρες συναρτήσεων**.

(β) Έστω X γραμμικός χώρος, και $\mathcal{L}(X)$ το σύνολο των γραμμικών απεικονίσεων $T : X \rightarrow X$. Με τις κατά σημείο γραμμικές πράξεις, το $\mathcal{L}(X)$ γίνεται γραμμικός χώρος. Αν επί πλέον εφοδιασθεί με την σύνθεση τελεστών

$$(T \cdot S)(x) = T(S(x)) \quad T, S \in \mathcal{L}(X), \quad x \in X$$

τότε ο $\mathcal{L}(X)$ γίνεται (εν γένει μη μεταθετική) άλγεβρα.

Τέτοιες άλγεβρες λέγονται **άλγεβρες τελεστών**.

Ορισμός 1.2 Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα και $\|\cdot\|$ είναι μία νόρμα στην \mathcal{A} με την επιπλέον ιδιότητα

$$\|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\| \tag{1}$$

για κάθε $x, y \in \mathcal{A}$, τότε η \mathcal{A} λέγεται **νορμαρισμένη άλγεβρα**. Αν επιπλέον η $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ είναι πλήρης, τότε η \mathcal{A} λέγεται **άλγεβρα Banach**.

Παρατηρήσεις. (i) Η συνθήκη (1) εξασφαλίζει την συνέχεια του πολλαπλασιασμού

$$m : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} : (x, y) \longrightarrow x \cdot y$$

Πράγματι, έχουμε

$$\|xy - zw\| \leq \|xy - xw\| + \|xw - zw\| \leq \|x\| \|y - w\| + \|x - z\| \|w\|.$$

Αν ο πολλαπλασιασμός είναι χωριστά συνεχής, δηλαδή αν για κάθε $x \in \mathcal{A}$ οι απεικονίσεις

$$\lambda_x : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} : y \longrightarrow xy \quad \text{και} \quad \rho_x : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} : y \longrightarrow yx$$

είναι συνεχείς, δεν έπεται εν γένει ότι ο m είναι συνεχής. Αν όμως επί πλέον η $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ είναι πλήρης, τότε ο πολλαπλασιασμός είναι υποχρεωτικά συνεχής, και μάλιστα:

υπάρχει ισοδύναμη νόρμα $\|\cdot\|_1$ τέτοια ώστε η $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_1)$ να είναι άλγεβρα Banach.

Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση.

(ii) Κάθε νορμαρισμένη άλγεβρα εμφυτεύεται ισομετρικά και ισομορφικά (δηλ. η εμφύτευση είναι μορφισμός αλγεβρών) ως πυκνή υπάλγεβρα μιάς άλγεβρας Banach. Αυτό αποδεικνύεται ακριβώς όπως το αντίστοιχο αποτέλεσμα για χώρους με νόρμα, χρησιμοποιώντας και την συνέχεια του πολλαπλασιασμού. Θα κατασκευάσουμε μία ‘συγκεκριμένη’ εμφύτευση παρακάτω (βλ. Παράγραφο 3.1).

2 Παραδείγματα

2.1

Το σώμα των μιγαδικών αριθμών $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ είναι άλγεβρα Banach. Θα δείξουμε αργότερα (Θεώρημα Gelfand-Mazur) ότι είναι ‘η μόνη’ διαιρετική άλγεβρα Banach.

2.2

1. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$ το σύνολο $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|_\infty)$ είναι άλγεβρα Banach ως προς τις πράξεις κατά συντεταγμένη και την νόρμα $\|(x_n)\|_\infty = \max\{|x_i| : i = 1, \dots, n\}$. Είναι μεταθετική άλγεβρα με μονάδα $(1, 1, \dots, 1)$.

2. Έστω $\Gamma \neq \emptyset$ σύνολο. Το σύνολο $(\ell^\infty(\Gamma), \|\cdot\|_\infty)$ είναι άλγεβρα Banach ως προς τις πράξεις κατά σημείο και την νόρμα $\|f\|_\infty = \sup\{|f(\gamma)| : \gamma \in \Gamma\}$. Είναι μεταθετική άλγεβρα με μονάδα $\mathbf{1}$, όπου $\mathbf{1}(\gamma) = 1$ για κάθε $\gamma \in \Gamma$.

2.3 Άλγεβρες συνεχών συναρτήσεων

1. Έστω K συμπαγής Hausdorff τοπολογικός χώρος (π.χ. $K = [0, 1]$). Είναι γνωστό ότι ο χώρος $(C(K), \|\cdot\|_\infty)$ των συνεχών συναρτήσεων $f : K \rightarrow \mathbb{C}$ είναι (κλειστός υπόχωρος του $(\ell^\infty(K), \|\cdot\|_\infty)$, άρα) χώρος Banach. Επειδή το (κατά σημείο) γινόμενο συνεχών συναρτήσεων είναι συνεχής συνάρτηση, ο $C(K)$ είναι (υπάλγεβρα του $\ell^\infty(K)$, άρα) άλγεβρα Banach, μεταθετική και με μονάδα (την σταθερή συνάρτηση $\mathbf{1}$).

2. Έστω X τοπικά συμπαγής Hausdorff τοπολογικός χώρος (π.χ. $X = \mathbb{R}$). Ονομάζουμε $C_o(X)$ το σύνολο των συνεχών συναρτήσεων $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ που μηδενίζονται στο άπειρο¹. Δηλαδή μία συνεχής συνάρτηση f ανήκει στον $C_o(X)$ εξ ορισμού όταν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $K_\varepsilon \subseteq X$ συμπαγής ώστε $t \notin K_\varepsilon \Rightarrow |f(t)| < \varepsilon$. Τέτοιες συναρτήσεις είναι φραγμένες, δηλαδή $C_o(X) \subseteq \ell^\infty(X)$. Μάλιστα είναι φανερό ότι ο $C_o(X)$ είναι υπάλγεβρα του $\ell^\infty(X)$. Επειδή ο $C_o(X)$ είναι και $\|\cdot\|_\infty$ -κλειστός (άσκηση), είναι (μεταθετική) άλγεβρα Banach. Παρατηρούμε όμως ότι δεν έχει μονάδα, εκτός αν ο X είναι συμπαγής (άσκηση).

Άσκηση. Αποδείξτε ότι ο χώρος $C_{oo}(X)$ των συνεχών συναρτήσεων $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ που μηδενίζονται έξω από κάποιο συμπαγές $K_f \subseteq X$ αποτελεί υποσύνολο, μάλιστα ιδεώδες, του $C_o(X)$ που είναι $\|\cdot\|_\infty$ -πυκνό¹ στον $C_o(X)$.

3. Κάθε μη κενό σύνολο Γ γίνεται τοπικά συμπαγής χώρος όταν εφοδιασθεί με την διακριτή τοπολογία, και τότε τα συμπαγή υποσύνολά του είναι τα πεπερασμένα. Επομένως ο χώρος

$$c_o(\Gamma) \equiv \{f : \Gamma \rightarrow \mathbb{C} : \forall \varepsilon > 0 \exists \Gamma_\varepsilon \subseteq \Gamma, |\Gamma_\varepsilon| < \infty, |f(\gamma)| < \varepsilon \forall \gamma \notin \Gamma_\varepsilon\}$$

είναι, από το (2), μεταθετική άλγεβρα Banach και έχει μονάδα αν και μόνον αν το Γ είναι πεπερασμένο. Μάλιστα, είναι κλειστό ιδεώδες της $(\ell^\infty(\Gamma), \|\cdot\|_\infty)$.

2.4 Άλγεβρες μετρήσιμων συναρτήσεων

Έστω (X, \mathcal{S}, μ) χώρος μέτρου. Θέτουμε

$$\mathcal{L}^\infty(X) = \{f \in \ell^\infty(X), f \text{ μετρήσιμη}\}.$$

Επειδή το άθροισμα και το γινόμενο μετρήσιμων συναρτήσεων είναι μετρήσιμη συνάρτηση, η $\mathcal{L}^\infty(X)$ είναι υπάλγεβρα της $\ell^\infty(X)$, και επειδή το ομοιόμορφο

¹Όταν ο X είναι μετρικός χώρος, τοπικά συμπαγής και μη συμπαγής, το $C_{oo}(X)$ είναι γνήσιο ιδεώδες του $C_o(X)$. Υπάρχουν όμως τοπικά συμπαγείς μη συμπαγείς χώροι X στους οποίους ισχύει $C_{oo}(X) = C_o(X)$.

όριο μετρήσιμων συναρτήσεων είναι μετρήσιμη συνάρτηση, η $\mathcal{L}^\infty(X)$ είναι άλγεβρα Banach, προφανώς μεταθετική και με μονάδα. (Σημείωσε ότι μέχρι τώρα η ύπαρξη του μέτρου μ δεν έπαιξε κανένα ρόλο).

Θέτουμε

$$\mathcal{N}(X, \mu) = \{f \in \mathcal{L}^\infty(X) : f = 0 \text{ } \mu\text{-σχεδόν παντού}\}$$

και παρατηρούμε ότι το $\mathcal{N}(X, \mu)$ είναι ιδεώδες της $\mathcal{L}^\infty(X)$, δηλαδή αν $f \in \mathcal{N}(X, \mu)$ και $g \in \mathcal{L}^\infty(X)$ τότε $fg \in \mathcal{N}(X, \mu)$. Έπεται εύκολα ότι ο χώρος πηλίκο

$$L^\infty(X, \mu) = \mathcal{L}^\infty(X)/\mathcal{N}(X, \mu)$$

είναι άλγεβρα. Επίσης το ομοιόμορφο όριο μ -μηδενικών συναρτήσεων είναι μ -μηδενική, άρα το $\mathcal{N}(X, \mu)$ είναι $\|\cdot\|_\infty$ -κλειστό ιδεώδες της $\mathcal{L}^\infty(X)$. Επομένως η νόρμα πηλίκο είναι πλήρης νόρμα στον χώρο πηλίκο. Θυμίζω ότι η νόρμα πηλίκο $\|\cdot\|_q$ ορίζεται από τον τύπο

$$\|f + \mathcal{N}\|_q \equiv d(f, \mathcal{N}) = \inf\{\|f - g\|_\infty : g \in \mathcal{N}\}.$$

Αποδεικνύεται (άσκηση!) ότι, αν θέσουμε

$$\|f\|_{ess} \equiv \inf\{\lambda > 0 : \mu(\{t \in X : |f(t)| > \lambda\}) = 0\}$$

για $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ (το 'ουσιώδες φράγμα' της f) τότε $\|f\|_{ess} = \|f + \mathcal{N}\|_q$. Ταυτίζουμε συνήθως μία $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ με την κλάση της $f + \mathcal{N}$, και αναφερόμαστε στην άλγεβρα Banach $(L^\infty(X, \mu), \|\cdot\|_{ess})$ των ουσιωδώς φραγμένων μετρήσιμων συναρτήσεων². Μάλιστα η νόρμα της $L^\infty(X, \mu)$ συμβολίζεται συνήθως $\|\cdot\|_\infty$ αντί για $\|\cdot\|_{ess}$.

2.5 Η άλγεβρα του δίσκου

Έστω $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, και $(C(\mathbb{T}), \|\cdot\|_{\mathbb{T}})$ η άλγεβρα Banach των συνεχών συναρτήσεων $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$. Λέμε ότι μία συνάρτηση $f \in C(\mathbb{T})$ ανήκει στην **άλγεβρα του δίσκου** $A(\mathbb{D})$ αν η f επεκτείνεται σε μία συνεχή συνάρτηση $\tilde{f} : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}$, που είναι ολόμορφη στον ανοικτό δίσκο \mathbb{D} . Παραδείγματος χάριν, κάθε συνάρτηση p της μορφής

$$p(e^{i\theta}) = \sum_{k=0}^n a_k e^{ik\theta}$$

² Μία μετρήσιμη συνάρτηση $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ λέγεται ουσιωδώς φραγμένη αν $\|f\|_{ess} < \infty$. Κάθε ουσιωδώς μετρήσιμη συνάρτηση είναι σχεδόν παντού ίση με μία φραγμένη μετρήσιμη συνάρτηση.

όπου $a_k \in \mathbb{C}$, ανήκει στην $A(\mathbb{D})$. Τέτοιες συναρτήσεις λέγονται *αναλυτικά τριγωνομετρικά πολυώνυμα*.

Παρατηρούμε ότι, αν $f \in A(\mathbb{D})$,

$$\|f\|_{\mathbb{T}} := \sup\{|f(z)| : z \in \mathbb{T}\} = \sup\{|\tilde{f}(z)| : z \in \bar{\mathbb{D}}\} \equiv \|\tilde{f}\|_{\bar{\mathbb{D}}}$$

από την αρχή του μεγίστου ([8], 6.49). Έπεται ειδικότερα ότι η επέκταση \tilde{f} είναι μοναδική (αν υπάρχει).

Είναι φανερό ότι η $A(\mathbb{D})$ είναι υπάλγεβρα της $C(\mathbb{T})$. Ισχυρίζομαι ότι είναι κλειστή υπάλγεβρα. Πράγματι, έστω $\{f_n\}$ μία βασική ακολουθία στην $A(\mathbb{D})$. Από την αρχή του μεγίστου έπεται ότι

$$\|\tilde{f}_n - \tilde{f}_m\|_{\bar{\mathbb{D}}} = \|f_n - f_m\|_{\mathbb{T}}$$

επομένως η ακολουθία $\{\tilde{f}_n\}$ συγκλίνει ομοιόμορφα στο $\bar{\mathbb{D}}$ σε μία συνεχή συνάρτηση g . Από το Θεώρημα σύγκλισης του Weierstrass ([8], 6.4) έπεται ότι η g είναι ολόμορφη στον ανοικτό δίσκο \mathbb{D} . Άρα αν $f = g|_{\mathbb{T}}$, τότε $f \in A(\mathbb{D})$ και βέβαια $\|f_n - f\|_{\mathbb{T}} \rightarrow 0$.

Έπεται ότι η $A(\mathbb{D})$ είναι άλγεβρα Banach, και βεβαίως είναι μεταθετική και έχει μονάδα. Παρατήρησε ότι το σύνολο \mathcal{P}_+ των αναλυτικών τριγωνομετρικών πολυωνύμων αποτελεί υπάλγεβρα της $A(\mathbb{D})$. Ισχυρίζομαι ότι είναι πυκνή υπάλγεβρα, δηλαδή ότι κάθε $f \in A(\mathbb{D})$ προσεγγίζεται από αναλυτικά τριγωνομετρικά πολυώνυμα, ομοιόμορφα στο \mathbb{T} .

Απόδειξη.

Παρατήρηση 1. Έστω $f : \bar{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}$ συνεχής, $0 < \rho < 1$. Θέτω $f_\rho(z) = f(\rho z)$. Τότε $\lim_{\rho \nearrow 1} \|f_\rho - f\|_{\bar{\mathbb{D}}} = 0$. Πράγματι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής, άρα για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ ώστε

$$z, w \in \bar{\mathbb{D}}, |z - w| < \delta \implies |f(z) - f(w)| < \varepsilon.$$

Επομένως, αν $1 - \rho < \delta$, τότε για κάθε $z \in \bar{\mathbb{D}}$ ισχύει $|z - \rho z| < \delta$ άρα $|f_\rho(z) - f(z)| = |f(\rho z) - f(z)| < \varepsilon$.

Παρατήρηση 2. Έστω $f \in A(\mathbb{D})$. Τότε για κάθε $\rho \in (0, 1)$ η συνάρτηση f_ρ είναι ολόμορφη στον δίσκο $\mathbb{D}_\rho = \{z \in \mathbb{C} : |z| < \frac{1}{\rho}\}$. Επομένως έχει δυναμοσειρά η οποία συγκλίνει ομοιόμορφα στα συμπαγή υποσυνολα του \mathbb{D}_ρ , άρα και στο \mathbb{T} .

Αν λοιπόν $f \in A(\mathbb{D})$ και $\varepsilon > 0$, επιλέγουμε, από την Παρατήρηση 1, $\rho \in (0, 1)$ ώστε $\|f_\rho - f\|_{\mathbb{T}} < \varepsilon/2$. Από την Παρατήρηση 2, υπάρχει αναλυτικό τριγωνομετρικό πολυώνυμο p ώστε $\|f_\rho - p\|_{\mathbb{T}} < \varepsilon/2$. Επομένως $\|f - p\|_{\mathbb{T}} < \varepsilon$ και η απόδειξη είναι πλήρης. \square

2.6 Η άλγεβρα Banach $(\ell^1(\mathbb{Z}), \|\cdot\|_1, *)$

Είναι γνωστό ότι ο χώρος

$$\ell^1(\mathbb{Z}) = \{a = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} : \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} |a_k| < \infty\}$$

είναι χώρος Banach ως προς την νόρμα $\|\cdot\|_1$ όπου

$$\|a\|_1 = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} |a_k|.$$

Αν $e_n \in \ell^1(\mathbb{Z})$ είναι η ακολουθία που έχει μονάδα στην θέση n και μηδέν στις υπόλοιπες, ο $\ell^1(\mathbb{Z})$ είναι η κλειστή γραμμική θήκη του συνόλου $E \equiv \{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ (μάάλιστα το E είναι βάση Schauder του $\ell^1(\mathbb{Z})$). Το E γίνεται (αβελιανή) ομάδα (ισόμορφη με την \mathbb{Z}) αν εφοδιασθεί με την πράξη $*$ όπου $e_n * e_m \equiv e_{n+m}$. Η πράξη αυτή επεκτείνεται γραμμικά στην γραμμική θήκη $c_{oo}(\mathbb{Z})$ του E :

Αν τα $a = \sum a_k e_k$ και $b = \sum b_k e_k$ είναι πεπερασμένα αθροίσματα, θέτουμε

$$a * b = \sum_k \sum_m a_k b_m e_k * e_m$$

και παρατηρούμε ότι $a * b = \sum_n c_n e_n$ όπου $c_n = \sum_k a_k b_{n-k}$.

Μπορούμε να επεκτείνουμε την πράξη $*$ της **συνέλιξης (convolution)** στον χώρο $\ell^1(\mathbb{Z})$, είτε παρατηρώντας ότι είναι συνεχής ως προς την νόρμα $\|\cdot\|_1$, είτε απευθείας ως εξής: αν $a, b \in \ell^1(\mathbb{Z})$ ορίζουμε την ακολουθία $c = (c_n) = a * b$ από την σχέση

$$c_n = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} a_k b_{n-k} \quad n \in \mathbb{Z}$$

(η σειρά συγκλίνει απόλυτα γιατί η (a_k) είναι απόλυτα αθροίσιμη και για κάθε $n \in \mathbb{Z}$ η (b_{n-k}) είναι φραγμένη). Πρέπει να δειχθεί ότι η (c_n) ανήκει στον $\ell^1(\mathbb{Z})$. Πράγματι,

$$\begin{aligned} \sum_n |c_n| &= \sum_n \left| \sum_k a_k b_{n-k} \right| \\ &\leq \sum_n \sum_k |a_k| |b_{n-k}| = \sum_k |a_k| \sum_n |b_{n-k}| \\ &= \|a\|_1 \cdot \|b\|_1 \end{aligned}$$

όπου η εναλλαγή των δύο αθροίσεων είναι επιτρεπτή, αφού πρόκειται για σειρές θετικών όρων, και η τελευταία ισότητα ισχύει γιατί $\sum_n |b_{n-k}| = \sum_n |b_n|$ για κάθε $k \in \mathbb{Z}$. Έτσι αποδείχθηκε συγχρόνως ότι $c = a * b \in \ell^1(\mathbb{Z})$ και ότι $\|a * b\|_1 \leq \|a\|_1 \|b\|_1$.

Η προσεταιριστική ιδιότητα της συνέλιξης αποδεικνύεται ως εξής

$$\begin{aligned} (a * (b * c))_n &= \sum_k a_k (b * c)_{n-k} \\ &= \sum_k a_k \left(\sum_m b_{n-k-m} c_m \right) = \sum_m \left(\sum_k a_k b_{(n-m)-k} \right) c_m \\ &= \sum_m (a * b)_{n-m} c_m = ((a * b) * c)_n. \end{aligned}$$

Η επιμεριστική ιδιότητα της συνέλιξης ως προς την πρόσθεση ισχύει τετριμμένα, επομένως αποδείχθηκε ότι η $(\ell^1(\mathbb{Z}), \|\cdot\|_1, *)$ είναι άλγεβρα Banach.

Η σχέση

$$(a * b)_n = \sum_k a_k b_{n-k} = \sum_j a_{n-j} b_j = (b * a)_n$$

δείχνει ότι η άλγεβρα είναι μεταθετική. Τέλος, ελέγχεται άμεσα ότι το στοιχείο e_0 όπου $(e_0)_n = \delta_{n,0}$ είναι μονάδα της άλγεβρας.

Παρατήρηση. Η άλγεβρα $(\ell^1(\mathbb{Z}), *)$ δεν είναι άλγεβρα συναρτήσεων, γιατί ο πολλαπλασιασμός δεν είναι το κατά σημείο γινόμενο. Όπως παρατηρήσαμε, ο πολλαπλασιασμός $*$ ορίστηκε μέσω της αλγεβρικής δομής του ‘συνόλου δεικτών’ \mathbb{Z} . Στο Παράδειγμα 2.8 θα ‘αναπαραστήσουμε’ την $(\ell^1(\mathbb{Z}), \|\cdot\|_1, *)$ ως άλγεβρα συναρτήσεων.

Μπορεί να ελέγξει κανείς εύκολα (άσκηση) ότι ο χώρος $(\ell^1(\mathbb{Z}), \|\cdot\|_1)$ (και γενικότερα, ο $\ell^1(\Gamma)$) γίνεται μεταθετική άλγεβρα Banach με το κατά σημείο γινόμενο, η οποία όμως δεν έχει μονάδα. Η άλγεβρα αυτή δεν είναι ισόμορφη, ως άλγεβρα, με την $(\ell^1(\mathbb{Z}), *)$ (ενώ οι υποκείμενοι χώροι Banach ταυτίζονται).

2.7 Η άλγεβρα Banach $(L^1(\mathbb{T}), \|\cdot\|_1, *)$

Ο χώρος Banach $(L^1(\mathbb{T}), \|\cdot\|_1)$ των Lebesgue ολοκληρώσιμων συναρτήσεων $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ με νόρμα

$$\|f\|_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(e^{it})| dt$$

γίνεται μεταθετική άλγεβρα Banach χωρίς μονάδα αν εφοδιασθεί με την συνέλιξη

$$(f * g)(e^{it}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{is})g(e^{i(t-s)})ds.$$

Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση.

Παρατήρηση Γενικότερα αποδεικνύεται ότι, αν G είναι τοπικά συμπαγής ομάδα, ορίζεται η άλγεβρα Banach $L^1(G)$, όπου η ολοκλήρωση γίνεται ως προς το λεγόμενο μέτρο Haar. Η άλγεβρα αυτή είναι μεταθετική αν και μόνον αν η G είναι αβελιανή, και έχει μονάδα αν και μόνον αν η τοπολογία της G είναι η διακριτή. Η μελέτη της άλγεβρας αυτής αποτελεί αντικείμενο της λεγόμενης ‘αφηρημένης αρμονικής ανάλυσης’.

2.8 Η άλγεβρα του Wiener \mathcal{W} ή $A(\mathbb{T})$

Πρόκειται για το σύνολο \mathcal{W} των συναρτήσεων f της μορφής

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} a_k e^{ikt} \quad t \in [0, 2\pi]$$

όπου $\sum_k |a_k| < \infty$. Επειδή $|e^{ikt}| = 1$ για κάθε $t \in [0, 2\pi]$, η σειρά $\sum_k a_k e^{ikt}$ συγκλίνει απόλυτα και ομοιόμορφα ως προς t , άρα ορίζει συνεχή συνάρτηση, δηλαδή ο χώρος \mathcal{W} είναι υπόχωρος του χώρου Banach $C([0, 2\pi])$. Δεν είναι όμως κλειστός ως προς την νόρμα $\|\cdot\|_{\infty}$ (άσκηση).

Δεν είναι αμέσως φανερό ότι ο \mathcal{W} είναι κλειστός ως προς το κατά σημείο γινόμενο, ότι είναι δηλαδή υπάλγεβρα της $C([0, 2\pi])$. Αυτό αποδεικνύεται ως εξής: Αν $f(t) = \sum_k a_k e^{ikt}$ και $g(t) = \sum_k b_k e^{ikt}$ είναι δύο στοιχεία του \mathcal{W} , τότε

$$\begin{aligned} f(t)g(t) &= \left(\sum_k a_k e^{ikt} \right) \left(\sum_n b_n e^{int} \right) = \sum_k \sum_n a_k b_n e^{i(k+n)t} \\ &= \sum_k \sum_m a_k b_{m-k} e^{imt} = \sum_m \left(\sum_k a_k b_{m-k} \right) e^{imt} = \sum_m (a * b)_m e^{imt} \end{aligned}$$

(η εναλλαγή των αθροίσεων είναι επιτρεπτή λόγω απόλυτης αθροισιμότητας).

Επειδή, όπως δείξαμε στο Παράδειγμα 2.6, η ακολουθία $((a * b)_m)$ είναι απόλυτα αθροίσιμη, έπεται ότι το (κατά σημείο) γινόμενο fg ανήκει στο \mathcal{W} .

Σημείωση. Το γεγονός ότι και το πηλίκο f/g , όταν ορίζεται, ανήκει στην \mathcal{W} , αποδείχθηκε πρώτα από τον N. Wiener. Μία πολύ πιο άμεση απόδειξη, που

δόθηκε από τον I. Gelfand, αποτέλεσε μία από τις πρώτες επιτυχίες της (νέας τότε) θεωρίας των αλγεβρών Banach.

Οι συντελεστές a_k της σειράς καθορίζονται μοναδικά από την f , γιατί

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-int} dt = \sum_k a_k \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-i(n-k)t} dt = a_n$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$ (χρησιμοποίησα την ομοιόμορφη σύγκλιση της σειράς). Οι συντελεστές αυτοί λέγονται **συντελεστές Fourier** της f και συμβολίζονται $\hat{f}(n)$.

Επομένως η απεικόνιση

$$\mathcal{W} \longrightarrow \ell^1(\mathbb{Z}) : f \longrightarrow \hat{f} \equiv (\hat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}}$$

(ο 'μετασχηματισμός Fourier') είναι 1-1 και επί. Είναι προφανώς γραμμική, και δείξαμε προηγουμένως ότι είναι μορφισμός, δηλαδή ότι $\widehat{f \cdot g} = \hat{f} * \hat{g}$.

Αν λοιπόν εφοδιάσουμε την \mathcal{W} με την νόρμα $\|\cdot\|_w$ όπου

$$\|f\|_w = \sum_k |\hat{f}(k)|,$$

τότε η $(\mathcal{W}, \|\cdot\|_w, \cdot)$ γίνεται ισομετρικά ισόμορφη με την $(\ell^1(\mathbb{Z}), \|\cdot\|_1, *)$, και επομένως γίνεται άλγεβρα Banach.

2.9 Η άλγεβρα $\mathcal{B}(X)$ των τελεστών σ' ένα χώρο Banach X .

Είναι γνωστό ότι το σύνολο

$$\mathcal{B}(X) = \{T \in \mathcal{L}(X) : T \text{ συνεχής}\}$$

των γραμμικών και φραγμένων απεικονίσεων $T : X \longrightarrow X$ αποτελεί χώρο Banach αν εφοδιασθεί με την νόρμα

$$\|T\| = \sup\{\|T\xi\| : \xi \in X, \|\xi\| \leq 1\}.$$

Επίσης είναι υπάλγεβρα της άλγεβρας $\mathcal{L}(X)$ όλων των γραμμικών απεικονίσεων του X στον εαυτό του, και ικανοποιεί την ανισότητα (1). Πράγματι, αν $T, S \in \mathcal{B}(X)$ τότε για κάθε $\xi \in X$ έχουμε

$$\|(T \circ S)(\xi)\| = \|T(S(\xi))\| \leq \|T\| \cdot \|S(\xi)\| \leq \|T\| \cdot \|S\| \cdot \|\xi\|$$

επομένως η γραμμική απεικόνιση $T \circ S$ είναι φραγμένη και μάλιστα, παίρνοντας supremum ως προς ξ στην μοναδιαία σφαίρα του X στην προηγούμενη ανισότητα προκύπτει ότι

$$\|T \circ S\| \leq \|T\| \|S\|$$

πράγμα που δείχνει ότι η άλγεβρα $(\mathcal{B}(X), \|\cdot\|, \circ)$ είναι άλγεβρα Banach.

Η άλγεβρα αυτή έχει μονάδα, τον ταυτοτικό τελεστή I , αλλά δεν είναι ποτέ μεταθετική, εκτός αν $\dim X = 1$. Πράγματι, αν ο X είναι μονοδιάστατος, τότε κάθε γραμμική απεικόνιση στον X αντιστοιχεί σε έναν μιγαδικό αριθμό, επομένως η $\mathcal{B}(X)$ είναι ισόμορφη με το \mathbb{C} , άρα μεταθετική. Για το αντίστροφο, υποθέτουμε ότι η διάσταση του X είναι τουλάχιστον 2, και επιλέγουμε δύο γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα ξ, η στον X . Από το Θεώρημα Hahn-Banach υπάρχουν $\xi^*, \eta^* \in X^*$ με $\xi^*(\xi) = 1$, $\xi^*(\zeta) = 0$ για κάθε $\zeta \notin [\xi]$ και $\eta^*(\eta) = 1$, $\eta^*(\zeta) = 0$ για κάθε $\zeta \notin [\eta]$. Αν ορίσω $T(\zeta) = \xi^*(\zeta)\eta$ και $S(\zeta) = \eta^*(\zeta)\xi$, οι τελεστές T, S είναι φραγμένοι και $T(S(\eta)) = \eta$ ενώ $S(T(\eta)) = 0$.

Παρατήρηση. Μέσω των τελεστών T, S, TS και ST μπορεί κανείς να δει ότι ορίζεται μια αλγεβρική εμφύτευση της άλγεβρας $M_2(\mathbb{C})$ των 2×2 μιγαδικών πινάκων στην $\mathcal{B}(X)$. Με την ίδια μέθοδο μπορεί κανείς να δείξει ότι, αν $\dim(X) \geq n$, τότε η άλγεβρα $M_n(\mathbb{C})$ εμφυτεύεται ισομορφικά στην $\mathcal{B}(X)$.

3

3.1 Κάθε άλγεβρα Banach δρα σε χώρο Banach

Κάθε κλειστή υπάλγεβρα της άλγεβρας Banach $\mathcal{B}(X)$ των φραγμένων τελεστών σ'έναν χώρο Banach X είναι άλγεβρα Banach. Θα δείξουμε ότι, αντίστροφα, κάθε άλγεβρα Banach μπορεί να “αναπαρασταθεί” σ'αυτήν την μορφή.

Ορισμός 3.1 Έστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach. Μία αναπαράσταση ή παράσταση π της \mathcal{A} σ'έναν χώρο Banach X είναι ένας μορφισμός $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(X)$ (δηλαδή μία απεικόνιση που διατηρεί αθροίσματα και γινόμενα). Αν η \mathcal{A} έχει μονάδα, συνήθως απαιτούμε $\pi(\mathbf{1}) = I$. Μία αναπαράσταση ονομάζεται **πιστή** αν είναι 1-1.

Θεώρημα 3.1 Κάθε άλγεβρα Banach δέχεται μία ισομετρική (άρα πιστή) αναπαράσταση σε κάποιον χώρο Banach.

Απόδειξη Θέτω $X = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ και $\|(x, \lambda)\| = \|x\| + |\lambda|$. Είναι εύκολο να δείξει κανείς ότι ο $(X, \|\cdot\|)$ είναι χώρος Banach. Αν $x \in \mathcal{A}$ ορίζω τον τελεστή $\pi(x) :$

$X \rightarrow X$ από την σχέση

$$\pi(x)(y, \lambda) = (xy + x\lambda, 0).$$

Είναι φανερό ότι η απεικόνιση $\pi(x)$ είναι γραμμική, και είναι φραγμένη γιατί

$$\begin{aligned} \|\pi(x)(y, \lambda)\| &= \|(xy + x\lambda, 0)\| = \|xy + x\lambda\| \leq \|xy\| + \|x\lambda\| \\ &\leq \|x\|(\|y\| + |\lambda|) = \|x\|\|(y, \lambda)\|. \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε ορίσει μία απεικόνιση

$$\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(X) : x \rightarrow \pi(x).$$

Η επιμεριστική ιδιότητα δείχνει ότι $\pi(x + y) = \pi(x) + \pi(y)$ και η προσεταιριστική δείχνει ότι $\pi(xy) = \pi(x) \circ \pi(y)$ για κάθε $x, y \in \mathcal{A}$. Η π είναι δηλαδή μορφισμός, και η προηγούμενη ανισότητα δείχνει ότι $\|\pi(x)\| \leq \|x\|$. Επιπλέον όμως έχουμε $\|\pi(x)(0, 1)\| = \|(x, 0)\| = \|x\|$, άρα τελικά

$$\|\pi(x)\| = \|x\|.$$

Επομένως η π είναι πράγματι μία ισομετρική παράσταση της \mathcal{A} στον X . \square

Παρατήρηση 1 Ο κλειστός υπόχωρος $X_1 = \{(x, 0) : x \in \mathcal{A}\}$ του X είναι αναλλοίωτος, δηλαδή $\pi(x)(X_1) \subseteq X_1$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$. Επομένως αν θέσουμε $\pi_1(x) = \pi(x)|_{X_1}$, τότε $\pi_1(x) \in \mathcal{B}(X_1)$ και η απεικόνιση π_1 είναι μία παράσταση της \mathcal{A} στον ‘μικρότερο’ χώρο Banach X_1 . Αν η \mathcal{A} έχει μονάδα, τότε και η π_1 είναι ισομετρική (άρα πιστή). Αν όμως η \mathcal{A} δεν έχει μονάδα, είναι δυνατόν η π_1 να μην είναι πιστή (π.χ. όταν $xy = 0$ για κάθε $y \in \mathcal{A}$, τότε $\pi_1(x) = 0$).

Παρατήρηση 2 Η παράσταση που κατασκευάστηκε στην απόδειξη του Θεωρήματος δεν είναι ποτέ επί της $\mathcal{B}(X)$ (εκτός από την τετριμμένη περίπτωση $\mathcal{A} = \mathbb{C}$). Στην περίπτωση $X = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$, αυτό φαίνεται αμέσως από το γεγονός ότι $\pi(x)(X) \subseteq X_1$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$. Αλλά και στην περίπτωση της π_1 , μπορεί κανείς πάντα να βρει κατάλληλα $x \in \mathcal{A}, y^* \in \mathcal{A}^*$ ώστε ο τελεστής $T \in \mathcal{B}(X_1)$ όπου $T(z) = y^*(z)x$ ($z \in \mathcal{A}$) να μην είναι της μορφής $T(z) = \pi_1(w)z$ για κάποιο $w \in \mathcal{A}$ (άσκηση).

Ειδικότερα αν $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{C}^n)$, ο χώρος $\mathcal{B}(X_1)$ έχει διάσταση n^4 , ενώ η \mathcal{A} έχει διάσταση n^2 .

Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι ο χώρος X που επιλέξαμε είναι εν γένει πολύ ‘μεγάλος’. Έτσι το Θεώρημα έχει περισσότερο θεωρητική αξία παρά πρακτική χρησιμότητα. Αν δοθεί μία συγκεκριμένη άλγεβρα, ενδιαφέρεται κανείς πολλές φορές να βρει τον ‘μικρότερο’ χώρο όπου μπορεί αυτή να δράσει (στο τελευταίο παράδειγμα ο χώρος αυτός είναι προφανώς ο \mathbb{C}^n και όχι ο $\mathcal{B}(\mathbb{C}^n)$).

3.2 Η μοναδοποίηση

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η μονάδα σε μία άλγεβρα Banach παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν όμως πολύ ενδιαφέρουσες άλγεβρες που δεν έχουν μονάδα. Μία απλή κατασκευή επιτρέπει πάντα να 'επισυνάπτουμε' μονάδα σε μία άλγεβρα. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει πολλές φορές (αλλά όχι πάντα) την αναγωγή των προβλημάτων που αφορούν άλγεβρες χωρίς μονάδα σε προβλήματα αλγεβρών με μονάδα.

Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα, ορίζουμε $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$. Ο χώρος \mathcal{A}_1 γίνεται άλγεβρα αν ορίσουμε

$$(x, \lambda)(y, \mu) = (xy + \lambda y + \mu x, \lambda\mu) \quad x, y \in \mathcal{A}, \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

Η \mathcal{A}_1 έχει μονάδα το στοιχείο $(0, 1)$. Ελέγχεται άμεσα ότι το σύνολο $\{(x, 0) : x \in \mathcal{A}\}$ είναι γνήσιο ιδεώδες της \mathcal{A}_1 , και μάλιστα μεγιστικό (δηλ. δεν υπάρχει άλλο γνήσιο ιδεώδες της \mathcal{A}_1 που να το περιέχει), αφού έχει συνδιάσταση 1. Το ιδεώδες αυτό είναι ισόμορφο, ως άλγεβρα, με την \mathcal{A} . (Σημείωσε ότι, ακόμα και αν η \mathcal{A} έχει ήδη μονάδα $\mathbf{1}$, η \mathcal{A} είναι γνήσιο υποσύνολο της \mathcal{A}_1 , και το στοιχείο $(\mathbf{1}, 0)$ δεν είναι μονάδα της \mathcal{A}_1).

Ορίζουμε μία νόρμα $\|\cdot\|_1$ στην \mathcal{A}_1 από τον τύπο

$$\|(x, \lambda)\|_1 = \|x\| + |\lambda|.$$

Όπως είδαμε και στην παράγραφο 3.1, η $\|\cdot\|_1$ είναι πλήρης νόρμα στην \mathcal{A}_1 . Εξάλλου έχουμε

$$\begin{aligned} \|(x, \lambda) \cdot (y, \mu)\|_1 &= \|(xy + \lambda y + \mu x, \lambda\mu)\|_1 = \|xy + \lambda y + \mu x\| + |\lambda\mu| \\ &\leq \|x\|\|y\| + |\lambda|\|y\| + |\mu|\|x\| + |\lambda||\mu| \\ &= (\|x\| + |\lambda|)(\|y\| + |\mu|) = \|(x, \lambda)\|_1 \|(y, \mu)\|_1, \end{aligned}$$

επομένως η $(\mathcal{A}_1, \|\cdot\|_1)$ είναι άλγεβρα Banach. Τέλος, επειδή $\|(x, 0)\| = \|x\|$ όταν $x \in \mathcal{A}$, η εμφύτευση της \mathcal{A} στην \mathcal{A}_1 είναι ισομετρική.

Δείξαμε λοιπόν ότι

Πρόταση 3.2 *Κάθε άλγεβρα Banach \mathcal{A} εμφυτεύεται ισομορφικά και ισομετρικά ως μεγιστικό ιδεώδες σε μία άλγεβρα Banach \mathcal{A}_1 με μονάδα. Η \mathcal{A}_1 λέγεται η μοναδοποίηση της \mathcal{A} .*

Παρατήρηση Η επιλογή της νόρμας στην \mathcal{A}_1 δεν είναι μοναδική. Παραδείγματος χάριν:

Πρόταση 3.3 Αν η \mathcal{A} δεν έχει μονάδα και π είναι μία ισομετρική παράσταση της \mathcal{A} σε κάποιον χώρο Banach X , τότε η \mathcal{A}_1 είναι ισόμορφη, ως άλγεβρα, με την υπάλγεβρα $\mathcal{B} := \pi(\mathcal{A}) + \mathbb{C}I$ της $\mathcal{B}(X)$, μέσω της απεικόνισης

$$(x, \lambda) \longrightarrow \pi(x) + \lambda I.$$

Αν λοιπόν “μεταφέρουμε” την νόρμα της $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}(X)$ στην \mathcal{A}_1 , θέτοντας

$$\|(x, \lambda)\|_{\pi} := \|\pi(x) + \lambda I\|$$

τότε η $\|\cdot\|_{\pi}$ είναι μία νέα νόρμα στην \mathcal{A}_1 η οποία είναι ισοδύναμη με την $\|\cdot\|_1$.

Απόδειξη Ο $\pi(\mathcal{A})$ είναι πλήρης, άρα κλειστός υπόχωρος του $\mathcal{B}(X)$ και $I \notin \pi(\mathcal{A})$. Αν ονομάσουμε δ την (θετική) απόσταση του I από τον $\pi(\mathcal{A})$, παρατηρούμε ότι

$$\|\pi(x) + \lambda I\| \geq |\lambda|\delta \quad \text{για κάθε } (x, \lambda). \quad (*)$$

Επομένως αν $\pi(x) + \lambda I = 0$ τότε $\lambda = 0$ και συνεπώς $\pi(x) = 0$ άρα $x = 0$. Αυτό δείχνει ότι η $\|\cdot\|_{\pi}$ είναι πράγματι νόρμα στην \mathcal{A}_1 .

Επίσης, αν μια ακολουθία (y_n) (όπου $y_n = (x_n, \lambda_n)$) συγκλίνει ως προς την $\|\cdot\|_{\pi}$, τότε από την ανισότητα (*) προκύπτει ότι η (λ_n) είναι βασική (στο \mathbb{C}), άρα και η $(\pi(x_n)) = (\pi(y_n) - \lambda_n I)$ είναι βασική στην $\mathcal{B}(X)$, και συνεπώς η (x_n) (είναι βασική, άρα) συγκλίνει στην \mathcal{A} (αφού η π είναι ισομετρία), άρα τελικά η (y_n) συγκλίνει ως προς την $\|\cdot\|_1$.

Αντίστροφα, αν μια ακολουθία (y_n) συγκλίνει ως προς την $\|\cdot\|_1$, τότε συγκλίνει και ως προς την $\|\cdot\|_{\pi}$, όπως προκύπτει από την ανισότητα

$$\|\pi(x) + \lambda I\| \leq \|\pi(x)\| + |\lambda| = \|x\| + |\lambda| = \|(x, \lambda)\|_1.$$

Συνεπώς οι δύο νόρμες $\|\cdot\|_{\pi}$ και $\|\cdot\|_1$ στην \mathcal{A}_1 είναι ισοδύναμες. \square

Στην περίπτωση που η π είναι η παράσταση που κατασκευάστηκε στην παράγραφο 3.1, η νόρμα $\|\cdot\|_{\pi}$ είναι στην πραγματικότητα ίση με την $\|\cdot\|_1$. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως θα δούμε αργότερα, όπου άλλες επιλογές της $\|\cdot\|_{\pi}$ είναι πιο χρήσιμες. Παραδείγματος χάριν, αν η \mathcal{A} είναι άλγεβρα τελεστών, τότε η φυσιολογική επιλογή νόρμας στην μοναδοποίηση είναι η $\|\cdot\|_{\pi}$ όπου π η ταυτοτική παράσταση της \mathcal{A} .

4 Η ομάδα των αντιστρεψίμων στοιχείων

Έστω \mathcal{A} άλγεβρα με μονάδα $\mathbf{1}$. Ένα στοιχείο $x \in \mathcal{A}$ λέγεται **αντιστρέψιμο** αν υπάρχει $y \in \mathcal{A}$ ώστε $xy = \mathbf{1} = yx$ (και οι δύο ισότητες είναι αναγκαίες). Το y , αν υπάρχει, είναι μοναδικό και συμβολίζεται x^{-1} . Το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων της \mathcal{A} είναι (εν γένει μη αβελιανή) ομάδα (ως προς το γινόμενο) και συμβολίζεται $\text{Inv}(\mathcal{A})$.

Στόχος αυτής της παραγράφου είναι να αποδείξουμε ότι το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων μίας άλγεβρας Banach \mathcal{A} με μονάδα είναι ανοικτό υποσύνολο της \mathcal{A} και ότι αποτελεί τοπολογική ομάδα (στην τοπολογία της νόρμας).

Το απλό αλλά θεμελιώδες Λήμμα 4.1 που ακολουθεί δείχνει ότι, σε μία άλγεβρα Banach, κάθε γεωμετρική σειρά, με ‘λόγο’ μικρότερο από ένα, συγκλίνει. Η απόδειξη χρησιμοποιεί την έννοια της απόλυτης σύγκλισης. Θυμίζω ότι μία σειρά $\sum x_n$ σ’έναν χώρο Banach συγκλίνει απόλυτα εξ ορισμού όταν η σειρά μη αρνητικών αριθμών $\sum \|x_n\|$ συγκλίνει. Μία απλή εφαρμογή της πληρότητας δείχνει ότι, αν μία σειρά συγκλίνει απόλυτα, τότε συγκλίνει.

Λήμμα 4.1 Αν $x \in \mathcal{A}$ και $\|x\| < 1$ τότε το $(\mathbf{1} - x)^{-1}$ υπάρχει.

Απόδειξη Εφ’όσον $\|x^n\| \leq \|x\|^n$ και $\|x\| < 1$, είναι σαφές ότι η σειρά $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ συγκλίνει απόλυτα. Έστω y το άθροισμά της. Παρατηρούμε ότι

$$\mathbf{1} - x^{n+1} = (\mathbf{1} - x)(\mathbf{1} + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n) = (\mathbf{1} + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n)(\mathbf{1} - x).$$

Καθώς $n \rightarrow \infty$, έχουμε $x^{n+1} \rightarrow 0$ επομένως

$$\mathbf{1} = (\mathbf{1} - x)y = y(\mathbf{1} - x)$$

πράγμα που δείχνει ότι το y είναι το αντίστροφο του $\mathbf{1} - x$. \square

Το Λήμμα πολλές φορές διατυπώνεται ισοδύναμα ως εξής:

“Αν $\|\mathbf{1} - a\| < 1$ τότε το a^{-1} υπάρχει.”

Θεώρημα 4.2 Έστω $\text{Inv}(\mathcal{A})$ το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων μίας άλγεβρας Banach \mathcal{A} . Τότε

(i) το σύνολο $\text{Inv}(\mathcal{A})$ είναι ανοικτό,

(ii) η απεικόνιση $b \mapsto b^{-1} : \text{Inv}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Inv}(\mathcal{A})$ είναι συνεχής (άρα ομοιομορφισμός).

Απόδειξη (i) Πρέπει να δείξουμε ότι αν $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ τότε, για κάθε x με αρκετά μικρή νόρμα, ισχύει $a + x \in \text{Inv}(\mathcal{A})$. Γράφουμε $a + x = a(\mathbf{1} + a^{-1}x)$. Από το Λήμμα 4.1, αν $\|a^{-1}x\| < 1$ τότε το $(\mathbf{1} + a^{-1}x)$ είναι αντιστρέψιμο, άρα και το $a + x$ είναι αντιστρέψιμο. Επομένως αν $\|x\| < 1/\|a^{-1}\|$ τότε $a + x \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ και συνεπώς η ανοικτή μπάλα με κέντρο a και ακτίνα $\|a^{-1}\|^{-1}$ περιέχεται στο $\text{Inv}(\mathcal{A})$.

(ii) Αυτό είναι άμεσο από το επόμενο Λήμμα

Λήμμα 4.3 Αν $b \in \text{Inv}(\mathcal{A})$, $y \in \mathcal{A}$ και $\|y\| < (2\|b^{-1}\|)^{-1}$, τότε $b - y \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ και

$$\|(b - y)^{-1} - b^{-1}\| < 2\|b^{-1}\|^2 \cdot \|y\|$$

Απόδειξη Επειδή $\|yb^{-1}\| \leq \|y\|\|b^{-1}\| < 1$ το $\mathbf{1} - yb^{-1}$ είναι αντιστρέψιμο, άρα και το $b - y = (\mathbf{1} - yb^{-1})b$ είναι αντιστρέψιμο. Έχουμε

$$(b - y)^{-1} - b^{-1} = b^{-1}((\mathbf{1} - yb^{-1})^{-1} - \mathbf{1})$$

Αλλά

$$(\mathbf{1} - yb^{-1})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (yb^{-1})^n$$

άρα

$$(b - y)^{-1} - b^{-1} = b^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} (yb^{-1})^n$$

επομένως

$$\|(b - y)^{-1} - b^{-1}\| \leq \|b^{-1}\| \sum_{n=1}^{\infty} \|yb^{-1}\|^n = \|b^{-1}\| \frac{\|yb^{-1}\|}{1 - \|yb^{-1}\|} < 2\|b^{-1}\| \|yb^{-1}\|$$

γιατί $1 - \|yb^{-1}\| > \frac{1}{2}$. □

5 Το φάσμα

5.1 Ορισμοί και βασικές ιδιότητες

Αν T είναι γραμμικός τελεστής σ'έναν γραμμικό χώρο X πεπερασμένης διάστασης, τότε το σύνολο $\sigma(T) \equiv \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \notin \text{Inv}(\mathcal{B}(X))\}$ είναι το σύνολο των ιδιοτιμών του T , δηλαδή το σύνολο των ριζών του *χαρακτηριστικού πολωνώμου* $\det(\lambda I - T)$ του T . Επειδή ο χώρος X είναι, όπως έχουμε εξ αρχής

υποθέσει, *μγαδικός*, έπεται από το *θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας* ότι το $\sigma(T)$ δεν είναι κενό.

Οι συλλογισμοί αυτοί δεν γενικεύονται άμεσα σε απειροδιάστατους χώρους. Πρώτα-πρώτα, η “ορίζουσα” ενός τελεστή δεν έχει έννοια εν γένει. Επίσης όμως, το σύνολο των ιδιοτιμών ενός τελεστή μπορεί να είναι κενό:

Παράδειγμα Αν X είναι ο χώρος Banach $C([0, 1])$ και M είναι ο τελεστής που ορίζεται από την σχέση $(Mf)(t) = tf(t)$, $f \in X$, τότε ο M είναι φραγμένος τελεστής και δεν έχει ιδιοτιμές. Αν όμως ορίσουμε

$$\sigma(M) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - M \notin \text{Inv}(\mathcal{B}(X))\}$$

τότε το $\sigma(M)$ δεν είναι κενό (μάλιστα ισούται με το συμπαγές $[0, 1]$).

(Οι αποδείξεις των ισχυρισμών αυτών αφήνονται στον αναγνώστη.)

Θα δείξουμε ότι το φάσμα $\sigma(T)$ κάθε φραγμένου τελεστή T σ'έναν χώρο Banach είναι πάντα μη κενό συμπαγές υποσύνολο του \mathbb{C} .

Ορισμός 5.1 Έστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach με μονάδα και $x \in \mathcal{A}$. Το **φάσμα** $\sigma(x)$ του x είναι το σύνολο

$$\sigma(x) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda \mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{A})\}.$$

Αν η \mathcal{A} δεν έχει μονάδα, τότε το $\sigma(x)$ ορίζεται στην μοναδοποίηση

$$\sigma(x) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda \mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{A}^+)\}.$$

Παρατήρηση Αν \mathcal{A} είναι άλγεβρα Banach χωρίς μονάδα και $x \in \mathcal{A}$, τότε $0 \in \sigma(x)$ (γιατί:).

Θεώρημα 5.1 Το φάσμα κάθε στοιχείου a της \mathcal{A} είναι μη κενό συμπαγές υποσύνολο του \mathbb{C} .

Απόδειξη Δείχνουμε πρώτα ότι το $\sigma(a)$ είναι φραγμένο. Πράγματι, αν $|\lambda| > \|a\|$ τότε $\|\lambda^{-1}a\| < 1$ άρα από το Λήμμα 4.1 το $\lambda \mathbf{1} - a = \lambda(\mathbf{1} - \lambda^{-1}a)$ έχει αντίστροφο. Επομένως το $\sigma(a)$ περιέχεται στην κλειστή μπάλα με κέντρο 0 και ακτίνα $\|a\|$.

Δείχνουμε τώρα ότι το συμπλήρωμά του $\sigma(a)$ είναι ανοικτό. Αν $\lambda \notin \sigma(a)$ τότε $\lambda \mathbf{1} - a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$. Αλλά το $\text{Inv}(\mathcal{A})$ είναι ανοικτό (4.2), επομένως υπάρχει $\epsilon > 0$ ώστε κάθε $b \in \mathcal{A}$ με $\|b - (\lambda \mathbf{1} - a)\| < \epsilon$ να ανήκει στο $\text{Inv}(\mathcal{A})$. Άρα αν $|\mu - \lambda| <$

ε τότε $\mu\mathbf{1} - a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ οπότε $\mu \notin \sigma(a)$. (Άλλη απόδειξη: το $\mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ είναι ανοικτό γιατί είναι η αντίστροφη εικόνα του ανοικτού συνόλου $\text{Inv}(\mathcal{A})$ μέσω της συνεχούς συνάρτησης $\lambda \mapsto \lambda\mathbf{1} - a$.)

Για να δείξουμε ότι $\sigma(a) \neq \emptyset$ παρατηρούμε πρώτα ότι αν $\lambda, \mu \notin \sigma(a)$ τότε

$$(\lambda\mathbf{1} - a)^{-1} - (\mu\mathbf{1} - a)^{-1} = (\mu - \lambda)(\lambda\mathbf{1} - a)^{-1}(\mu\mathbf{1} - a)^{-1}$$

(πολλαπλασίασε και τα δύο μέλη της ισότητας με $(\lambda\mathbf{1} - a)(\mu\mathbf{1} - a)$, παρατηρώντας ότι όλοι οι όροι μετατίθενται).³

Έστω τώρα $\phi \in \mathcal{A}^*$ (ο δυικός του χώρου Banach \mathcal{A}).

Θέτουμε $f(\lambda) = \phi[(\lambda\mathbf{1} - a)^{-1}]$.

Η f ορίζεται και είναι ολόμορφη στο ανοικτό σύνολο $\mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ γιατί το όριο

$$\begin{aligned} f'(\lambda) &= \lim_{\mu \rightarrow \lambda} \frac{f(\mu) - f(\lambda)}{\mu - \lambda} \\ &= \lim_{\mu \rightarrow \lambda} \phi \left(\frac{(\mu\mathbf{1} - a)^{-1} - (\lambda\mathbf{1} - a)^{-1}}{\mu - \lambda} \right) \\ &= \lim_{\mu \rightarrow \lambda} \phi \left(-(\lambda\mathbf{1} - a)^{-1}(\mu\mathbf{1} - a)^{-1} \right) \\ &= -\phi(\lambda\mathbf{1} - a)^{-2} \end{aligned}$$

υπάρχει. Παρατήρησε ότι εδώ (και παρακάτω) χρησιμοποιούμε την συνέχεια της αντιστροφής (Λήμμα 4.2 (ii)) καθώς και την συνέχεια της ϕ .

Αν το $\sigma(a)$ ήταν κενό, η f θα ήταν ακέραια. Εξάλλου

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} |f(\lambda)| = \lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\lambda|} \phi \left[\left(\mathbf{1} - \frac{a}{\lambda} \right)^{-1} \right] = 0.$$

Επομένως η f θα ήταν ακέραια και φραγμένη, άρα σταθερή από το θεώρημα του Liouville ([8], 5.13). Εφόσον μάλιστα έχει όριο 0 καθώς $|\lambda| \rightarrow \infty$ θα έπρεπε να μηδενίζεται παντού. Από το Θεώρημα Hahn-Banach όμως υπάρχει ϕ ώστε $\phi(-a^{-1}) \neq 0$, δηλαδή $f(0) \neq 0$, άτοπο. \square

Σημείωσε ότι στην απόδειξη χρησιμοποιήθηκε κατά ουσιώδη τρόπο η υπόθεση ότι η \mathcal{A} είναι *μγαδική άλγεβρα*.

Θεώρημα 5.2 (Gelfand-Mazur) *Κάθε μγαδική δισμετρική άλγεβρα Banach είναι ισομετρικά ισόμορφη με το \mathbb{C} .*

³ η σχέση αυτή ονομάζεται **ταυτότητα του επιλύοντα (resolvent identity)**.

Απόδειξη Αν $a \in \mathcal{A}$, υπάρχει ένα λ στο $\sigma(a)$. Αλλά σε μία διαιρετική άλγεβρα \mathcal{A} , κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο. Αφού το $\lambda \mathbf{1} - a$ δεν είναι αντιστρέψιμο, θα ισούται με 0, δηλαδή $a = \lambda \mathbf{1}$. Επομένως η \mathcal{A} αποτελείται από πολλαπλάσια της μονάδας. Είναι σαφές ότι

$$\|a\| = \|\lambda \mathbf{1}\| = |\lambda|$$

και η απεικόνιση $a \mapsto \lambda$ όπου $a = \lambda \mathbf{1}$ είναι ισομετρικός ισομορφισμός. \square

Παρατήρηση Η μεταθετικότητα της άλγεβρας δεν προϋποτίθεται, αλλά είναι ένα από τα συμπεράσματα του Θεωρήματος.

Η **φασματική ακτίνα** $\rho(a)$ ενός στοιχείου $a \in \mathcal{A}$ ορίζεται από τη σχέση

$$\rho(a) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}.$$

Επεται από την απόδειξη του Θεωρήματος 5.1 ότι

$$\rho(a) \leq \|a\|, \quad (2)$$

και η ανισότητα μπορεί να είναι γνήσια (π.χ. όταν $a^2 = 0$ τότε $\sigma(a) = \{0\}$, άρα $\rho(a) = 0$).

Το φάσμα, και επομένως η φασματική ακτίνα, ενός στοιχείου ορίζονται καθαρά αλγεβρικά. Το επόμενο θεώρημα εκφράζει την φασματική ακτίνα συναρτήσει της νόρμας, συνδέει δηλαδή μία καθαρά αλγεβρική ποσότητα με μία τοπολογική. Η έκφραση αυτή θυμίζει τον τύπο

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

για την ακτίνα σύγκλισης R της (αριθμητικής) δυναμοσειράς $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$.

Θεώρημα 5.3 Αν \mathcal{A} είναι άλγεβρα Banach και $a \in \mathcal{A}$,

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Απόδειξη Επειδή πάντα ισχύει $\inf \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \underline{\lim} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$, αρκεί να δείξουμε ότι

$$(i) \quad \rho(a) \leq \inf \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \quad \text{και ότι} \quad (ii) \quad \overline{\lim} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \rho(a).$$

(i) Αν $\lambda \in \sigma(a)$ τότε για κάθε $n \in \mathbb{N}$ έχουμε $\lambda^n \in \sigma(a^n)$ (δες το Λήμμα 5.4 που ακολουθεί) άρα $|\lambda|^n \leq \|a^n\|$ (Θεώρημα 5.1). Επομένως $|\lambda| \leq \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$. Παίρνοντας maximum ως προς $\lambda \in \sigma(a)$, έχουμε $\rho(a) \leq \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Εστω $\phi \in \mathcal{A}^*$. Όπως στην απόδειξη του θεωρήματος 5.1, η συνάρτηση $h(\lambda) = \lambda\phi[(\lambda\mathbf{1} - a)^{-1}]$ ορίζεται και είναι ολόμορφη στο $\mathbb{C} \setminus \sigma(a)$, άρα και στο $\{\lambda : |\lambda| > \rho(a)\}$. Δηλαδή η συνάρτηση

$$g(z) = h\left(\frac{1}{z}\right) = \phi((\mathbf{1} - za)^{-1})$$

ορίζεται και είναι ολόμορφη στο $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < \frac{1}{\rho(a)}\}$.⁴ Επειδή το όριο $\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = g(0) \in \mathbb{C}$, (το 0 είναι επουσιώδης ανωμαλία για την g , άρα) η g ορίζεται και είναι ολόμορφη στον δίσκο $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \frac{1}{\rho(a)}\}$, επομένως αναπτύσσεται σε δυναμοσειρά

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \quad |z| < \frac{1}{\rho(a)}.$$

Ισχυρίζομαι ότι $c_n = \phi(a^n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Πράγματι, για $|z| < \frac{1}{\|a\|}$ ($\leq \frac{1}{\rho(a)}$) ξέρουμε από το Λήμμα 4.1 ότι

$$(\mathbf{1} - za)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n a^n.$$

άρα, αφού η ϕ είναι γραμμική και συνεχής,

$$g(z) = \phi((\mathbf{1} - za)^{-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \phi(a^n), \quad |z| < \frac{1}{\|a\|}.$$

Ο Ισχυρισμός έπεται τώρα από την μοναδικότητα της δυναμοσειράς για την g .

Επομένως η σειρά $\sum_{n=0}^{\infty} z^n \phi(a^n)$ συγκλίνει (όχι μόνον όταν $|z| < \frac{1}{\|a\|}$ αλλά και) όταν $|z| < \frac{1}{\rho(a)}$. Κατά συνέπεια, για $|z| < \frac{1}{\rho(a)}$ έχουμε $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n \phi(a^n) = 0$. Επομένως η ακολουθία αυτή είναι φραγμένη, δηλαδή για κάθε $\phi \in \mathcal{A}^*$ υπάρχει $K_\phi < +\infty$ ώστε

$$|\phi(z^n a^n)| < K_\phi \quad \text{για κάθε } n.$$

⁴ Εδώ θέτουμε $\frac{1}{\rho(a)} = +\infty$ όταν $\rho(a) = 0$.

Από το Θεώρημα Ομοιομόρφου Φράγματος ([9], 3.42) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μια σταθερά K (ανεξάρτητη της ϕ) τέτοια ώστε για κάθε n και κάθε z με $|z| < \frac{1}{\rho(a)}$, να ισχύει $\|z^n a^n\| < K$, δηλαδή

$$\|a^n\|^{\frac{1}{n}} < \frac{K^{\frac{1}{n}}}{|z|}.$$

Επομένως $\overline{\lim} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{|z|}$ για κάθε $|z| < \frac{1}{\rho(a)}$, οπότε

$$\overline{\lim} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \rho(a)$$

και η απόδειξη είναι πλήρης. \square

Παρατηρήσεις (i) Η ύπαρξη του ορίου $\lim \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$ μπορεί να αποδειχθεί απευθείας από την ανισότητα $\|xy\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ (άσκηση).

(ii) Το θεώρημα που αποδείξαμε ονομάζεται συχνά Θεώρημα Gelfand - Beurling. Ο A. Beurling φέρεται ότι ανακάλυψε πρώτος τον τύπο της φασματικής ακτίνας στην Αρμονική Ανάλυση, ενώ ο I. Gelfand είναι αυτός που έδωσε την απόδειξη στην γενική περίπτωση.

Για την περίπτωση της άλγεβρας Banach $L^1(\mathbb{T})$ ο τύπος της φασματικής ακτίνας ισοδυναμεί (όπως θα δούμε αργότερα) με την ισότητα

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f^{(*n)}(e^{it})| dt = \sup_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|$$

όπου $f^{(*n)} = f * f * \dots * f$ και

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{-ikt} dt.$$

Στην απόδειξη του Θεωρήματος 5.3 χρησιμοποιήσαμε το

Λήμμα 5.4 $\lambda \in \sigma(x) \implies \lambda^n \in \sigma(x^n)$.

Απόδειξη Εστω ότι $\lambda^n \notin \sigma(x^n)$. Εχουμε τότε

$$(x^n - \lambda^n \mathbf{1})^{-1} (x - \lambda \mathbf{1}) (x^{n-1} + x^{n-2} \lambda + \dots + \lambda^{n-1} \mathbf{1}) = \mathbf{1}$$

άρα, επειδή όλοι οι όροι μετατίθενται,

$$\begin{aligned} \mathbf{1} &= [(x^n - \lambda^n \mathbf{1})^{-1} (x^{n-1} + x^{n-2} \lambda + \dots + \lambda^{n-1} \mathbf{1})] (x - \lambda \mathbf{1}) \\ &= (x - \lambda \mathbf{1}) [(x^n - \lambda^n \mathbf{1})^{-1} (x^{n-1} + x^{n-2} \lambda + \dots + \lambda^{n-1} \mathbf{1})]. \end{aligned}$$

Η πρώτη ισότητα δείχνει ότι το $x - \lambda \mathbf{1}$ έχει αριστερά αντίστροφο και η δεύτερη ότι έχει δεξιά αντίστροφο. Συνεπώς $(x - \lambda \mathbf{1}) \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ δηλαδή $\lambda \notin \sigma(x)$. \square

5.2 Εξάρτηση του φάσματος από την άλγεβρα

Εστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach με μονάδα και \mathcal{B} κλειστή υπάλγεβρα της \mathcal{A} με $\mathbf{1} \in \mathcal{B}$. Εστω $x \in \mathcal{B}$. Αν $x \in \text{Inv}(\mathcal{B})$, τότε βέβαια $x \in \text{Inv}(\mathcal{A})$. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει κατ'ανάγκη:

Παράδειγμα Εστω $\mathcal{A} = C(\mathbb{T})$, $\mathcal{B} = A(\mathbb{D})$ (Παράγραφος 2.5). Αν $x \in \mathcal{B}$ είναι η συνάρτηση $x(z) = z$ ($z \in \mathbb{T}$), τότε $x^{-1} \in \mathcal{A}$ αλλά $x^{-1} \notin \mathcal{B}$, γιατί η (συνεχής) συνάρτηση $z \rightarrow z^{-1}$ ($z \in \mathbb{T}$) δεν δέχεται ολόμορφη επέκταση στον δίσκο.

Επομένως αν θέσουμε

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathcal{A}}(x) &= \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda \mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{A})\} \\ \sigma_{\mathcal{B}}(x) &= \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda \mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{B})\}\end{aligned}$$

τότε από τα προηγούμενα είναι σαφές ότι

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(x)$$

και ότι εν γένει δεν ισχύει ισότητα. Δηλαδή καθώς η \mathcal{B} “μικραίνει”, το $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ “μεγαλώνει”. Ομως το $\sup\{|\lambda| : \lambda \mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{B})\}$ δεν μεταβάλλεται, γιατί (όπως φαίνεται από τον τύπο της φασματικής ακτίνας (5.3)) εξαρτάται μόνον από την $\|x\|$, και όχι από την \mathcal{B} . Θα δείξουμε μάλιστα ότι το $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ προκύπτει από το $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ “γεμίζοντας” κάποιες από τις “τρύπες” του $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$.

Θα χρειασθεί ένα τοπολογικό λήμμα. Θυμίζω ότι (συνεκτική) συνιστώσα σ'έναν τοπολογικό χώρο λέγεται ένα μεγιστικό συνεκτικό υποσύνολο του χώρου. Το σύνορο ενός υποσυνόλου V συμβολίζεται ∂V .

Λήμμα 5.5 Εστω X τοπολογικός χώρος, $V \subseteq W \subseteq X$ ανοικτά σύνολα ώστε $\partial V \cap W = \emptyset$. Τότε το V είναι ένωση συνεκτικών συνιστωσών του W .

Απόδειξη Θα δείξω ότι κάθε συνιστώσα Ω του W που τέμνει το V περιέχεται σ'αυτό. Πράγματι, αν $U = X \setminus \bar{V}$, τα U, V είναι ξένα ανοικτά σύνολα και το Ω περιέχεται στην ένωσή τους, γιατί

$$\Omega \subseteq V \cup (X \setminus V) = V \cup (X \setminus \bar{V}) \cup \partial V = V \cup U \cup \partial V$$

αλλά $\Omega \subseteq W$, άρα $\Omega \cap \partial V = \emptyset$.

Αφού το Ω είναι συνεκτικό και $\Omega \cap V \neq \emptyset$, θα ισχύει ότι $\Omega \cap U = \emptyset$, άρα $\Omega \subseteq V$.

Επεται ότι

$$V = \bigcup \{\Omega \subseteq W \text{ συνεκτική συνιστώσα} : V \cap \Omega \neq \emptyset\}$$

γιατί κάθε $x \in V \subseteq W$ περιέχεται σε μία συνιστώσα του W . \square

Θεώρημα 5.6 *Εστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach με μονάδα και \mathcal{B} κλειστή υπάλγεβρα της \mathcal{A} με $\mathbf{1} \in \mathcal{B}$. Τότε*

(i) $\text{Inv}(\mathcal{B}) = \bigcup \{U \subseteq (\mathcal{B} \cap \text{Inv}(\mathcal{A})) \text{ συνεκτική συνιστώσα} : U \cap \text{Inv}(\mathcal{B}) \neq \emptyset\}$.

(ii) *Αν $x \in \mathcal{B}$, τότε το $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ είναι ένωση του $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ και κάποιων από τις φραγμένες συνεκτικές συνιστώσες του $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$. Συγκεκριμένα, αν \mathcal{C} είναι το σύνολο των συνεκτικών συνιστωσών του $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$, τότε*

$$\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x) \cup \bigcup \{V \in \mathcal{C} : V \cap \sigma_{\mathcal{B}}(x) \neq \emptyset\}.$$

Απόδειξη (i) Εφαρμόζουμε το Λήμμα στον τοπολογικό χώρο $X = \mathcal{B}$ για τα ανοικτά σύνολα $V = \text{Inv}(\mathcal{B})$ και $W = \mathcal{B} \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$. Αρκεί να δείξουμε ότι $\partial V \cap W = \emptyset$.

Αν $y \in \partial V \cap W$, υπάρχουν $x_n \in V$ ώστε $\|x_n - y\| \rightarrow 0$. Επειδή $x_n \in \text{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A})$ και $y \in \text{Inv}(\mathcal{A})$, έπεται από την συνέχεια της $a \rightarrow a^{-1}$ στο $\text{Inv}(\mathcal{A})$ ότι $\|x_n^{-1} - y^{-1}\| \rightarrow 0$. Αυτό όμως αντιφάσκει με τον επόμενο ισχυρισμό:

Ισχυρισμός $\|x_n^{-1}\| \rightarrow \infty$

Απόδειξη Αν όχι, η (x_n^{-1}) θα είχε μία φραγμένη υπακολουθία, έστω (y_n^{-1}) . Αν $M = \sup \|y_n^{-1}\|$, υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $\|y_n - y\| < 1/M$. Τότε όμως $\|1 - y_n^{-1}y\| \leq \|y_n^{-1}\| \cdot \|y_n - y\| < 1$, οπότε $y_n^{-1}y \in \text{Inv}(\mathcal{B})$ (Λήμμα 4.1) άρα και $y \in \text{Inv}(\mathcal{B}) = V$. Αυτό όμως αποκλείεται, γιατί $y \in \partial V$ ενώ το V είναι ανοικτό. Ο Ισχυρισμός αποδείχθηκε.

(ii) Θέτουμε $\Omega_{\mathcal{A}} = \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$, $\Omega_{\mathcal{B}} = \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{B}}(x)$. Τα $\Omega_{\mathcal{A}}, \Omega_{\mathcal{B}}$ είναι ανοικτά υποσύνολα του \mathbb{C} και $\Omega_{\mathcal{B}} \subseteq \Omega_{\mathcal{A}}$. Επίσης $\partial\Omega_{\mathcal{B}} \cap \Omega_{\mathcal{A}} = \emptyset$ γιατί αν $\lambda \in \partial\Omega_{\mathcal{B}}$ τότε $\lambda\mathbf{1} - x \in \partial\text{Inv}(\mathcal{B})$ οπότε, από την απόδειξη του (i), $\lambda\mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{A})$ δηλαδή $\lambda \notin \Omega_{\mathcal{A}}$.

Από το Λήμμα, το $\Omega_{\mathcal{B}}$ θα είναι ένωση κάποιων από τις συνεκτικές συνιστώσες του $\Omega_{\mathcal{A}}$:

$$\begin{aligned} \Omega_{\mathcal{B}} &= \bigcup \{V \subseteq \Omega_{\mathcal{A}} \text{ συνεκτική συνιστώσα} : V \cap \Omega_{\mathcal{B}} \neq \emptyset\} \\ &= \bigcup \{V \in \mathcal{C} : V \cap \Omega_{\mathcal{B}} \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

Συνεπώς το $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ θα αποτελείται από το $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ και τις υπόλοιπες συνεκτικές συνιστώσες του $\Omega_{\mathcal{A}}$:

$$\begin{aligned} \sigma_{\mathcal{B}}(x) &= \sigma_{\mathcal{A}}(x) \cup (\sigma_{\mathcal{B}}(x) \cap \Omega_{\mathcal{A}}) \\ &= \sigma_{\mathcal{A}}(x) \cup \bigcup \{V \in \mathcal{C} : V \cap \Omega_{\mathcal{B}} \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

Παρατήρησε τέλος ότι στο $\sigma_B(x)$ περιέχονται μόνον φραγμένες συνιστώσες του Ω_A , γιατί, αφού το $\sigma_B(x)$ είναι φραγμένο, η (μοναδική) μη φραγμένη συνιστώσα του Ω_A δεν μπορεί να περιέχεται στο $\sigma_B(x)$, συνεπώς περιέχεται στο Ω_B . \square

Πόρισμα 5.7 Αν $x \in \mathcal{B}$ και το $\sigma_A(x)$ δεν χωρίζει το επίπεδο (δηλαδή αν το $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(x)$ είναι συνεκτικό), τότε $\sigma_B(x) = \sigma_A(x)$.

Απόδειξη Στην περίπτωση αυτή το $\mathbb{C} \setminus \sigma_A(x)$ δεν έχει φραγμένες συνιστώσες, άρα δεν τέμνει το $\sigma_B(x)$. \square

Πόρισμα 5.8 Με τις υποθέσεις του θεωρήματος,

$$\partial\sigma_B(x) \subseteq \sigma_A(x) \subseteq \sigma_B(x).$$

Απόδειξη Οι συνιστώσες του ανοικτού συνόλου $\Omega_A = \mathbb{C} \setminus \sigma_A(x)$ είναι ανοικτά σύνολα (γιατί αν $V \subseteq \Omega_A$ είναι συνιστώσα και $\lambda \in V$, διαλέγοντας $\varepsilon > 0$ ώστε $S(\lambda, \varepsilon) \subseteq \Omega_A$ παρατηρούμε ότι το $V \cup S(\lambda, \varepsilon)$ είναι συνεκτικό και συνεπώς περιέχεται στο V). Επομένως η ένωση

$$\bigcup \{V \in \mathcal{C} : V \cap \sigma_B(x) \neq \emptyset\}$$

είναι ανοικτό υποσύνολο του $\sigma_B(x)$, άρα δεν τέμνει το σύνορο του. Συνεπώς $\partial\sigma_B(x) \subseteq \sigma_A(x)$.

Ας δώσουμε και μία απευθείας απόδειξη του Πορίσματος:

Εστω $\lambda \in \partial\sigma_B(x)$. Τότε υπάρχει ακολουθία (λ_n) στο $\mathbb{C} \setminus \sigma_B(x)$ ώστε $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Αν $\lambda \notin \sigma_A(x)$ τότε το $(\lambda \mathbf{1} - x)^{-1}$ υπάρχει στην \mathcal{A} οπότε, από τη συνέχεια της αντιστροφής (4.2(ii)), η ακολουθία $((\lambda_n \mathbf{1} - x)^{-1})$ συγκλίνει στο $(\lambda \mathbf{1} - x)^{-1}$ στην \mathcal{A} . Αυτό σημαίνει ότι η $((\lambda_n \mathbf{1} - x)^{-1})$ είναι βασική ακολουθία στοιχείων της B , άρα συγκλίνει στην B στο ίδιο όριο $(\lambda \mathbf{1} - x)^{-1}$, πράγμα που αντιβαίνει στο γεγονός ότι $\lambda \in \sigma_B(x)$. \square

Πόρισμα 5.9 Αν $x \in \mathcal{B}$ και το $\sigma_B(x)$ έχει κενό εσωτερικό, τότε $\sigma_B(x) = \sigma_A(x)$.

Απόδειξη Αν το $\sigma_B(b)$ έχει κενό εσωτερικό, τότε $\partial\sigma_B(b) = \sigma_B(b)$. \square

Παρατήρηση Εστω \mathcal{B} άλγεβρα Banach με μονάδα και $x \in \mathcal{B}$. Αν το $\sigma_B(x)$ δεν χωρίζει το επίπεδο, τότε το φάσμα του x δεν “μεγαλώνει” καθώς “μικραίνει”

η άλγεβρα ως προς την οποία υπολογίζεται (5.7). Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν $\sigma_{\mathbb{B}}(x) \subseteq \mathbb{R}$ ή όταν $\sigma_{\mathbb{B}}(x) = \overline{B(0,1)} \cup \overline{B(3,1)}$.

Αν πάλι το $\sigma_{\mathbb{B}}(x)$ έχει κενό εσωτερικό, τότε το φάσμα του x δεν “μικραίνει” καθώς “μεγαλώνει” η άλγεβρα ως προς την οποία υπολογίζεται (5.9). Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν $\sigma_{\mathbb{B}}(x) \subseteq \mathbb{R}$ ή όταν $\sigma_{\mathbb{B}}(x) = \mathbb{T}$.

10 Μεταθετικές άλγεβρες Banach

10.1 Ιδεώδη και μορφισμοί

Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα (μεταθετική ή όχι) και \mathcal{J} ένα (αμφίπλευρο) ιδεώδες της \mathcal{A} , τότε ο χώρος πηλίκου \mathcal{A}/\mathcal{J} γίνεται άλγεβρα αν εφοδιασθεί με τις πράξεις

$$\begin{aligned}(x + \mathcal{J}) + (y + \mathcal{J}) &= (x + y) + \mathcal{J} \\ \lambda(x + \mathcal{J}) &= (\lambda x) + \mathcal{J} \\ (x + \mathcal{J}) \cdot (y + \mathcal{J}) &= (x \cdot y) + \mathcal{J}\end{aligned}$$

και η κανονική απεικόνιση πηλίκου

$$\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{J} : x \rightarrow x + \mathcal{J}$$

είναι μορφισμός με πυρήνα $\ker \pi = \mathcal{J}$. Αντίστροφα, αν $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ είναι μορφισμός αλγεβρών, τότε ο πυρήνας του είναι ιδεώδες της \mathcal{A} . Αν η \mathcal{A} έχει μονάδα $\mathbf{1}$, τότε η \mathcal{A}/\mathcal{J} έχει μονάδα¹¹, το $\mathbf{1} + \mathcal{J}$.

Παρατηρήσεις (i) Ένα ιδεώδες μίας άλγεβρας με μονάδα είναι γνήσιο αν και μόνον αν δεν περιέχει την μονάδα, ισοδύναμα αν δεν περιέχει κανένα αντιστρέψιμο στοιχείο.

(ii) Κάθε άλγεβρα Banach \mathcal{A} με μονάδα, εκτός από το \mathbb{C} , έχει γνήσια αριστερά ιδεώδη και γνήσια δεξιά ιδεώδη. Πράγματι: η \mathcal{A} περιέχει κάποιο μη αντιστρέψιμο στοιχείο x , αλλιώς είναι ισομετρικά ισόμορφη με το \mathbb{C} (Θεώρημα 5.2). Αν το x δεν έχει αριστερό αντίστροφο, τότε το $\mathcal{A}x = \{ax : a \in \mathcal{A}\}$ είναι γνήσιο αριστερό ιδεώδες. Αν πάλι το x έχει αριστερό αντίστροφο y , τότε το y δεν έχει αριστερό αντίστροφο, γιατί αλλιώς θα ήταν αντιστρέψιμο, οπότε και το x θα ήταν αντιστρέψιμο. Τότε το $\mathcal{A}y$ είναι γνήσιο αριστερό ιδεώδες.

Συνεπώς κάθε μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα έχει γνήσια αμφίπλευρα ιδεώδη. Δεν έχουν όμως όλες οι άλγεβρες γνήσια αμφίπλευρα ιδεώδη (παραδείγμα: $M_n(\mathbb{C})$, $n \geq 2$).

Ένα (αριστερό, δεξί ή αμφίπλευρο) ιδεώδες \mathcal{J} μίας άλγεβρας \mathcal{A} λέγεται **μεγιστικό** αν είναι γνήσιο και δεν περιέχεται γνήσια σε κανένα (ομοειδές) ιδεώδες, εκτός από την \mathcal{A} . Παραδείγματος χάριν, αν $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ είναι μη μηδενικός μορφισμός, τότε ο πυρήνας του είναι μεγιστικό ιδεώδες, γιατί έχει συνδιάσταση 1.

¹¹Το αντίστροφο δεν ισχύει κατ' ανάγκη: αν παραδείγματος χάριν $\mathcal{A} = c_0$ και $\mathcal{J} = \{a \in c_0 : ae_1 = 0\}$, τότε η \mathcal{A} δεν έχει μονάδα, αλλά η \mathcal{A}/\mathcal{J} έχει μονάδα το $e_1 + \mathcal{J}$.

Στόχος αυτής της παραγράφου είναι να δειχθεί ότι, σε κάθε μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι αυτής της μορφής.

Θεώρημα 10.1 (Krull) *Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα με μονάδα, κάθε (αριστερό, δεξί ή αμφίπλευρο) γνήσιο ιδεώδες \mathcal{J} της \mathcal{A} περιέχεται σε ένα μεγιστικό (ομοειδές) ιδεώδες.*

Απόδειξη Υποθέτω ότι το \mathcal{J} είναι αριστερό ιδεώδες της \mathcal{A} . Οι άλλες περιπτώσεις αποδεικνύονται όμοια.

Ονομάζω \mathbf{S} την οικογένεια όλων των γνήσιων αριστερών ιδεωδών της \mathcal{A} που περιέχουν το \mathcal{J} . Η \mathbf{S} διατάσσεται μερικά από την σχέση του περιέχεσθαι. Θα δείξω ότι έχει μεγιστικό στοιχείο.

Αν $\mathbf{C} \subseteq \mathbf{S}$ είναι μία ολικά διατεταγμένη οικογένεια, θέτω $\mathcal{M}_{\mathbf{C}} := \cup \mathbf{C}$ και ισχυρίζομαι ότι το $\mathcal{M}_{\mathbf{C}}$ είναι άνω φράγμα της \mathbf{C} . Πράγματι: Το $\mathcal{M}_{\mathbf{C}}$ περιέχει κάθε στοιχείο της \mathbf{C} , άρα και το \mathcal{J} . Αν $x, y \in \mathcal{M}_{\mathbf{C}}$ και $a \in \mathcal{A}$, τότε υπάρχουν $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2 \in \mathbf{C}$ ώστε $x \in \mathcal{J}_1, y \in \mathcal{J}_2$ οπότε $ax \in \mathcal{J}_1 \subseteq \mathcal{M}_{\mathbf{C}}$ γιατί το \mathcal{J}_1 είναι αριστερό ιδεώδες. Επίσης, επειδή η \mathbf{C} είναι ολικά διατεταγμένη, μπορώ να υποθέσω ότι $\mathcal{J}_1 \subseteq \mathcal{J}_2$, οπότε $x, y \in \mathcal{J}_2$, άρα $x + y \in \mathcal{J}_2 \subseteq \mathcal{M}_{\mathbf{C}}$. Άρα το $\mathcal{M}_{\mathbf{C}}$ είναι αριστερό ιδεώδες. Επιπλέον, είναι γνήσιο, γιατί κανένα στοιχείο της \mathbf{C} δεν περιέχει την μονάδα, άρα ούτε το $\mathcal{M}_{\mathbf{C}}$ την περιέχει.

Έπεται από το Λήμμα Zorn ότι η οικογένεια \mathbf{S} έχει ένα μεγιστικό στοιχείο \mathcal{M} . Αυτό σημαίνει ότι κανένα στοιχείο της \mathbf{S} δεν περιέχει το \mathcal{M} , εκτός απ' το ίδιο το \mathcal{M} . Ισχυρίζομαι ότι το \mathcal{M} είναι μεγιστικό ως προς την ιδιότητα του να είναι αριστερό ιδεώδες. Πράγματι: Ότι είναι αριστερό ιδεώδες και ότι περιέχει το \mathcal{J} είναι σαφές, αφού $\mathcal{M} \in \mathbf{S}$. Αν τώρα \mathcal{K} είναι ένα αριστερό γνήσιο ιδεώδες της \mathcal{A} που περιέχει το \mathcal{M} , τότε το \mathcal{K} ανήκει στην \mathbf{S} , αφού περιέχει το \mathcal{J} . Επομένως $\mathcal{K} = \mathcal{M}$ λόγω μεγιστικότητας του \mathcal{M} στην \mathbf{S} . \square

Παρατήρηση Η ύπαρξη μονάδας δεν μπορεί να παραλειφθεί. Παραδείγματος χάριν, αποδεικνύεται (άσκηση) ότι το σύνολο $c_{00} \subseteq c_0$ των ακολουθιών με πεπερασμένο φορέα είναι ιδεώδες της c_0 που δεν περιέχεται σε κανένα μεγιστικό ιδεώδες.

Πρόταση 10.2 *Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα Banach με μονάδα και \mathcal{J} ένα (αριστερό, δεξί ή αμφίπλευρο) γνήσιο ιδεώδες της \mathcal{A} , τότε η κλειστή θήκη $\overline{\mathcal{J}}$ του \mathcal{J} είναι γνήσιο (ομοειδές) ιδεώδες.*

Απόδειξη Το γεγονός ότι το $\overline{\mathcal{J}}$ είναι ιδεώδες έπεται από την συνέχεια των αλγεβρικών πράξεων. Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι γνήσιο, δηλαδή ότι $1 \notin$

$\bar{\mathcal{J}}$. Αυτό πράγματι αληθεύει, γιατί η ανοικτή μπάλα με κέντρο $\mathbf{1}$ και ακτίνα 1 αποτελείται από αντιστρέψιμα στοιχεία (Λήμμα 4.1), επομένως δεν τέμνει το \mathcal{J} . \square

Παρατήρηση Και στην πρόταση αυτή η ύπαρξη μονάδας δεν μπορεί να παραλειφθεί. Παραδείγματος χάριν, το ιδεώδες c_{00} της c_0 είναι γνήσιο, αλλά η κλειστή του θήκη δεν είναι.

Πόρισμα 10.3 Κάθε μεγιστικό (αριστερό, δεξί ή αμφίπλευρο) ιδεώδες μίας άλγεβρας Banach με μονάδα είναι κλειστό.

Απόδειξη Η κλειστή του θήκη είναι (ομοειδές) γνήσιο ιδεώδες. \square

Πρόταση 10.4 Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα Banach με μονάδα και \mathcal{J} ένα αμφίπλευρο κλειστό ιδεώδες της \mathcal{A} , τότε ο χώρος πηλίκου \mathcal{A}/\mathcal{J} εφοδιασμένος με την νόρμα πηλίκου

$$\|a + \mathcal{J}\|_q = \inf\{\|a + x\| : x \in \mathcal{J}\} = d(a, \mathcal{J})$$

είναι άλγεβρα Banach με μονάδα, και η κανονική απεικόνιση πηλίκου $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{J}$ είναι συνεχής (επι-)μορφισμός.

Απόδειξη Το γεγονός ότι η $\|\cdot\|_q$ είναι πλήρης νόρμα στον χώρο πηλίκου \mathcal{A}/\mathcal{J} και ότι η απεικόνιση πηλίκου είναι συνεχής αποδεικνύεται στην γενική θεωρία των χώρων Banach (βλ. π.χ. [1], III.4). Μένει να αποδειχθεί ότι

$$\|ab + \mathcal{J}\|_q \leq \|a + \mathcal{J}\|_q \cdot \|b + \mathcal{J}\|_q.$$

Πράγματι, αν $x, y \in \mathcal{J}$ έχουμε

$$\|(a + x)(b + y)\| \leq \|a + x\| \cdot \|b + y\|.$$

Αλλά $(a + x)(b + y) = ab + (ay + xb + xy)$ και $ay + xb + xy \in \mathcal{J}$, άρα $\|(a + x)(b + y)\| \geq \|ab + \mathcal{J}\|_q$. Επομένως η προηγούμενη ανισότητα δίνει

$$\|ab + \mathcal{J}\|_q \leq \|a + x\| \cdot \|b + y\|$$

για κάθε $x, y \in \mathcal{J}$, και το συμπέρασμα έπεται παίρνοντας infimum ως προς x και y . \square

Θεώρημα 10.5 Έστω \mathcal{A} μία μεταθετική άλγεβρα με μονάδα και \mathcal{J} ένα γνήσιο ιδεώδες της \mathcal{A} . Το \mathcal{J} είναι μεγιστικό ιδεώδες αν και μόνον αν η άλγεβρα πηλίκου είναι σώμα.

Απόδειξη Θέτω $\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{J}$. Έστω $x \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{J}$, δηλαδή $\pi(x) \in \mathcal{B} \setminus \{0\}$. Θέτω $\mathcal{M} = \mathcal{A}x + \mathcal{J}$. Εύκολα βλέπει κανείς ότι το \mathcal{M} είναι το μικρότερο ιδεώδες της \mathcal{A} που περιέχει το \mathcal{J} και το x .

Αν το \mathcal{J} είναι μεγιστικό ιδεώδες της \mathcal{A} , τότε το \mathcal{M} δεν είναι γνήσιο, δηλαδή $\mathcal{A} = \mathcal{M}$, άρα $\pi(\mathcal{A}) = \pi(\mathcal{A}x + \mathcal{J}) = \pi(\mathcal{A})\pi(x)$ δηλαδή $\mathcal{B} = \mathcal{B}\pi(x)$ πράγμα που σημαίνει ότι $\pi(x) \in \text{Inv}(\mathcal{B})$, άρα η \mathcal{B} είναι σώμα.

Αντίστροφα αν για κάθε $x \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{J}$ υπάρχει $a \in \mathcal{A}$ ώστε $\pi(a) = (\pi(x))^{-1}$, τότε θέτοντας $y = \mathbf{1} - ax$ έχουμε $\mathbf{1} = ax + y$ όπου $y \in \mathcal{J}$ (γιατί $\pi(y) = \pi(\mathbf{1}) - \pi(a)\pi(x) = 0$, οπότε το ιδεώδες που παράγεται από το \mathcal{J} και το x δεν είναι γνήσιο, δηλαδή το \mathcal{J} είναι μεγιστικό. \square

Έστω \mathcal{A} μία μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα και \mathcal{M} ένα μεγιστικό ιδεώδες της \mathcal{A} . Τότε η άλγεβρα πηλίκο \mathcal{A}/\mathcal{M} είναι σώμα (Θεώρημα 10.5), αλλά είναι και άλγεβρα Banach (Πρόταση 10.4), διότι το \mathcal{M} είναι κλειστό ιδεώδες. Συνεπώς από το Θεώρημα Gelfand - Mazur (5.2) υπάρχει ένας (ισομετρικός) ισομορφισμός $\lambda : \mathcal{A}/\mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}$. Αυτό αποδεικνύει το

Πόρισμα 10.6 Έστω \mathcal{A} μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα και \mathcal{J} γνήσιο ιδεώδες της \mathcal{A} . Το \mathcal{J} είναι μεγιστικό ιδεώδες αν και μόνον αν η \mathcal{A}/\mathcal{J} είναι ισομετρικά ισόμορφη με το \mathbb{C} .

Ορισμός 10.1 Χαρακτήρας ή πολλαπλασιαστική γραμμική μορφή φ σε μία άλγεβρα \mathcal{A} λέγεται ένας μη μηδενικός μορφισμός $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$. Το σύνολο των χαρακτήρων της \mathcal{A} συμβολίζουμε $\mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Παρατήρηση Αν η \mathcal{A} έχει μονάδα, τότε ένας μορφισμός $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ είναι χαρακτήρας αν και μόνον αν $\varphi(\mathbf{1}) = 1$ (γιατί:).

Συνεπώς αν δύο χαρακτήρες φ και ψ της \mathcal{A} έχουν τον ίδιο πυρήνα, τότε ταυτίζονται, γιατί για κάθε $x \in \mathcal{A}$ ισχύει $x - \varphi(x)\mathbf{1} \in \ker(\varphi) = \ker(\psi)$, δηλαδή $\psi(x - \varphi(x)\mathbf{1}) = 0$ άρα $\psi(x) = \varphi(x)\psi(\mathbf{1}) = \varphi(x)$.

Θεώρημα 10.7 Έστω \mathcal{A} μία μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα. Η απεικόνιση

$$\varphi \rightarrow \ker \varphi$$

είναι αμφιμονοσήμαντη μεταξύ του συνόλου των χαρακτήρων και του συνόλου των μεγιστικών ιδεωδών της \mathcal{A} .

Απόδειξη Όπως παρατηρήσαμε στην αρχή της παραγράφου, κάθε χαρακτήρας $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ της \mathcal{A} ορίζει ένα μεγιστικό ιδεώδες, τον πυρήνα του, $\ker \varphi$. Η προηγούμενη παρατήρηση δείχνει ότι η απεικόνιση $\varphi \rightarrow \ker \varphi$ είναι 1-1.

Έστω \mathcal{M} μεγιστικό ιδεώδες της \mathcal{A} και $\lambda : \mathcal{A}/\mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}$ ο μοναδικός (γιατί;) ισομετρικός ισομορφισμός που εξασφαλίζει το Θεώρημα Gelfand - Mazur. Αν ονομάσουμε φ την σύνθεση του λ με την κανονική απεικόνιση πηλίκο π ,

$$\varphi : \mathcal{A} \xrightarrow{\pi} \mathcal{A}/\mathcal{M} \xrightarrow{\lambda} \mathbb{C}$$

τότε έχουμε έναν μορφισμό $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ με $\varphi(\mathbf{1}) = 1$ και $\ker \varphi = \ker \pi = \mathcal{M}$ (αφού ο λ είναι 1-1). Επομένως η απεικόνιση $\varphi \rightarrow \ker \varphi$ είναι επί. \square

Πόρισμα 10.8 Το σύνολο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ των χαρακτήρων κάθε μεταθετικής άλγεβρας Banach \mathcal{A} με μονάδα δεν είναι κενό.

Απόδειξη Αν η \mathcal{A} έχει μη μηδενικά μεγιστικά ιδεώδη, τότε από το προηγούμενο θεώρημα έχει χαρακτήρες. Αν δεν έχει μεγιστικά ιδεώδη, τότε κάθε μη μηδενικό στοιχείο της είναι αντιστρέψιμο, οπότε ο ισομορφισμός της \mathcal{A} με το \mathbb{C} που εξασφαλίζει το Θεώρημα Gelfand - Mazur είναι (ο μοναδικός) χαρακτήρας της \mathcal{A} (και ο πυρήνας του, δηλ. το $\{0\}$, είναι μεγιστικό ιδεώδες). \square

Παρατήρηση Η μεταθετικότητα της \mathcal{A} στο προηγούμενο πόρισμα δεν μπορεί εν γένει να παραλειφθεί. Παραδείγματος χάριν, η άλγεβρα $M_n(\mathbb{C})$ των $n \times n$ πινάκων δεν έχει (αμφίπλευρα) ιδεώδη (είναι απλή) επομένως δεν έχει χαρακτήρες.

Από την άλλη μεριά όμως, η υπάλγεβρά της $T_n(\mathbb{C})$ που αποτελείται από τους άνω τριγωνικούς πίνακες έχει ακριβώς n χαρακτήρες (άσκηση), παρόλο που δεν είναι μεταθετική.

Παρατήρηση Εφόσον τα μεγιστικά ιδεώδη μίας μεταθετικής άλγεβρας Banach με μονάδα είναι κλειστά, έπεται ότι οι χαρακτήρες της είναι συνεχείς. Αυτό όμως ισχύει γενικότερα:

Πρόταση 10.9 Κάθε χαρακτήρας μιας άλγεβρας Banach (μεταθετικής ή όχι) είναι συνεχής, με νόρμα το πολύ 1. Αν μάλιστα η άλγεβρα έχει μονάδα, τότε κάθε χαρακτήρας έχει νόρμα ακριβώς 1.

Απόδειξη Έστω $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$. Θα δείξω ότι $|\varphi(x)| \leq 1$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$ με $\|x\| \leq 1$. Έστω ότι υπάρχει $x_0 \in \mathcal{A}$ με $\|x_0\| \leq 1$ και $\varphi(x_0) = \lambda$ όπου $|\lambda| > 1$.

Θέτω $x = x_0/\lambda$. Επειδή $\|x\| < 1$, η σειρά

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

συγκλίνει. Αλλά $y = xy + x$ άρα $\varphi(y) = \varphi(x)\varphi(y) + \varphi(x) = \varphi(y) + 1$, άτοπο.

Επομένως

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(x)| : \|x\| \leq 1\} \leq 1.$$

Αν η \mathcal{A} έχει μονάδα, τότε $\|\varphi\| = 1$ επειδή $\varphi(\mathbf{1}) = 1$. \square

Η επόμενη Πρόταση χαρακτηρίζει τα αντιστρέψιμα στοιχεία μιάς μεταθετικής άλγεβρας Banach με μονάδα, καθώς και το φάσμα κάθε στοιχείου της, μέσω των χαρακτήρων της:

Πρόταση 10.10 Έστω \mathcal{A} μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα και $x \in \mathcal{A}$.

(α) Το x είναι αντιστρέψιμο στην \mathcal{A} αν και μόνον αν $\phi(x) \neq 0$ για κάθε $\phi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, ισοδύναμα αν το x δεν περιέχεται σε κανένα (μεγιστικό) ιδεώδες της \mathcal{A} .

(β) $\sigma(x) = \{\phi(x) : \phi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\}$.

Απόδειξη (α) Το σύνολο $\mathcal{J} = \mathcal{A}x$ είναι ιδεώδες της \mathcal{A} . Αν $x \notin \text{Inv}(\mathcal{A})$, τότε το \mathcal{J} είναι γνήσιο ιδεώδες, άρα περιέχεται σε κάποιο μεγιστικό ιδεώδες, άρα (από το Θεώρημα 10.7) το x μηδενίζεται από κάποιο χαρακτήρα της \mathcal{A} . Αντίστροφα αν το x μηδενίζεται από κάποιο χαρακτήρα φ , τότε περιέχεται στο μεγιστικό ιδεώδες $\ker \varphi$.

(β) Έστω $\lambda \in \mathbb{C}$. Εξ ορισμού $\lambda \in \sigma(x)$ αν και μόνον αν $\lambda\mathbf{1} - x \notin \text{Inv}(\mathcal{A})$. Από το (i) αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν υπάρχει $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ ώστε $\varphi(\lambda\mathbf{1} - x) = 0$, δηλαδή $\varphi(x) = \lambda$. \square

Σε μία μη μεταθετική άλγεβρα \mathcal{A} , η φασματική ακτίνα $\rho : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^+$ δεν είναι εν γένει υποπροσθετική: Παραδείγματος χάριν αν $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$ και

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

τότε $\rho(a) = \rho(b) = 0$ ενώ $\rho(a + b) = 1$.

Η Πρόταση 10.10 επιτρέπει να δείξουμε ότι σε μεταθετικές άλγεβρες Banach όχι μόνον η φασματική ακτίνα, αλλά και το ίδιο το φάσμα είναι “υποπροσθετικό” και “υποπολλαπλασιαστικό”.

Λήμμα 10.11 Έστω \mathcal{A} μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, $a, b \in \mathcal{A}$. Τότε

$$\sigma(a + b) \subseteq \sigma(a) + \sigma(b) \quad \text{και} \quad \sigma(ab) \subseteq \sigma(a) \cdot \sigma(b)$$

(όπου αν $A, B \subseteq \mathbb{C}$ γράφουμε $A + B = \{z + w : z \in A, w \in B\}$ και $A \cdot B = \{zw : z \in A, w \in B\}$).

Επομένως $\rho(a + b) \leq \rho(a) + \rho(b)$ και $\rho(ab) \leq \rho(a) \cdot \rho(b)$.

Απόδειξη Από την Πρόταση 10.10 έπεται ότι

$$\sigma(a + b) = \{\varphi(a + b) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\}.$$

Αλλά $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, άρα

$$\begin{aligned} \sigma(a + b) &= \{\varphi(a) + \varphi(b) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} \\ &\subseteq \{\varphi(a) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} + \{\psi(b) : \psi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} \\ &= \sigma(a) + \sigma(b). \end{aligned}$$

Ομοίως, επειδή $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, αποδεικνύεται η δεύτερη σχέση.

Κάθε $\lambda \in \sigma(a + b)$ είναι της μορφής $z + w$ όπου $z \in \sigma(a)$ και $w \in \sigma(b)$, άρα $|\lambda| \leq |z| + |w| \leq |z| + \rho(b) \leq \rho(a) + \rho(b)$, επομένως $\rho(a + b) \leq \rho(a) + \rho(b)$. Ομοίως, επειδή κάθε $\mu \in \sigma(ab)$ είναι της μορφής zw όπου $z \in \sigma(a)$ και $w \in \sigma(b)$, έχουμε $|\mu| = |z| \cdot |w| \leq |z| \cdot \rho(b) \leq \rho(a) \cdot \rho(b)$, επομένως $\rho(ab) \leq \rho(a) \cdot \rho(b)$. \square

Πρόταση 10.12 Έστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach με μονάδα και $a, b \in \mathcal{A}$ με $ab = ba$. Τότε

$$\sigma(a + b) \subseteq \sigma(a) + \sigma(b) \quad \text{και} \quad \sigma(ab) \subseteq \sigma(a) \cdot \sigma(b).$$

Επομένως $\rho(a + b) \leq \rho(a) + \rho(b)$ και $\rho(ab) \leq \rho(a) \cdot \rho(b)$.

Απόδειξη Αρκεί να εφαρμόσουμε το προηγούμενο λήμμα σε μία μεταθετική Banach υπάλγεβρα \mathcal{B} της \mathcal{A} που να περιέχει τα a, b και επί πλέον να ικανοποιεί $\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ για κάθε $x \in \mathcal{B}$. Παρατήρησε ότι, επειδή τα a, b μετατίθενται, υπάρχει μία μεταθετική Banach υπάλγεβρα της \mathcal{A} που τα περιέχει: παραδείγματος χάριν η κλειστή γραμμική θήκη \mathcal{D} του συνόλου $\{a^n b^m : n, m \in \mathbb{N}\}$. Ομως η \mathcal{D} δεν έχει εν γένει την ιδιότητα $\sigma_{\mathcal{D}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ για κάθε $x \in \mathcal{D}$ (παραδείγματα;).

Ονομάζω λοιπόν \mathcal{B} τον δεύτερο μεταθέτη $\{a, b\}''$ των a και b , δηλαδή

$$\mathcal{B} = \{x \in \mathcal{A} : xs = sx \text{ για κάθε } s \in \mathcal{A} \text{ ώστε } as = sa \text{ και } bs = sb\}.$$

Έχουμε ήδη παρατηρήσει (δες την Παράγραφο 7.2) ότι η \mathcal{B} είναι μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, και είναι εύκολο να ελέγξεις ότι αν $y \in \mathcal{B}$ και $y \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ τότε $y^{-1} \in \mathcal{B}$. Επομένως η \mathcal{B} ικανοποιεί τις επιθυμητές ιδιότητες. \square

Μπορούμε τώρα να δώσουμε μία δεύτερη απόδειξη της Πρότασης 9.3 χωρίς χρήση του συναρτησιακού λογισμού:

Πόρισμα 10.13 (βλ. 9.3) Έστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach με μονάδα και $a, b \in \mathcal{A}$ με $ab = ba$. Τότε

$$\Delta(\sigma(a), \sigma(b)) \leq \rho(a - b).$$

Ειδικότερα, η φασματική ακτίνα είναι ομοιόμορφα συνεχής σε μεταθετικές υπάλγεβρες της \mathcal{A} .

Απόδειξη Από τη σχέση $\sigma(a) \subseteq \sigma(b) + \sigma(a - b)$ έπεται ότι κάθε $\lambda \in \sigma(a)$ είναι της μορφής $z + w$ όπου $z \in \sigma(b)$ και $w \in \sigma(a - b)$, άρα $|\lambda - z| = |w| \leq \rho(a - b)$, επομένως $d(\lambda, \sigma(b)) \leq \rho(a - b)$. Δηλαδή (με τους συμβολισμούς της παραγράφου 9.2)

$$\sigma(a) \subseteq [\sigma(b)]_{\rho(a-b)}.$$

Επειδή $\rho(a - b) = \rho(b - a)$, έχουμε επίσης

$$\sigma(b) \subseteq [\sigma(a)]_{\rho(a-b)}$$

πράγμα που αποδεικνύει το ζητούμενο. \square

10.2 Ο μετασχηματισμός Gelfand

Αν \mathcal{A} είναι μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, θα δείξουμε ότι υπάρχει ένας συμπαγής Hausdorff χώρος K και ένας συνεχής μορφισμός αλγεβρών $\mathcal{G} : \mathcal{A} \rightarrow C(K)$ ο οποίος μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι 1-1. Τότε η \mathcal{A} είναι ισόμορφη, ως άλγεβρα, με μία άλγεβρα συνεχών συναρτήσεων στον K .

Όπως θα δούμε, ο χώρος K είναι το σύνολο των χαρακτήρων της \mathcal{A} , εφοδιασμένο με την ασθενέστερη τοπολογία που καθιστά τα στοιχεία της \mathcal{A} συνεχείς συναρτήσεις.

Ορισμός 10.2 Έστω \mathcal{A} μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα. Η ασθενής-* τοπολογία (w^*) στο σύνολο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ των χαρακτήρων της \mathcal{A} είναι η τοπολογία της σύγκλισης στα σημεία της \mathcal{A} :

Αν (φ_i) είναι δίκτυο στο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ και $\phi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$,

$$\varphi_i \xrightarrow{w^*} \phi \iff \varphi_i(a) \rightarrow \phi(a) \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

Η w^* είναι δηλαδή ο περιορισμός της τοπολογίας γινόμενο του $\mathbb{C}^{\mathcal{A}}$ στο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Συζήτηση Γενικότερα, αν X χώρος Banach. Η ασθενής-* τοπολογία (w^*) του τοπολογικού δυικού X^* είναι εξ ορισμού η τοπολογία της σύγκλισης στα σημεία του X . Η w^* είναι δηλαδή ο περιορισμός της τοπολογίας γινόμενο του \mathbb{C}^X στον X^* .

Αν ένα οποιοδήποτε υποσύνολο K της μοναδιαίας μπάλας του X^* εφοδιασθεί με την (σχετική) ασθενή-* τοπολογία, τότε κάθε $x \in X$ ορίζει μία συνεχή συνάρτηση $\hat{x} : K \rightarrow \mathbb{C} : \phi \rightarrow \phi(x)$, η οποία μάλιστα είναι και φραγμένη:

$$\|\hat{x}\|_K := \sup\{|\hat{x}(\phi)| : \phi \in K\} \leq \|x\|$$

(διότι $|\hat{x}(\phi)| = |\phi(x)| \leq \|x\|$ για κάθε $\phi \in K$).

Αν το K είναι w^* -συμπαγές (οπότε ο χώρος $C(K)$ είναι χώρος Banach ως προς την νόρμα supremum), ορίζεται έτσι μία απεικόνιση $X \rightarrow C(K) : x \rightarrow \hat{x}$ η οποία είναι γραμμική¹² και, λόγω της προηγούμενης ανισότητας, συνεχής. Το ζήτημα είναι να επιλέξει κανείς τον χώρο K κατάλληλα, ώστε η απεικόνιση αυτή να έχει επιθυμητές ιδιότητες.

Παραδείγματος χάριν, αν επιλέξει κανείς ολόκληρη την μοναδιαία μπάλα του δυικού (που είναι w^* -συμπαγής από το Θεώρημα Αλάογλου - βλ. [9] 17.1) η απεικόνιση γίνεται ισομετρία. Δεν είναι όμως ποτέ επί (γιατί;).

¹² $(x + \lambda y)(\phi) = \phi(x + \lambda y) = \phi(x) + \lambda \phi(y) = \hat{x}(\phi) + \lambda \hat{y}(\phi)$ γιατί τα στοιχεία ϕ του K είναι γραμμικές μορφές

Όταν ο X είναι μεταθετική άλγεβρα Banach, το κατάλληλο “δουικό αντικείμενο” είναι το σύνολο των χαρακτήρων, γιατί αυτοί σέβονται και την πολλαπλασιαστική δομή της άλγεβρας.

Έχουμε δείξει (Πρόταση 10.9) ότι κάθε χαρακτήρας μίας άλγεβρας Banach \mathcal{A} είναι συνεχής, και μάλιστα έχει νόρμα το πολύ 1. Δηλαδή το σύνολο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ περιέχεται στην μοναδιαία μπάλα $(\mathcal{A}^*)_1$ του δουικού \mathcal{A}^* της \mathcal{A} .

Πρόταση 10.14 Έστω \mathcal{A} άλγεβρα Banach με μονάδα. Το σύνολο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ γίνεται συμπαγής χώρος Hausdorff αν εφοδιασθεί με την ασθενή-* τοπολογία.

Απόδειξη Για κάθε $a \in \mathcal{A}$ θέτω

$$D_a := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|a\|\} \quad \text{και} \quad D := \prod_{a \in \mathcal{A}} D_a.$$

Δηλαδή το D είναι το σύνολο όλων των συναρτήσεων $\theta : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ που ικανοποιούν $|\theta(a)| \leq \|a\|$ για κάθε $a \in \mathcal{A}$. Κάθε D_a είναι συμπαγές υποσύνολο του \mathbb{C} επομένως, από το Θεώρημα Tychonoff ([9] 16.1), το D είναι συμπαγής χώρος ως προς την τοπολογία γινόμενο. Αν $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, τότε $\varphi(a) \in D_a$ για κάθε $a \in \mathcal{A}$ (αφού $\|\varphi\| \leq 1$), άρα $\varphi \in D$. Δηλαδή το $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ είναι υποσύνολο του D , και η σχετική τοπολογία είναι, όπως παρατηρήσαμε, η ασθενής-*. Αρκεί λοιπόν να δειχθεί ότι το $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ είναι κλειστό υποσύνολο του D .

Έστω $\varphi_i \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ και $\theta \in D$ ώστε $\varphi_i(x) \rightarrow \theta(x)$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$. Θα δείξω ότι $\theta \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$. Πράγματι, για κάθε $a, b \in \mathcal{A}$ έχουμε

$$(\alpha) \theta(\mathbf{1}) = \lim \varphi_i(\mathbf{1}) = 1, \text{ αφού } \varphi_i(\mathbf{1}) = 1 \text{ για κάθε } i.$$

$$(\beta) \theta(ab) = \lim \varphi_i(ab) = \lim(\varphi_i(a) \cdot \varphi_i(b)) = \lim \varphi_i(a) \cdot \lim \varphi_i(b) = \theta(a) \cdot \theta(b)$$

αφού $\varphi_i(ab) = \varphi_i(a) \cdot \varphi_i(b)$ για κάθε i .

$$(\gamma) \theta(a + b) = \theta(a) + \theta(b) \text{ αφού } \varphi_i(a + b) = \varphi_i(a) + \varphi_i(b) \text{ για κάθε } i. \quad \square$$

Παρατήρηση Η ύπαρξη μονάδας στην \mathcal{A} δεν μπορεί να παραλειφθεί. Παραδείγματος χάριν, ο χώρος των χαρακτήρων της $c_0(\mathbb{N})$ δεν είναι συμπαγής (άσκηση). Από την άλλη μεριά, το σύνολο των χαρακτήρων μίας άλγεβρας πεπερασμένης διάστασης είναι πεπερασμένο (γιατί;) και συνεπώς συμπαγές, είτε η άλγεβρα έχει μονάδα είτε όχι. Παράδειγμα τέτοιας άλγεβρας είναι το επόμενο.

Παράδειγμα Στον γραμμικό χώρο $\mathcal{A} = \mathbb{C}^{n+1}$ με βάση e_0, e_1, \dots, e_n ορίζουμε πολλαπλασιασμό από τον κανόνα $e_0 e_k = 0 = e_k e_0$ για κάθε $k = 0, \dots, n$ και

$e_i \cdot e_j = \delta_{ij} e_i$ για $i, j = 1, \dots, n$. Εύκολα ελέγχεται ότι η \mathcal{A} γίνεται μεταθετική άλγεβρα χωρίς μονάδα.

Σημείωσε ότι η άλγεβρα αυτή είναι ισόμορφη με την άλγεβρα των $(n+2) \times (n+2)$ πινάκων της μορφής

$$\begin{pmatrix} 0 & a_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

Εύκολα ελέγχεται ότι $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \{\varphi_i : i = 1, \dots, n\}$, όπου $\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}$, $j = 0, \dots, n$.

Ορισμός 10.3 Έστω \mathcal{A} μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα και $x \in \mathcal{A}$. Ορίζουμε

$$\hat{x} : \mathcal{M}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C} : \phi \rightarrow \phi(x).$$

Η απεικόνιση $\mathcal{G} : x \rightarrow \hat{x}$ λέγεται **μετασχηματισμός Gelfand**.

Υπενθυμίζουμε ότι, από τον ορισμό της ασθενούς-* τοπολογίας, για κάθε $x \in \mathcal{A}$ η συνάρτηση $\hat{x} : (\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*) \rightarrow \mathbb{C}$ είναι συνεχής, δηλαδή $\hat{x} \in C(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$.

Θεώρημα 10.15 (Gelfand) Ο μετασχηματισμός Gelfand

$$\mathcal{G} : x \rightarrow \hat{x} : \mathcal{A} \rightarrow C(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$$

(i) Είναι μορφισμός αλγεβρών με την ιδιότητα $\mathcal{G}(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$.

(ii) Ικανοποιεί $\hat{x}(\mathcal{M}(\mathcal{A})) = \sigma(x)$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$.

(iii) Είναι συνεχής, μάλιστα

$$\|\hat{x}\|_\infty = \rho(x) \leq \|x\|.$$

για κάθε $x \in \mathcal{A}$.

(iv) $\ker(\mathcal{G}) = \{x \in \mathcal{A} : \rho(x) = 0\}$.

Απόδειξη (i) Για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ έχουμε

$$(\hat{x} + \hat{y})(\varphi) = \hat{x}(\varphi) + \hat{y}(\varphi) = \varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x+y) = \widehat{(x+y)}(\varphi)$$

επειδή η φ είναι γραμμική, δηλαδή

$$\mathcal{G}(x) + \mathcal{G}(y) = \mathcal{G}(x + y).$$

Επίσης

$$(\hat{x} \cdot \hat{y})(\varphi) = \hat{x}(\varphi) \cdot \hat{y}(\varphi) = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(xy) = \widehat{xy}(\varphi)$$

επειδή η φ είναι πολλαπλασιαστική, δηλαδή

$$\mathcal{G}(x) \cdot \mathcal{G}(y) = \mathcal{G}(xy).$$

Άρα η \mathcal{G} είναι μορφισμός αλγεβρών, και

$$\mathcal{G}(\mathbf{1})(\varphi) = \varphi(\mathbf{1}) = 1$$

για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, δηλαδή $\mathcal{G}(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$.

(ii) Για κάθε $x \in \mathcal{A}$ έχουμε από την Πρόταση 10.10

$$\sigma(x) = \{\varphi(x) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} = \{\hat{x}(\varphi) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} = \hat{x}(\mathcal{M}(\mathcal{A})).$$

(iii) Από το (ii) έχουμε, χρησιμοποιώντας την (2),

$$\|\hat{x}\|_{\infty} = \sup\{|\hat{x}(\varphi)| : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\} = \rho(x) \leq \|x\|.$$

(iv) Από το (iii) προκύπτει ότι $\hat{x} = 0$ αν και μόνον αν $\|\hat{x}\|_{\infty} = 0$ δηλαδή $\rho(x) = 0$. \square

Ορισμός 10.4 Έστω \mathcal{A} άλγεβρα με μονάδα. Το **ριζικό (Radical) του Jacobson** $\text{Rad}(\mathcal{A})$ της \mathcal{A} είναι η τομή όλων των αριστερών μεγιστικών ιδεωδών της. Αν $\text{Rad}(\mathcal{A}) = \{0\}$, η \mathcal{A} λέγεται **ημιαπλή**.

Αν η \mathcal{A} είναι μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, τότε

$$\begin{aligned} \text{Rad}(\mathcal{A}) &= \bigcap \{\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A} : \mathcal{M} \text{ μεγιστικό ιδεώδες}\} \\ &= \{x \in \mathcal{A} : \phi(x) = 0 \ \forall \phi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\} \\ &= \{x \in \mathcal{A} : \rho(x) = 0\} \end{aligned}$$

δηλαδή το ριζικό ταυτίζεται με το σύνολο των ψευδομηδενοδύναμων στοιχείων (αυτό δεν αληθεύει εν γένει σε μη μεταθετικές άλγεβρες).

Από το (iv) του Θεωρήματος Gelfand έπεται ότι

$$\ker(\mathcal{G}) = \text{Rad}(\mathcal{A}),$$

επομένως η \mathcal{A} είναι ημιαπλή αν και μόνον αν ο μετασχηματισμός Gelfand είναι 1-1.

10.3 Παραδείγματα

10.3.1 Η άλγεβρα $C(K)$

Αν K είναι χώρος συμπαγής και Hausdorff και $t \in K$, το σύνολο $\mathcal{M}_t = \{f \in C(K) : f(t) = 0\}$ είναι μεγιστικό ιδεώδες της $C(K)$. Κάθε μεγιστικό ιδεώδες της $C(K)$ είναι αυτής της μορφής. Ο χώρος των χαρακτήρων της $C(K)$ είναι ομοιομορφικός με το K .

Η απεικόνιση Gelfand “είναι” η ταυτοτική απεικόνιση. Είναι ισομετρία και επί.

Απόδειξη (i) Αν $t \in K$ θέτω $\delta_t(f) = f(t)$ για $f \in C(K)$. Είναι σαφές ότι η “εκτίμηση” $\delta_t : C(K) \rightarrow \mathbb{C}$ είναι χαρακτήρας της $C(K)$. Επομένως ο πυρήνας της, \mathcal{M}_t , είναι μεγιστικό ιδεώδες της $C(K)$. Το ζήτημα είναι να δείξει κανείς το αντίστροφο.

Έστω λοιπόν \mathcal{M} ένα μεγιστικό ιδεώδες της $C(K)$. Αρκεί να δείξω ότι υπάρχει $t \in K$ ώστε $f(t) = 0$ για κάθε $f \in \mathcal{M}$. Γιατί τότε θα έχουμε $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_t$, άρα, αφού το \mathcal{M} είναι μεγιστικό ιδεώδες, $\mathcal{M} = \mathcal{M}_t$.

Έστω ότι ο ισχυρισμός δεν αληθεύει, δηλαδή ότι για κάθε $s \in K$ υπάρχει $f_s \in \mathcal{M}$ ώστε $f_s(s) \neq 0$. Υπάρχει τότε μία ανοικτή περιοχή U_s του s ώστε η f_s να μην μηδενίζεται πουθενά στην U_s . Το σύνολο $\{U_s : s \in K\}$ αποτελεί ανοικτό κάλυμμα του συμπαγούς χώρου K , επομένως έχει ένα πεπερασμένο υποκάλυμμα $\{U_1, \dots, U_n\}$. Ονομάζω f_1, \dots, f_n τις αντίστοιχες συναρτήσεις και θέτω

$$g = \sum_{i=1}^n \overline{f_i} f_i = \sum_{i=1}^n |f_i|^2.$$

Ισχυρίζομαι ότι η g δεν μηδενίζεται πουθενά. Πράγματι κάθε $t \in K$ ανήκει σε κάποιο U_j , στο οποίο η αντίστοιχη f_j δεν μηδενίζεται. Από την δεύτερη ισότητα έχουμε $g(t) \geq |f_j(t)|^2 > 0$. Επομένως η συνάρτηση $1/g$ ορίζεται και ανήκει στην $C(K)$. Ομως, αφού $f_i \in \mathcal{M}$, η πρώτη ισότητα δείχνει ότι $g \in \mathcal{M}$, άρα $\mathbf{1} = (1/g) \cdot g \in \mathcal{M}$, αντίφαση.

Έτσι ο ισχυρισμός αποδείχθηκε.

(ii) Δείξαμε λοιπόν ότι η απεικόνιση $t \rightarrow \delta_t$ απεικονίζει το K επί του συνόλου των χαρακτήρων της $C(K)$. Μάλιστα η απεικόνιση αυτή είναι και 1-1, γιατί αν $t \neq s$ ($t, s \in K$) υπάρχει $f \in C(K)$ ώστε $f(t) = 0$ και $f(s) \neq 0$ (Λήμμα Urysohn), δηλαδή $\delta_t(f) = 0$ και $\delta_s(f) \neq 0$. Επομένως η απεικόνιση

$$\Phi : t \rightarrow \delta_t : K \rightarrow \mathcal{M}(C(K))$$

είναι αμφιμονοσήμαντη. Για να δείξουμε ότι είναι ομοιομορφισμός αρκεί, αφού ο K είναι συμπαγής, να δείξουμε ότι είναι συνεχής.

Έστω λοιπόν (t_i) δίκτυο στον K ώστε $t_i \rightarrow t \in K$. Τότε για κάθε συνεχή συνάρτηση f ισχύει $f(t_i) \rightarrow f(t)$, δηλαδή $\delta_{t_i}(f) \rightarrow \delta_t(f)$ για κάθε $f \in C(K)$. Από τον ορισμό της ασθενούς-* τοπολογίας, αυτό σημαίνει ακριβώς ότι

$$\delta_{t_i} \xrightarrow{w^*} \delta_t.$$

(iii) Αν $f \in C(K)$, για κάθε $t \in K$ έχουμε

$$\hat{f}(\delta_t) = \delta_t(f) = f(t)$$

δηλαδή $(\hat{f} \circ \Phi)(t) = f(t)$ αφού $\delta_t = \Phi(t)$. Επομένως

$$(\mathcal{G}(f)) \circ \Phi = f$$

οπότε, αν “ταυτίσουμε” τους συμπαγείς χώρους K και $\mathcal{M}(C(K))$ μέσω της Φ , ο μετασχηματισμός Gelfand “ταυτίζεται” με την ταυτοτική απεικόνιση: $\mathcal{G}(f) = f$.

10.3.2 Η άλγεβρα του δίσκου $A(\mathbb{D})$

Ας θυμηθούμε (παράγραφος 2.5) ότι η $A(\mathbb{D})$ είναι το σύνολο των $f \in C(\mathbb{T})$ που είναι περιορισμοί στο \mathbb{T} συναρτήσεων που ανήκουν στην άλγεβρα

$$\tilde{A} = \{g \in C(\overline{\mathbb{D}}) : g|_{\mathbb{T}} \text{ ολόμορφη}\}.$$

Για κάθε $z \in \overline{\mathbb{D}}$, η απεικόνιση $\varphi_z : A(\mathbb{D}) \rightarrow \mathbb{C}$ όπου $\varphi_z(f) = \tilde{f}(z)$ είναι χαρακτηρισ της $A(\mathbb{D})$, και κάθε χαρακτηρισ της είναι αυτής της μορφής. Η απεικόνιση $z \rightarrow \varphi_z$ είναι ομοιομορφισμός του $\overline{\mathbb{D}}$ επί του χώρου των χαρακτήρων της $A(\mathbb{D})$.

Η απεικόνιση Gelfand “είναι” η απεικόνιση $f \rightarrow \tilde{f}$. Είναι ισομετρία (άρα είναι 1-1, και έχει κλειστή εικόνα) αλλά δεν είναι επί.

Παρατήρηση Παρόλο που η $A(\mathbb{D})$ είναι υπάλγεβρα της $C(\mathbb{T})$ που έχει χώρο χαρακτήρων $\mathcal{M}(C(\mathbb{T})) \simeq \mathbb{T}$, η $A(\mathbb{D})$ έχει “πολύ μεγαλύτερο” χώρο χαρακτήρων: $\mathcal{M}(A(\mathbb{D})) \simeq \overline{\mathbb{D}}$.

Απόδειξη Η απεικόνιση $g \rightarrow g|_{\mathbb{T}} : \tilde{A} \rightarrow A(\mathbb{D})$ είναι βεβαίως επιμορφισμός αλγεβρών. Επιπλέον, από την αρχή του μεγίστου, είναι ισομετρική:

$$\|g|_{\mathbb{T}}\|_{\mathbb{T}} = \sup\{|g(w)| : w \in \mathbb{T}\} = \sup\{|g(z)| : w \in \overline{\mathbb{D}}\} = \|g\|_{\mathbb{D}},$$

συνεπώς είναι 1-1. Επομένως η αντίστροφη της είναι (ισο-)μορφισμός αλγεβρών. Δηλαδή η απεικόνιση $f \rightarrow \tilde{f} : A(\mathbb{D}) \rightarrow \tilde{A}$ είναι (ισο-)μορφισμός αλγεβρών.

Είναι εύκολο τώρα να ελεγχθεί ότι, για κάθε $z \in \overline{\mathbb{D}}$, η απεικόνιση

$$\phi_z : f \rightarrow \tilde{f} : A(\mathbb{D}) \rightarrow \mathbb{C}$$

είναι (σύνθεση μη μηδενικών μορφισμών, άρα) χαρακτήρας της $A(\mathbb{D})$.

Αντίστροφα αν $\varphi : A(\mathbb{D}) \rightarrow \mathbb{C}$ είναι χαρακτήρας, θέτω $z = \varphi(f_1)$ όπου $f_1(w) = w$ ($w \in \mathbb{T}$) και παρατηρώ ότι $|z| \leq \|\varphi\| \|f_1\| = 1$, δηλαδή $z \in \overline{\mathbb{D}}$. Θα δείξω ότι $\varphi = \varphi_z$. Πράγματι, αν $p(w) = \sum_{k=0}^n a_k w^k$ είναι πολυώνυμο, δηλαδή $p = \sum_{k=0}^n a_k f_1^k$, τότε

$$\varphi(p) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi(f_1^k) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi(f_1)^k = \sum_{k=0}^n a_k z^k = \tilde{p}(z) = \varphi_z(p).$$

Επειδή οι φ και φ_z είναι συνεχείς και ταυτίζονται στο σύνολο των πολυωνύμων, που είναι πυκνό στην $A(\mathbb{D})$ (όπως έχουμε αποδείξει), έπεται ότι $\varphi(f) = \varphi_z(f)$ για κάθε $f \in A(\mathbb{D})$.

Δείξαμε λοιπόν ότι η απεικόνιση

$$\Psi : z \rightarrow \varphi_z : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathcal{M}(A(\mathbb{D}))$$

είναι επί. Είναι εύκολο να δει κανείς ότι είναι 1-1: αν $z \neq w$, τότε $\tilde{f}_1(z) \neq \tilde{f}_1(w)$ δηλαδή $\phi_z(f_1) \neq \phi_w(f_1)$.

Εξίσου εύκολα επαληθεύεται ότι η αντίστροφη απεικόνιση $\varphi_z \rightarrow z$ είναι συνεχής: αν $\varphi_{z_i} \xrightarrow{w^*} \varphi_z$ τότε $\varphi_{z_i}(f_1) \rightarrow \varphi_z(f_1)$, άρα $z_i \rightarrow z$. Επομένως οι συμπαγείς χώροι $\overline{\mathbb{D}}$ και $\mathcal{M}(A(\mathbb{D}))$ είναι ομοιομορφικοί.

Αν $f \in A(\mathbb{D})$, για κάθε $z \in \overline{\mathbb{D}}$ έχουμε

$$\hat{f}(\varphi_z) = \varphi_z(f) = \tilde{f}(z)$$

δηλαδή $(\hat{f} \circ \Psi)(z) = \tilde{f}(z)$. Επομένως

$$(\mathcal{G}(f)) \circ \Psi = \tilde{f}.$$

οπότε, αν “ταυτίσουμε” τους συμπαγείς χώρους $\overline{\mathbb{D}}$ και $\mathcal{M}(A(\mathbb{D}))$ μέσω της Ψ , ο μετασχηματισμός Gelfand “ταυτίζεται” με την απεικόνιση: $f \rightarrow \tilde{f}$.

Η απεικόνιση Gelfand είναι ισομετρία: για κάθε $f \in A(\mathbb{D})$ έχουμε

$$\begin{aligned}\|\mathcal{G}(f)\|_\infty &= \sup\{\hat{f}(\varphi) : \varphi \in \mathcal{M}(A(\mathbb{D}))\} = \sup\{\hat{f}(\phi_z) : z \in \overline{\mathbb{D}}\} \\ &= \sup\{\tilde{f}(z) : z \in \overline{\mathbb{D}}\} = \sup\{\tilde{f}(z) : z \in \mathbb{T}\} = \|f\|\end{aligned}$$

λόγω της αρχής του μεγίστου.

Τέλος, η απεικόνιση Gelfand δεν είναι επί της $C(\mathcal{M}(A(\mathbb{D})))$: Πράγματι, αν μία συνάρτηση $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$ δεν είναι ολόμορφη στο \mathbb{D} (π.χ. $f(z) = \bar{z}$), τότε η $f \circ \Psi^{-1}$ ανήκει στην $C(\mathcal{M}(A(\mathbb{D})))$ αλλά όχι στην $\mathcal{G}(A(\mathbb{D}))$.

10.3.3 Η άλγεβρα Wiener ή άλγεβρα Fourier \mathcal{W}

Θυμίζουμε (παράγραφος (2.8)) ότι πρόκειται για το σύνολο \mathcal{W} των συναρτήσεων f της μορφής

$$f(e^{it}) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} a_k e^{ikt}, \quad e^{it} \in \mathbb{T}$$

όπου $\sum_k |a_k| < \infty$, και η νόρμα είναι $\|f\|_w := \sum_k |a_k|$.

Ο χώρος $\mathcal{M}(\mathcal{W})$ των χαρακτήρων είναι ομοιομορφικός με τον μοναδιαίο κύκλο \mathbb{T} .

Η απεικόνιση Gelfand είναι 1-1, αλλά δεν είναι επί: έχει πυκνή, αλλά όχι κλειστή εικόνα, και (επομένως) η αντίστροφη απεικόνιση δεν είναι συνεχής.

Απόδειξη Η \mathcal{W} είναι υπάλγεβρα της άλγεβρας $C(\mathbb{T})$ (η σειρά $\sum_k a_k e^{ikt}$ συγκλίνει ομοιόμορφα) και περιέχει την μονάδα $\mathbf{1}$. Άρα, κάθε χαρακτήρας της $C(\mathbb{T})$ ορίζει έναν χαρακτήρα της \mathcal{W} . Επίσης, η \mathcal{W} είναι $\|\cdot\|_\infty$ -πυκνή στην $C(\mathbb{T})$, αφού περιέχει τα τριγωνομετρικά πολυώνυμα.¹³ Επομένως κάθε χαρακτήρας της \mathcal{W} επεκτείνεται μοναδικά σε χαρακτήρα της $C(\mathbb{T})$.

Αλλά γνωρίζουμε τους χαρακτήρες της $C(\mathbb{T})$: είναι ακριβώς οι εκτιμήσεις $\{\delta_z : z \in \mathbb{T}\}$ (παράγραφος 10.3.1). Δηλαδή η απεικόνιση

$$\Phi : \mathbb{T} \rightarrow \mathcal{M}(\mathcal{W}) : z \rightarrow \delta_z$$

είναι 1-1 και επί.

Δεν είναι μάλιστα δύσκολο να δείξει κανείς απευθείας (χωρίς τη χρήση του χαρακτηρισμού της $\mathcal{M}(C(K))$) ότι κάθε χαρακτήρας φ της \mathcal{W} είναι εκτίμηση.

¹³Αυτό έπεται π.χ. από το Θεώρημα Stone-Weierstrass ή από το Θεώρημα Féjer.

Απόδειξη Αν φ είναι χαρακτήρας της \mathcal{W} , θέτω $z = \varphi(f_1)$ και ισχυρίζομαι ότι $z \in \mathbb{T}$ και $\varphi = \varphi_z$. Πράγματι, αφενός έχουμε $|z| = |\varphi(f_1)| \leq \|\varphi\| \|f_1\|_{\mathcal{W}} = 1$. Αλλά από την άλλη, επειδή $f_1 \in \text{Inn}(\mathcal{W})$ άρα $\varphi(f_1) \neq 0$ έχουμε $\varphi(f_1^{-1}) = (\varphi(f_1))^{-1}$, επομένως $\frac{1}{|z|} = |\varphi(f_1^{-1})| \leq \|\varphi\| \|f_1^{-1}\|_{\mathcal{W}} = 1$. Έδειξα λοιπόν ότι $z \in \mathbb{T}$.

Τώρα, για κάθε $k \in \mathbb{Z}$ αν $f_k(e^{it}) = e^{ikt}$ έχουμε

$$z^k = (\varphi(f_1))^k = \varphi(f_1^k) = \varphi(f_k)$$

δηλαδή $\varphi(f_k) = \varphi_z(f_k)$. Επομένως οι συνεχείς γραμμικές μορφές φ και φ_z ταυτίζονται στην γραμμική θήκη του συνόλου $\{f_k : k \in \mathbb{Z}\}$, που είναι πυκνή στην \mathcal{W} , άρα ταυτίζονται παντού. Ο ισχυρισμός αποδείχθηκε.

Η απεικόνιση $\delta_z \rightarrow z$ είναι συνεχής, γιατί αν $\delta_{z_i} \xrightarrow{w^*} \delta_z$ τότε $\delta_{z_i}(f_1) \rightarrow \delta_z(f_1)$, άρα $z_i \rightarrow z$. Αφού οι δύο χώροι είναι συμπαγείς, η απεικόνιση Φ είναι ομοιομορφισμός.

Για κάθε $f \in \mathcal{W}$ και $\delta_z \in \mathcal{M}(\mathcal{W})$ όπου $z = e^{i\theta}$, έχουμε

$$\mathcal{G}(f)(\varphi_z) = \delta_z(f) = f(e^{i\theta})$$

δηλαδή, αν “ταυτίσουμε” τους χώρους \mathbb{T} και $\mathcal{M}(\mathcal{W})$, τότε η απεικόνιση Gelfand “ταυτίζεται” με την ταυτοτική απεικόνιση. Ειδικότερα, η απεικόνιση Gelfand είναι 1-1. Επίσης, η εικόνα της \mathcal{G} είναι πυκνή στην $C(\mathcal{M}(\mathcal{W}))$, γιατί η \mathcal{W} είναι πυκνή στην $C(\mathbb{T})$.

Όμως ο μετασχηματισμός Gelfand δεν απεικονίζει την \mathcal{W} επί της $C(\mathcal{M}(\mathcal{W}))$, γιατί η \mathcal{W} δεν ισούται με την $C(\mathbb{T})$: υπάρχουν συνεχείς συναρτήσεις που η σειρά Fourier τους δεν συγκλίνει απόλυτα. Ένα τέτοιο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η

$$g(e^{it}) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\sin kt}{k \log k}.$$

Αποδεικνύεται ότι η σειρά συγκλίνει ομοιόμορφα στον \mathbb{T} , άρα ορίζει συνεχή συνάρτηση, αλλά βεβαίως δεν συγκλίνει απόλυτα. (Ας θυμηθούμε επίσης ότι υπάρχουν συνεχείς συναρτήσεις που η σειρά Fourier τους δεν συγκλίνει).

Το επόμενο Θεώρημα αποδείχθηκε αρχικά από τον N. Wiener με διαφορετικές μεθόδους. Σήμερα, είναι ένα άμεσο πόρισμα της θεωρίας Gelfand.

Θεώρημα 10.16 (Wiener) Αν η $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ έχει απολύτως συγκλίνουσα σειρά Fourier και δεν μηδενίζεται πουθενά στον \mathbb{T} , τότε η $1/f$ έχει και αυτή απολύτως συγκλίνουσα σειρά Fourier.

Με άλλα λόγια:

Αν $f \in \mathcal{W}$ και $f(e^{it}) \neq 0$ για κάθε $e^{it} \in \mathbb{T}$, τότε $1/f \in \mathcal{W}$.

Απόδειξη Για κάθε $\varphi = \delta_z \in \mathcal{M}(\mathcal{W})$ από την υπόθεση έχουμε $\varphi(f) \neq 0$, οπότε (Πρόταση 10.10 (α)) $f \in \text{Inn}(\mathcal{W})$. Δηλαδή υπάρχει $g \in \mathcal{W}$ ώστε $fg = \mathbf{1}$. Οι πράξεις όμως στην \mathcal{W} έχουν ορισθεί κατά σημείο, οπότε $g(t) = 1/f(e^{it})$ για κάθε $e^{it} \in \mathbb{T}$.

Η θεωρία Gelfand επιτρέπει μια απλή απόδειξη της ακόλουθης επέκτασης του Λήμματος του Wiener.

Πρόταση 10.17 (Wiener - Levy) Αν $f \in \mathcal{W}$ και h είναι συνάρτηση ολόμορφη σε μια περιοχή του $f(\mathbb{T})$, τότε $h \circ f \in \mathcal{W}$.

Απόδειξη Παρατηρούμε πρώτα ότι

$$\sigma(f) = \{\varphi_z(f) : \varphi_z \in \mathcal{M}(\mathcal{W})\} = \{f(e^{it}) : e^{it} \in \mathbb{T}\} = f(\mathbb{T}).$$

Συνεπώς αφού η h είναι ολόμορφη σε μια περιοχή του $\sigma(f)$, από τον συναρτησιακό λογισμό για ολόμορφες συναρτήσεις ορίζεται το $\mathbf{h}(f) \in \mathcal{W}$.

Θα δείξουμε ότι $\mathbf{h}(f) = h \circ f$. Παρατηρούμε ότι αυτό αληθεύει όταν η $h = p$ είναι πολυώνυμο. Επίσης, αν q είναι πολυώνυμο που δεν μηδενίζεται στο $f(\mathbb{T})$, τότε $\mathbf{q}(f) = q \circ f \in \text{Inn}(\mathcal{W})$, άρα $\frac{1}{q \circ f} \in \mathcal{W}$. Συνεπώς η σχέση $\mathbf{h}(f) = h \circ f$ ισχύει όταν η $h = \frac{p}{q}$ είναι ρητή συνάρτηση ολόμορφη στο $f(\mathbb{T})$. Αλλά από το θεώρημα Runge, κάθε συνάρτηση h ολόμορφη σε μια περιοχή U του $f(\mathbb{T})$ προσεγγίζεται από μια ακολουθία (r_n) τέτοιων ρητών συναρτήσεων ομοιόμορφα στα συμπαγή υποσύνολα του U . Τότε όμως $\|\mathbf{h}(f) - \mathbf{r}_n(f)\|_{\mathcal{W}} \rightarrow 0$ (Θεώρημα 7.5). Συνεπώς για κάθε e^{it} έχουμε $\mathbf{h}(f)(e^{it}) = \lim_n \mathbf{r}_n(f)(e^{it}) = \lim_n (r_n \circ f)(e^{it}) = (h \circ f)(e^{it})$. \square

10.3.4 Η άλγεβρα $\ell^1(\mathbb{Z})$

Η άλγεβρα αυτή είναι ισομορφή ως άλγεβρα Banach με την άλγεβρα του Wiener μέσω του μετασχηματισμού Fourier $\mathcal{F} : \mathcal{W} \rightarrow \ell^1 : f \rightarrow \hat{f}$ (βλ. παραγρ. 2.6 και 2.8). Επομένως ο χώρος $\mathcal{M}(\ell^1)$ των χαρακτήρων της είναι ομοιομορφικός με τον \mathbb{T} .

Συγκεκριμένα η απεικόνιση $\Psi : \mathbb{T} \rightarrow \mathcal{M}(\ell^1) : z \rightarrow \psi_z$ όπου $\psi_z((x_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_n z^n$ είναι ομοιομορφισμός.

Αν “ταυτίσουμε” τους χώρους αυτούς, τότε ο μετασχηματισμός Gelfand “ταυτίζεται” με τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier, δηλαδή

$$(\mathcal{G}(x))(\Psi(e^{i\theta})) = (\mathcal{F}^{-1}(x))(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_n e^{in\theta}$$

για κάθε $x = (x_n) \in \ell^1(\mathbb{Z})$.

Όπως δείξαμε για την (ισόμορφη) άλγεβρα Wiener, ο μετασχηματισμός Gelfand είναι 1-1, και έχει πυκνή εικόνα, αλλά δεν είναι επί της $C(\mathcal{M}(\ell^1))$.

10.3.5 Η άλγεβρα $L^1(\mathbb{R})$

Ο χώρος των χαρακτήρων της $L^1(\mathbb{R})$ είναι ομοιομορφικός με τον \mathbb{R} και ο μετασχηματισμός Gelfand “είναι” ο μετασχηματισμός Fourier $L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R})$. Ο μετασχηματισμός Gelfand είναι 1-1, επομένως η $L^1(\mathbb{R})$ είναι ημιαπλή άλγεβρα.

Η συνέλιξη $(f, g) \rightarrow f * g$ όπου

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s)g(t-s)ds$$

ορίζει πολλαπλασιασμό στον $L^1(\mathbb{R})$ ως προς τον οποίο γίνεται μεταθετική άλγεβρα Banach.¹⁴

Ένα σημαντικό εργαλείο για τα επόμενα είναι το γεγονός ότι η δράση $t \rightarrow f_t$ όπου $f(s) = s - t$ της ομάδας \mathbb{R} στον χώρο \mathbb{R} επάγει μια δράση της \mathbb{R} στον χώρο $L^1(\mathbb{R})$:

Πρόταση 10.18 Η απεικόνιση

$$V_s : C_{oo}(\mathbb{R}) \rightarrow C_{oo}(\mathbb{R}) : g \rightarrow g_s$$

όπου¹⁵ $g_s(t) = g(t-s)$ επεκτείνεται σε ισομετρικό τελεστή $U_s : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^1(\mathbb{R})$. Για κάθε $g \in L^1(\mathbb{R})$ η απεικόνιση $s \rightarrow U_s(g) : \mathbb{R} \rightarrow L^1(\mathbb{R})$ είναι συνεχής.

Γράφουμε $g_s = U_s(g)$ για κάθε $g \in L^1(\mathbb{R})$ και $s \in \mathbb{R}$.

Απόδειξη Έστω $g \in C_{oo}(\mathbb{R})$. Επειδή το μέτρο Lebesgue είναι αναλλοίωτο ως προς μεταφορές, έχουμε για κάθε $s \in \mathbb{R}$

$$\|V_s(g)\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |g(t-s)|dt = \int_{\mathbb{R}} |g(x)|dx = \|g\|_1.$$

Επομένως ο (προφανώς γραμμικός) τελεστής V_s διατηρεί την $\|\cdot\|_1$ στον $C_{oo}(\mathbb{R})$. Ειδικότερα είναι $\|\cdot\|_1$ -συνεχής, άρα έχει μοναδική επέκταση σε γραμμική ισομετρία $U_s : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^1(\mathbb{R})$.

¹⁴βλ. [7], Πρόταση 11.30.

¹⁵Με $C_{oo}(\mathbb{R})$ συμβολίζουμε τον χώρο των συνεχών συναρτήσεων με συμπαγή φορέα. Είναι γνωστό ότι ο $C_{oo}(\mathbb{R})$ είναι πυκνός υπόχωρος του $L^1(\mathbb{R})$ ([7], Πρόταση 11.29).

Για τον δεύτερο ισχυρισμό, υποθέτω πρώτα ότι $g \in C_{oo}(\mathbb{R})$ και θα δείξω ότι $\lim_{s \rightarrow 0} \|U_s(g) - g\|_1 = 0$.

Πράγματι, αν η g μηδενίζεται έξω από το διάστημα $[-M, M]$, τότε η g_s μηδενίζεται έξω από το $[-M + s, M + s]$, άρα η οικογένεια $\{g_s : |s| \leq M\}$ φέρεται από το συμπαγές $[-2M, 2M]$. Επειδή η g είναι ομοιόμορφα συνεχής, για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ ώστε για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ με $|x - y| < \delta$ να ισχύει $|g(x) - g(y)| < \varepsilon/4M$. Επομένως αν $|s| < \min(\delta, M)$ έχουμε

$$\|g_s - g\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |g(t-s) - g(t)| dt = \int_{-2M}^{2M} |g(t-s) - g(t)| dt < \varepsilon$$

άρα $\lim_{s \rightarrow 0} \|U_s(g) - g\|_1 = 0$.

Αν τώρα η $g \in L^1(\mathbb{R})$ είναι τυχαία, τότε για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $g_\varepsilon \in C_{oo}(\mathbb{R})$ με $\|g - g_\varepsilon\|_1 < \varepsilon$. Από την προηγούμενη παράγραφο υπάρχει $\delta > 0$ ώστε $\|U_s(g_\varepsilon) - g_\varepsilon\|_1 < \varepsilon$ για κάθε $s \in (-\delta, \delta)$. Τότε όμως

$$\begin{aligned} \|U_s(g) - g\|_1 &\leq \|U_s(g) - U_s(g_\varepsilon)\|_1 + \|U_s(g_\varepsilon) - g_\varepsilon\|_1 + \|g_\varepsilon - g\|_1 \\ &\leq \|g - g_\varepsilon\|_1 + \|U_s(g_\varepsilon) - g_\varepsilon\|_1 + \|g_\varepsilon - g\|_1 < 3\varepsilon \end{aligned}$$

για κάθε $s \in (-\delta, \delta)$ (χρησιμοποίησα το γεγονός ότι κάθε U_s είναι ισομετρία). Αυτό δείχνει ότι $\lim_{s \rightarrow 0} \|U_s(g) - g\|_1 = 0$. Τέλος, αν $s \rightarrow s_o$ έχουμε $U_s = U_{s-s_o} U_{s_o}$ και συνεπώς

$$\lim_{s \rightarrow s_o} \|U_s(g) - U_{s_o}(g)\|_1 = \lim_{s \rightarrow s_o} \|U_{s-s_o}(U_{s_o}(g)) - U_{s_o}(g)\|_1 = 0. \quad \square$$

Η άλγεβρα $(L^1(\mathbb{R}), *)$ δεν έχει μονάδα (γιατί;). Θεωρούμε λοιπόν την μοναδοποίηση της $\mathcal{A} = L^1(\mathbb{R}) \oplus \mathbb{C}$. Η $L^1(\mathbb{R})$ είναι μεγιστικό ιδεώδες στην \mathcal{A} , συνεπώς υπάρχει ακριβώς ένας χαρακτήρας της \mathcal{A} , έστω φ_∞ , που μηδενίζει την $L^1(\mathbb{R})$. Όλοι οι άλλοι χαρακτήρες της \mathcal{A} ορίζουν χαρακτήρες της $L^1(\mathbb{R})$, και αντίστροφα κάθε χαρακτήρας ψ της $L^1(\mathbb{R})$ επεκτείνεται μοναδικά σε χαρακτήρα φ της \mathcal{A} , θέτοντας $\varphi(f, \lambda) = \psi(f) + \lambda$.

Θα δείξω ότι όλοι οι χαρακτήρες της $L^1(\mathbb{R})$ είναι της μορφής φ_ξ ($\xi \in \mathbb{R}$), όπου η απεικόνιση $\varphi_\xi : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ ορίζεται από την σχέση

$$\varphi_\xi(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-it\xi} dt$$

(το ολοκλήρωμα υπάρχει, αφού η συνάρτηση $t \rightarrow f(t)e^{-it\xi}$ ανήκει στον $L^1(\mathbb{R})$).

Η φ_ξ είναι γραμμική μορφή, η οποία δεν είναι η μηδενική (γιατί π.χ. δεν μηδενίζει την χαρακτηριστική συνάρτηση του διαστήματος $[-1, 1]$).

Ισχυρίζομαι ότι η φ_ξ είναι χαρακτήρας της $L^1(\mathbb{R})$, δηλαδή ότι $\varphi_\xi(f * g) = \varphi_\xi(f) \cdot \varphi_\xi(g)$. Πράγματι,

$$\begin{aligned}
 \varphi_\xi(f * g) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t) e^{-it\xi} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(s)g(t-s) ds \right) e^{-it\xi} dt \\
 &\stackrel{*}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-s) e^{-i(t-s)\xi} dt \right) e^{-is\xi} ds \\
 &\stackrel{**}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(r) e^{-ir\xi} dr \right) e^{-is\xi} ds \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \varphi_\xi(g) e^{-is\xi} ds = \varphi_\xi(f) \cdot \varphi_\xi(g)
 \end{aligned}$$

όπου η ισότητα (*) έπεται από το Θεώρημα Fubini και η ισότητα (**) από την “αλλαγή μεταβλητής” $r = t - s$, δηλαδή στην ουσία από το γεγονός ότι το μέτρο Lebesgue στην ομάδα \mathbb{R} είναι αναλλοίωτο ως προς μεταφορές.

Είναι εύκολη άσκηση¹⁶ να δείξεις ότι η απεικόνιση $\xi \rightarrow \varphi_\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}(L^1(\mathbb{R}))$ είναι 1-1. Θα δείξω ότι είναι επί.

Έστω λοιπόν $\varphi \in \mathcal{M}(L^1(\mathbb{R}))$. Ειδικότερα η φ είναι συνεχής γραμμική μορφή στον $L^1(\mathbb{R})$ (ανήκει στον δυικό του). Αλλά είναι γνωστό ότι ο δυικός του $L^1(\mathbb{R})$ είναι ισομετρικά ισόμορφος με τον $L^\infty(\mathbb{R})$, άρα υπάρχει¹⁷ $\chi \in L^\infty(\mathbb{R})$ ώστε

$$\varphi(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\chi(t) dt \quad (f \in L^1(\mathbb{R})).$$

Ισχυρισμός 1 Για κάθε $f \in L^1(\mathbb{R})$ με $\varphi(f) \neq 0$,

$$\varphi(f)\chi(s) = \varphi(f_s) \quad \text{σχεδόν για κάθε } s \in \mathbb{R}. \quad (9)$$

¹⁶υπολόγισε το $\varphi_\xi(f)$ για την $f(t) = \exp(-|t-1|)$.

¹⁷ βλ. [7], Θεώρημα 11.24

Απόδειξη Για κάθε $g \in L^1(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned}
 \varphi(f)\varphi(g) &= \varphi(f * g) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t)\chi(t)dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(s)f(t-s)ds \right) \chi(t)dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(s) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-s)\chi(t)dt \right) ds \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(s) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_s(t)\chi(t)dt \right) ds \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(s)\varphi(f_s)ds
 \end{aligned}$$

δηλαδή

$$\varphi(f) \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\chi(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(s)\varphi(f_s)ds.$$

Αφού η ισότητα αυτή ισχύει για κάθε $g \in L^1(\mathbb{R})$, έπεται ότι οι συναρτήσεις $s \rightarrow \varphi(f)\chi(s)$ και $s \rightarrow \varphi(f_s)$ ορίζουν τα ίδια στοιχεία του $L^\infty(\mathbb{R})$, άρα είναι σχεδόν παντού ίσες. \square

Έχουμε δείξει όμως ότι η απεικόνιση $s \rightarrow f_s : \mathbb{R} \rightarrow L^1(\mathbb{R})$ είναι συνεχής. Αφού και η φ είναι συνεχής, έπεται ότι η $s \rightarrow \varphi(f_s) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ είναι συνεχής. Αλλάζοντας λοιπόν, αν χρειασθεί, την χ σε ένα σύνολο μέτρου μηδέν, μπορώ να υποθέσω ότι η χ είναι συνεχής και ότι η ισότητα (9) ισχύει για κάθε $s \in \mathbb{R}$. Εφαρμόζοντας την ισότητα αυτή δύο φορές, μία στο σημείο $s + t$ και μία για την f_s , έχουμε

$$\varphi(f)\chi(s+t) = \varphi(f_{s+t}) = \varphi((f_s)_t) = \varphi(f_s)\chi(t) = \varphi(f)\chi(s)\chi(t)$$

από το οποίο προκύπτει (αφού $\varphi(f) \neq 0$) ότι

$$\chi(s+t) = \chi(s)\chi(t) \quad \text{για κάθε } s, t \in \mathbb{R}. \quad (10)$$

Ισχυρισμός 2 Υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ ώστε

$$\chi(t) = e^{-it\xi}.$$

Απόδειξη Παρατήρησε πρώτα ότι η χ δεν είναι μηδέν. Η σχέση (10) δίνει λοιπόν $\chi(0) = 1$. Συνεπώς από την συνέχεια της χ , σε κάποιο διάστημα γύρω απ'το 0 οι τιμές της χ θα είναι κοντά στο 1, άρα υπάρχει $\delta > 0$ ώστε

$$\int_0^\delta \chi(t)dt = b \neq 0.$$

Ισχυρίζομαι τώρα ότι η χ είναι διαφορίσιμη! Πράγματι, χρησιμοποιώντας και την (10) έχουμε

$$b\chi(s) = \int_0^\delta \chi(t)\chi(s)dt = \int_0^\delta \chi(t+s)dt = \int_s^{s+\delta} \chi(u)du.$$

Αφού η χ είναι συνεχής, το ολοκλήρωμα δεξιά είναι διαφορίσιμη συνάρτηση του s , άρα η χ είναι διαφορίσιμη.

Μπορώ λοιπόν να παραγωγίσω την (10) ως προς s :

$$\chi'(s+t) \cdot 1 = \chi'(s) \cdot \chi(t)$$

άρα, θέτοντας $s = 0$,

$$\chi'(t) = \chi'(0)\chi(t) = \lambda\chi(t).$$

Η διαφορική αυτή εξίσωση έχει γενική λύση $\chi(t) = \chi(0)e^{\lambda t} = e^{\lambda t}$. Αλλά αφού η χ είναι φραγμένη στο \mathbb{R} , το λ δεν μπορεί παρά να είναι καθαρά φανταστικός αριθμός, δηλαδή της μορφής $\lambda = -i\xi$ για κάποιο $\xi \in \mathbb{R}$. \square

Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η απεικόνιση

$$\xi \rightarrow \varphi_\xi : \mathbb{R} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathcal{M}(L^1(\mathbb{R}) \oplus \mathbb{C})$$

είναι αμφιμονοσήμαντη. Για να δείξω ότι είναι ομοιομορφισμός (όπου ο $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ είναι η συμπαγοποίηση ενός σημείου του \mathbb{R}), αρκεί να δείξω ότι είναι συνεχής. Για να δείξω την συνέχεια σε κάποιο $\xi_0 \in \mathbb{R}$, πρέπει να δείξω ότι αν $\xi \rightarrow \xi_0$, τότε $\varphi_\xi(f) \rightarrow \varphi_{\xi_0}(f)$ για κάθε $f \in L^1(\mathbb{R})$, δηλαδή ότι

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-it\xi} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-it\xi_0} dt$$

και αυτό είναι απλή συνέπεια του Θεωρήματος κυριαρχημένης σύγκλισης.

Για να δείξω την συνέχεια στο σημείο ∞ , πρέπει να δείξω ότι για κάθε $f \in L^1(\mathbb{R})$ και κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $K \subseteq \mathbb{R}$ συμπαγές ώστε $|\varphi_\xi(f)| < \varepsilon$ για κάθε $\xi \notin K$. Ισοδύναμα πρέπει να αποδειχθεί το κλασικό

Λήμμα 10.19 (Riemann - Lebesgue) Για κάθε $f \in L^1(\mathbb{R})$,

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-it\xi} dt = 0.$$

Απόδειξη Επειδή $e^{-i\pi} = -1$, έχουμε

$$\varphi_\xi(f) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\xi(t+\frac{\pi}{\xi})} dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \frac{\pi}{\xi}) e^{-it\xi} dt$$

και συνεπώς

$$2\varphi_\xi(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f(t) - f(t - \frac{\pi}{\xi})) e^{-it\xi} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (f(t) - f_{\frac{\pi}{\xi}}(t)) e^{-it\xi} dt$$

άρα

$$2|\varphi_\xi(f)| \leq \|f - f_{\frac{\pi}{\xi}}\|_1.$$

Αλλά η συνέχεια της $s \rightarrow f_s$ ως προς την νόρμα $\|\cdot\|_1$ δείχνει ότι το δεξιά μέλος τείνει στο 0 καθώς το ξ τείνει στο $\pm\infty$. \square

Δείξαμε λοιπόν ότι το \mathbb{R} είναι ομοιομορφικό με το $\mathcal{M}(L^1(\mathbb{R}))$. Αν ταυτίσουμε τους δύο αυτούς χώρους, τότε ο μετασχηματισμός Gelfand ταυτίζεται με τον μετασχηματισμό Fourier

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R}) : f \rightarrow \hat{f}$$

που ορίζεται από την σχέση

$$\hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-it\xi} dt.$$

Η συνάρτηση \hat{f} ανήκει στην $C_0(\mathbb{R})$ γιατί είναι συνεχής και $\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\xi) = 0$, όπως δείξαμε.

Ισχυρισμός Ο μετασχηματισμός Gelfand είναι 1-1.

Απόδειξη Αν $f \in L^1(\mathbb{R})$ και $\hat{f}(\xi) = 0$ για κάθε ξ , πρέπει να δείξω ότι $f = 0$ σχεδόν παντού. Αρκεί να δείξω ότι $\int f(t)h(t)dt = 0$ για “αρκετές” συναρτήσεις h . Αν $g \in L^1(\mathbb{R})$ και $\hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$, έχουμε

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(x)g(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-itx} dt \right) g(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)e^{-itx} dx \right) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\hat{g}(t)dt. \end{aligned}$$

Μένει να βρεθούν “αρκετές” συναρτήσεις της μορφής \hat{g} . Παρατηρούμε πρώτα ότι κάθε συνάρτηση της μορφής $h(t) = p(t)e^{-at^2}$ όπου $a > 0$ και p πολυώνυμο ισούται με \hat{g} για κάποια g της ίδιας μορφής (άσκηση). Συνεπώς

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)h(t)dt = 0$$

για κάθε συνάρτηση της μορφής $h(t) = p(t)e^{-at^2}$.

Ισχυρίζομαι όμως ότι κάθε συνάρτηση $\psi \in C_o(\mathbb{R})$ προσεγγίζεται ομοιόμορφα από γραμμικούς συνδυασμούς τέτοιων συναρτήσεων. Πράγματι, αν ονομάσω \mathcal{A} την γραμμική θήκη όλων των συναρτήσεων της μορφής $h(t) = \lambda + t^n e^{-at^2}$ όπου $\lambda \in \mathbb{C}, n = 0, 1, 2, \dots$ και $a > 0$, παρατηρώ ότι κάθε $h \in \mathcal{A}$ επεκτείνεται σε συνεχή συνάρτηση στην συμπαγοποίηση ενός σημείου $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ του \mathbb{R} (θέτοντας $h(\infty) = \lambda$). Έτσι η \mathcal{A} γίνεται υπάλγεβρα της $C(\mathbb{R} \cup \{\infty\})$ που περιέχει τις σταθερές, χωρίζει τα σημεία και περιέχει τον μιγαδικό συζυγή κάθε στοιχείου της. Από το Θεώρημα Stone - Weierstrass (μιγαδική μορφή) έπεται ότι η \mathcal{A} είναι πυκνή στην $C(\mathbb{R} \cup \{\infty\})$. Άρα υπάρχει ακολουθία (ψ_n) στην \mathcal{A} που συγκλίνει στην ψ ομοιόμορφα στο $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Επειδή $\psi(\infty) = 0$, η ακολουθία (h_n) όπου $h_n(t) = \psi_n(t) - \psi_n(\infty)$ συγκλίνει στην ψ ομοιόμορφα στο \mathbb{R} . Αλλά κάθε h_n είναι γραμμικός συνδυασμός όρων της μορφής $t^k e^{-at^2}$, άρα $\int_{\mathbb{R}} f h_n = 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Λόγω ομοιόμορφης σύγκλισης, έπεται ότι $\int_{\mathbb{R}} f \psi = 0$. Αφού αυτό ισχύει για κάθε $\psi \in C_o(\mathbb{R})$, συμπεραίνουμε ότι $f = 0$ σχεδόν παντού.

10.3.6 Μία μεταθετική άλγεβρα Banach που δεν είναι ημιαπλή

Το απλούστερο παράδειγμα είναι να ξεκινήσει κανείς απο ένα μηδενοδύναμο ή ψευδομηδενοδύναμο στοιχείο x μιάς άλγεβρας Banach \mathcal{B} με μονάδα, και να θεωρήσει την μικρότερη άλγεβρα Banach \mathcal{A} που παράγει το x και η μονάδα. Πρόκειται για την κλειστή θήκη της άλγεβρας των πολυωνύμων του x . Η \mathcal{A} έχει έναν μόνο χαρακτήρα, εκείνον που μηδενίζει το x . Το ριζικό της είναι επομένως ο πυρήνας του χαρακτήρα αυτού, είναι δηλαδή το (μεγιστικό!) ιδεώδες που παράγει το x .

Για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορεί κανείς να θεωρήσει την άλγεβρα $\mathcal{B} = M_n(\mathbb{C})$ και $x \in \mathcal{B}$ τον πίνακα που ικανοποιεί $x_{ij} = \delta_{i,j+1}$.

Ή ακόμα, μπορεί κανείς να πάρει $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\ell^2)$ και $x \in \mathcal{B}$ τον τελεστή που ικανοποιεί $x e_n = \frac{1}{n} e_{n+1}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

10.4 Ιδεώδη και φασματική σύνθεση

Μια μεταθετική άλγεβρα Banach \mathcal{A} με μονάδα, ¹⁸ αν είναι ημιαπλή, είναι ισομορφική, ως άλγεβρα, με μια άλγεβρα συνεχών συναρτήσεων, την άλγεβρα $\widehat{\mathcal{A}} \subseteq C(K)$ όπου $K = \mathcal{M}(\mathcal{A})$ ο συμπαγής και Hausdorff χώρος των χαρακτήρων της \mathcal{A} με την ασθενή-* τοπολογία (Θεώρημα 10.15). Επιπλέον η ανισότητα

$$\|\widehat{x}\|_\infty = \sup\{|\widehat{x}(\omega)| : \omega \in K\} = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\} = \rho(x) \leq \|x\|$$

δείχνει ότι η νόρμα $\|\cdot\|$ της \mathcal{A} είναι μεγαλύτερη από τη νόρμα $\|\cdot\|_\infty$. Αυτό σημαίνει ότι η εμφύτευση

$$(\mathcal{A}, \|\cdot\|) \rightarrow (C(K), \|\cdot\|_\infty)$$

της \mathcal{A} στην $C(K)$ μέσω του μετασχηματισμού Gelfand είναι συνεχής.

Παρατηρούμε ότι η εικόνα $\widehat{\mathcal{A}}$ της \mathcal{A} χωρίζει τα σημεία του K : αν $\omega_1 \neq \omega_2$ υπάρχει $f = \widehat{x} \in \widehat{\mathcal{A}}$ ώστε $f(\omega_1) = 0$ και $f(\omega_2) = 1$.

Ορισμός 10.5 Μια μεταθετική άλγεβρα Banach \mathcal{A} με μονάδα λέγεται **κανονική (regular)** αν για κάθε κλειστό $E \subseteq K$ και κάθε $\omega \notin E$ υπάρχει $f = \widehat{x} \in \widehat{\mathcal{A}}$ ώστε $f|_E = 0$ και $f(\omega) = 1$.

Για παράδειγμα, η άλγεβρα $\mathcal{A} = C(K)$ είναι κανονική: αυτό είναι το περιεχόμενο του λήμματος Urysohn (εδώ $\widehat{\mathcal{A}} = C(K)$).

Η άλγεβρα του δίσκου δεν είναι κανονική. Πράγματι, ξέρουμε (Παράγραφος 10.3.2) ότι $\mathcal{M}(A(\mathbb{D})) = \overline{\mathbb{D}}$. Αν E είναι άπειρο συμπαγές υποσύνολο του \mathbb{D} και μια \tilde{f} μηδενίζεται στο E , τότε μηδενίζεται παντού (από την αρχή της ταυτότητας).

Η άλγεβρα $\ell^1(\mathbb{Z})$, αλλά και η (μοναδοποίηση της) $L^1(\mathbb{R})$ είναι κανονικές άλγεβρες Banach. ¹⁹ Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση.

Αν \mathcal{A} είναι μια κανονική μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, σε κάθε κλειστό ιδεώδες $J \subseteq \mathcal{A}$ αντιστοιχεί ένα κλειστό υποσύνολο $Z(J) \subseteq K = \mathcal{M}(\mathcal{A})$, το σύνολο μηδενισμού του J :

$$Z(J) = \{\omega \in K : \widehat{x}(\omega) = 0 \text{ για κάθε } x \in J\}.$$

Δυικά, σε κάθε κλειστό υποσύνολο $Z \subseteq K$ αντιστοιχεί ένα κλειστό ιδεώδες

$$I(Z) = \{x \in \mathcal{A} : \widehat{x}(\omega) = 0 \text{ για κάθε } \omega \in Z\}.$$

¹⁸ περιοριζόμαστε για ευκολία στην περίπτωση άλγεβρας με μονάδα

¹⁹ Μάλιστα αυτό αληθεύει για την άλγεβρα $L^1(G)$ για οποιαδήποτε τοπικά συμπαγή αβελιανή ομάδα G

Στην ειδική περίπτωση $\mathcal{A} = C(K)$, η αντιστοιχία αυτή είναι αμφιμονοσήμαντη: Αν $E \subseteq K$ είναι κλειστό, το μόνο κλειστό ιδεώδες $J \subseteq C(K)$ με σύνολο μηδενισμού $Z(J) = E$ είναι το $J = I(E)$. (Απόδειξη: άσκηση.)

Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια σε όλες τις κανονικές μεταθετικές άλγεβρες Banach με μονάδα.

Ορισμός 10.6 Αν \mathcal{A} είναι μια κανονική μεταθετική άλγεβρα Banach με μονάδα, ένα κλειστό υποσύνολο $E \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{A})$ λέγεται **σύνολο σύνθεσης για την \mathcal{A}** αν το μόνο κλειστό ιδεώδες $J \subseteq \mathcal{A}$ με σύνολο μηδενισμού $Z(J) = E$ είναι το $J = I(E)$.

Αν $E \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{A})$ είναι κλειστό, ορίζουμε

$$J_0(E) = \{x \in \mathcal{A} : \text{υπάρχει ανοικτό } V \supseteq E \text{ με } \hat{x}|_V = 0\}$$

και $J(E) = \overline{J_0(E)}$.

Αποδεικνύεται ότι κάθε κλειστό ιδεώδες $J \subseteq \mathcal{A}$ με σύνολο μηδενισμού $Z(J) = E$ ικανοποιεί

$$J(E) \subseteq J \subseteq I(E).$$

Επομένως, ένα κλειστό σύνολο $E \subseteq K$ είναι σύνολο σύνθεσης αν και μόνον αν $J(E) = I(E)$, ισοδύναμα αν κάθε συνάρτηση $x \in \mathcal{A}$ που η \hat{x} μηδενίζεται στο E προσεγγίζεται (ως προς τη νόρμα της \mathcal{A}) από ακολουθία (x_n) της \mathcal{A} που οι \hat{x}_n μηδενίζονται σε περιοχές του E . Έτσι το πρόβλημα της σύνθεσης είναι ένα πρόβλημα προσέγγισης,

Για παράδειγμα, ένα κλειστό $E \subseteq \mathbb{T}$ είναι σύνολο σύνθεσης για την άλγεβρα Fourier ή Wiener \mathcal{W} αν για κάθε $f \in \mathcal{W}$ (δηλαδή της μορφής $f(t) = \sum_k \hat{f}(k)e^{ikt}$) που μηδενίζεται στο E , και κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $g \in \mathcal{W}$ (δηλαδή επίσης της μορφής $g(t) = \sum_k \hat{g}(k)e^{ikt}$) που μηδενίζεται σε μια περιοχή του E , τέτοια ώστε $\sum_k |\hat{f}(k) - \hat{g}(k)| < \epsilon$.

Το πρόβλημα της σύνθεσης είναι από τα δυσκολότερα της αρμονικής ανάλυσης. Μόλις το 1947 ο L. Schwartz έδωσε το πρώτο παράδειγμα συνόλου στον \mathbb{R}^3 που δεν είναι σύνολο σύνθεσης για την $L^1(\mathbb{R}^3)$ (το συγκεκριμένο παράδειγμα ήταν η μοναδιαία σφαίρα S_2 του \mathbb{R}^3). Το 1959 P. Malliavin έδειξε ότι για κάθε αβελιανή τοπικά συμπαγή ομάδα G που δεν είναι συμπαγής, υπάρχει $E \subseteq \mathcal{M}(L^1(G))$ που δεν είναι σύνολο σύνθεσης για την $L^1(G)$.

Περισσότερα μπορεί κανείς να βρει στο [6, Κεφάλαιο 8].

11 C^* άλγεβρες

11.1 Ενελίξεις

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι ο αξιωματικός χαρακτηρισμός εκείνων των μεταθετικών αλγεβρών Banach για τις οποίες ο μετασχηματισμός Gelfand είναι ισομετρία και επί. Μια τέτοια άλγεβρα θα είναι κατ' ανάγκην ισομετρικά ισόμορφη, δηλαδή "ίδια" ως άλγεβρα Banach, με την $C(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$. Ζητάμε δηλαδή να χαρακτηρίσουμε ως άλγεβρες Banach (και όχι απλώς ως χώρους Banach) τις άλγεβρες της μορφής $C(K)$, όπου K συμπαγής και Hausdorff τοπολογικός χώρος.

Παρατήρησε ότι κάθε $C(K)$ είναι εφοδιασμένη με μιαν ακόμη εσωτερική πράξη, την ενελίξη $f \rightarrow f^*$, όπου $f^*(t) := \overline{f(t)}$ ($t \in K$). Η ύπαρξη της ενελίξης μας επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να απομονώσουμε τον πραγματικό υπόχωρο $C_R(K)$ που αποτελείται από τις $f \in C(K)$ ώστε $f = f^*$ (τις πραγματικές συναρτήσεις) και που έχει την ιδιότητα $C(K) = C_R(K) + iC_R(K)$ (κάθε μιγαδική συνάρτηση f γράφεται κατά μοναδικό τρόπο $f = f_1 + if_2$, όπου οι $f_1 = (f + f^*)/2$ και $f_2 = (f - f^*)/2i$ ανήκουν στον $C_R(K)$). Επιτρέπει επίσης να απομονώσουμε το σύνολο $C^+(K)$ των μη αρνητικών συναρτήσεων: είναι ακριβώς εκείνες οι $f \in C(K)$ για τις οποίες υπάρχει $g \in C(K)$ με $g^*g = f$.

Υπάρχουν όμως και άλλες άλγεβρες (Banach) που εφοδιάζονται κατά φυσιολογικό τρόπο με μια ενελίξη, και που τα στοιχεία τους δεν "μοιάζουν" καθόλου με μιγαδικές συναρτήσεις, όπως η άλγεβρα $\mathcal{B}(H)$ όλων των τελεστών σ' έναν χώρο Hilbert H (βλ. παράδειγμα 5 πιο κάτω).

Οι κοινές ιδιότητες τέτοιων αλγεβρών οδηγούν στους επόμενους ορισμούς:

Ορισμός 11.1 *Ενελίξη (involution) σε μια (μιγαδική) άλγεβρα \mathcal{A} είναι μια απεικόνιση $x \rightarrow x^* : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ με τις ιδιότητες*

$$\begin{aligned}(x + y)^* &= x^* + y^* \\ (\lambda x)^* &= \bar{\lambda}x^* \\ (xy)^* &= y^*x^* \\ (x^*)^* &= x\end{aligned}$$

για κάθε $x, y \in \mathcal{A}$ και $\lambda \in \mathbb{C}$.

Ορισμός 11.2 *Μια C^* άλγεβρα \mathcal{A} είναι μια άλγεβρα Banach με ενελίξη που έχει την ιδιότητα*

$$C^* : \|x^*x\| = \|x\|^2 \quad (x \in \mathcal{A}).$$

Παρατήρησε ότι αν μια άλγεβρα \mathcal{A} με ενέλιξη έχει μονάδα $\mathbf{1}$, τότε κατ' ανάγκην $\mathbf{1}^* = \mathbf{1}$ (γιατί;). Αν επί πλέον η \mathcal{A} είναι C^* άλγεβρα, τότε $\|\mathbf{1}\| = 1$ (γιατί;).

Παρατήρηση 11.1 (i) Σε μια C^* άλγεβρα \mathcal{A} , η ενέλιξη είναι αυτομάτως συνεχής, μάλιστα είναι ισομετρία. Πράγματι, για κάθε $x \in \mathcal{A}$ έχουμε $\|x\|^2 \leq \|x^*x\| \leq \|x^*\| \cdot \|x\|$, άρα $\|x\| \leq \|x^*\|$. Εφαρμόζοντας την ανισότητα αυτή στο x^* προκύπτει $\|x^*\| \leq \|x^{**}\| = \|x\|$. Συνεπώς $\|x^*\| = \|x\|$.

(ii) Η ανισότητα $\|x\|^2 \leq \|x^*x\|$ ($x \in \mathcal{A}$) αρκεί για να εξασφαλίσει την ισχύ της ισότητας C^* , όταν η νόρμα της άλγεβρας είναι υποπολλαπλασιαστική. Πράγματι, από την ανισότητα αυτή έπεται, όπως μόλις παρατηρήσαμε, ότι $\|x^*\| = \|x\|$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$, οπότε

$$\|x\|^2 \leq \|x^*x\| \leq \|x^*\| \cdot \|x\| = \|x\|^2$$

άρα ισχύει ισότητα.

11.1.1 Παραδείγματα

1. Η άλγεβρα Banach \mathbb{C} είναι C^* άλγεβρα ως προς την ενέλιξη $\lambda \rightarrow \bar{\lambda}$.

Έχουμε δείξει (Θεώρημα Gelfand-Mazur) ότι κάθε διαιρετική C^* άλγεβρα είναι ισομετρικά ισομορφή με την \mathbb{C} .

2. Η άλγεβρα Banach $C(K)$ είναι C^* άλγεβρα ως προς την ενέλιξη $f \rightarrow f^*$, όπου $f^*(t) := \overline{f(t)}$ ($t \in K$). Πράγματι, οι αλγεβρικές ιδιότητες είναι προφανείς, και

$$\|f^*f\|_\infty = \sup\{|f^*(t)f(t)| : t \in K\} = \sup\{|f(t)|^2 : t \in K\} = \|f\|_\infty^2.$$

Θα δείξουμε (Θεώρημα Gelfand-Naimark) ότι κάθε μεταθετική C^* άλγεβρα με μονάδα είναι ισομετρικά $*$ -ισόμορφη (δηλαδή ο ισομορφισμός διατηρεί και την ενέλιξη) με κάποιον $C(K)$.

3. Η απεικόνιση $f \rightarrow f^*$ που ορίσαμε στο (2) δεν είναι εσωτερική πράξη στην $A(\mathbb{D})$ (αν $f \in A(\mathbb{D})$, η f^* δεν είναι ολόμορφη, εκτός αν είναι σταθερή). Δηλαδή η $A(\mathbb{D})$ είναι Banach υπάλγεβρα της $C(\overline{\mathbb{D}})$, όχι όμως C^* - υπάλγεβρα. Η απεικόνιση $f \rightarrow f^\#$ όπου $f^\#(z) = f^*(\bar{z})$ ($z \in \overline{\mathbb{D}}$) είναι ενέλιξη στην $A(\mathbb{D})$, και μάλιστα ισομετρική (γιατί;). Δεν ικανοποιεί όμως την ιδιότητα C^* . Παραδείγματος χάριν, αν $f(z) = \exp(iz)$, έχουμε $f^\#(z) = \exp(-iz)$, άρα $\|ff^\#\| = \|\mathbf{1}\| = 1$, αλλά $\|f\| \geq |f(-i)| = e$, άρα $\|ff^\#\| \neq \|f\|^2$.

4. Αν X είναι τοπικά συμπαγής χώρος Hausdorff, η άλγεβρα Banach $C_o(X)$ είναι C^* -άλγεβρα ως προς την ενέλιξη $f \rightarrow \bar{f}$.

Το ίδιο ισχύει και για τις άλγεβρες Banach $\ell^\infty(\Gamma)$ και $L^\infty(\Omega, \mathcal{S}, \mu)$.

5. Έστω H μιγαδικός χώρος Hilbert. Ξέρουμε ήδη ότι ο χώρος $\mathcal{B}(H)$ όλων των γραμμικών και φραγμένων τελεστών $T : H \rightarrow H$ αποτελεί άλγεβρα Banach με πολλαπλασιασμό την σύνθεση απεικονίσεων, μονάδα τον ταυτοτικό τελεστή I και νόρμα

$$\|T\| := \sup\{\|Tx\| : x \in H, \|x\| \leq 1\}.$$

Εκμεταλλευόμενοι την δομή του χώρου Hilbert, μπορούμε να ορίσουμε μια ενέλιξη στον $\mathcal{B}(H)$ ως εξής:

Για κάθε $T \in \mathcal{B}(H)$ υπάρχει μοναδικός $T^* \in \mathcal{B}(H)$ (ο **συζυγής του T**) ώστε

$$\langle T^*x, y \rangle = \langle x, Ty \rangle \quad (x, y \in H).$$

Πράγματι, για κάθε $x \in H$ η απεικόνιση

$$f_x : y \rightarrow \overline{\langle x, Ty \rangle} : H \rightarrow \mathbb{C}$$

είναι προφανώς γραμμική, και είναι φραγμένη γιατί

$$|f_x(y)| = |\overline{\langle x, Ty \rangle}| \leq \|x\| \cdot \|Ty\| \leq \|x\| \cdot \|T\| \cdot \|y\|.$$

Απο το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz, υπάρχει μοναδικό $z_x \in H$ ώστε

$$\langle y, z_x \rangle = f_x(y) = \overline{\langle x, Ty \rangle}$$

δηλαδή $\langle z_x, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$ για κάθε $y \in H$. Ελέγχεται εύκολα ότι η απεικόνιση $T^* : H \rightarrow H : x \rightarrow z_x$ είναι γραμμική, και η ανισότητα $\|z_x\| = \|f_x\| \leq \|T\| \cdot \|x\|$ δείχνει ότι είναι φραγμένη, δηλαδή $T^* \in \mathcal{B}(H)$. Η μοναδικότητα του T^* είναι εύκολη άσκηση.

[Σημειώνουμε ότι η έννοια του συζυγούς τελεστή συνδέεται, αλλά δεν ταυτίζεται με την έννοια του δυικού τελεστή που ορίζεται σε κάθε χώρο Banach. Αν $T \in \mathcal{B}(E)$, όπου E χώρος Banach, ο δυικός τελεστής ανήκει στον $\mathcal{B}(E^*)$ και όχι στον $\mathcal{B}(E)$.]

Είναι εύκολο να ελεγχθεί ότι η απεικόνιση $T \rightarrow T^*$ είναι ενέλιξη στον $\mathcal{B}(H)$. Ελέγχουμε ότι ικανοποιεί την ιδιότητα C^* : Για κάθε $x \in H$,

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle \leq \|T^*Tx\| \cdot \|x\| \leq \|T^*T\| \cdot \|x\|^2,$$

επομένως $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$ για κάθε $T \in \mathcal{B}(H)$. Όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει, η ανισότητα αυτή συνεπάγεται την ισότητα $\|T\|^2 = \|T^*T\|$ για κάθε $T \in \mathcal{B}(H)$.

Συμπέρασμα: Η άλγεβρα $\mathcal{B}(H)$ είναι (εν γένει μη μεταθετική) C^* άλγεβρα με μονάδα.

Κάθε $\|\cdot\|$ -κλειστή $*$ -υπάλγεβρα \mathcal{A} του $\mathcal{B}(\mathbb{H})$ (δηλαδή τέτοια ώστε $T \in \mathcal{A} \implies T^* \in \mathcal{A}$) είναι, φυσικά, C^* άλγεβρα. Το αξιωματικό (που δεν θα αποδείξουμε εδώ) είναι ότι ισχύει το αντίστροφο:

Θεώρημα 11.2 (Gelfand - Naimark) Κάθε C^* άλγεβρα (μεταθετική ή όχι) είναι ισομετρικά $*$ -ισόμορφη με μια $\|\cdot\|$ -κλειστή $*$ -υπάλγεβρα κάποιου $\mathcal{B}(\mathbb{H})$.

11.1.2 Η Μοναδοποίηση

Θα δείξουμε ότι κάθε C^* άλγεβρα χωρίς μονάδα εμφυτεύεται ισομετρικά ως μεγιστικό ιδεώδες σε μια C^* άλγεβρα με μονάδα.

Έστω $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ μια C^* -άλγεβρα χωρίς μονάδα (δεν υποθέτω ότι η \mathcal{A} είναι μεταθετική). Είναι εύκολο να ελέγξει κανείς ότι η μοναδοποιημένη άλγεβρα $\mathcal{A}_1 := \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ εφοδιάζεται με την ενέλιξη $(x, \lambda)^* = x^* + \bar{\lambda}$ $((x, \lambda) \in \mathcal{A}_1)$.

Ξέρουμε ότι η \mathcal{A}_1 γίνεται άλγεβρα Banach αν εφοδιασθεί με την νόρμα $\|\cdot\|_1$ όπου $\|(x, \lambda)\|_1 = \|x\| + |\lambda|$ $(x \in \mathcal{A}, \lambda \in \mathbb{C})$. Η $\|\cdot\|_1$ δεν ικανοποιεί²⁰ την ιδιότητα C^* . Υπάρχει όμως μία (ισοδύναμη) νόρμα στην \mathcal{A}_1 ως προς την οποία γίνεται C^* άλγεβρα. Η νόρμα αυτή είναι η $\|\cdot\|_\pi$ όπου π είναι η κανονική αριστερή παράσταση της \mathcal{A} στον χώρο Banach \mathcal{A} , δηλαδή $\pi(x)y = xy$ (βλ. Πρόταση 3.3). Επειδή η \mathcal{A} είναι C^* άλγεβρα, η π είναι ισομετρική: πράγματι, για κάθε $x \in \mathcal{A}$,

$$\|x\|^2 = \|xx^*\| = \|\pi(x)(x^*)\| \leq \|\pi(x)\| \cdot \|x^*\| = \|\pi(x)\| \cdot \|x\| \leq \|x\| \cdot \|x\|$$

άρα $\|\pi(x)\| = \|x\|$. Επομένως, όπως παρατηρήσαμε στην παράγραφο 3.2, αν ορίσουμε τη νόρμα

$$\|(x, \lambda)\|_\pi := \|\pi(x) + \lambda I\| = \sup\{\|xy + \lambda y\| : y \in \mathcal{A}, \|y\| \leq 1\}$$

η $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_\pi)$ γίνεται άλγεβρα Banach με μονάδα.

Ισχυρισμός Με τον ορισμό $(x, \lambda)^* = x^* + \bar{\lambda}$, η $(\mathcal{A}_1, \|\cdot\|_\pi)$ είναι C^* -άλγεβρα.

Απόδειξη Το μόνο που μένει να ελεγχθεί είναι η ιδιότητα C^* :

Έστω $a = (x, \lambda) \in \mathcal{A}_1$. Για κάθε $y \in \mathcal{A}$ με $\|y\| \leq 1$ θεωρούμε το στοιχείο

$$\begin{aligned} (y, 0)^*(x, \lambda)^*(x, \lambda)(y, 0) &= ((x, \lambda)(y, 0))^*((x, \lambda)(y, 0)) \\ &= ((xy + \lambda y)^*(xy + \lambda y), 0) = (z^*z, 0) \in \mathcal{A}_1 \end{aligned}$$

²⁰Αν παραδείγματος χάριν $x = x^* \in \mathcal{A}$ τότε $\|(x, i)^*(x, i)\|_1 = \|x\|^2 + 1$ ενώ $\|(x, i)\|_1^2 = (\|x\| + 1)^2$.

όπου το $z = xy + \lambda y$ ανήκει στην \mathcal{A} (που ικανοποιεί την ιδιότητα C^*), άρα $\|z\|^2 = \|z^*z\|$. Αλλά $\|z^*z\| = \|\pi(z^*z)\| = \|(z^*z, 0)\|_\pi$. Έχω λοιπόν

$$\begin{aligned} \|xy + \lambda y\|^2 &= \|z\|^2 = \|z^*z\| = \|(z^*z, 0)\|_\pi = \|(y, 0)^*(x, \lambda)^*(x, \lambda)(y, 0)\|_\pi \\ &\leq \|(y, 0)\|_\pi \|a^*a\|_\pi \|(y, 0)\|_\pi \leq \|a^*a\|_\pi. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\|a\|_\pi^2 = \sup\{\|xy + \lambda y\|^2 : y \in \mathcal{A}, \|y\| \leq 1\} \leq \|a^*a\|_\pi$$

και επομένως ισχύει ισότητα (Παρατήρηση 11.1). \square

11.2 Το Θεώρημα Gelfand-Naimark

Θεώρημα 11.3 Αν \mathcal{A} είναι μεταθετική C^* -άλγεβρα με μονάδα, τότε ο μετασχηματισμός Gelfand $\mathcal{G} : \mathcal{A} \rightarrow C(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$ είναι ισομετρία επί και διατηρεί την ενέλιξη, δηλαδή $(\mathcal{G}x)^* = \mathcal{G}(x^*)$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$.

Χωρίζουμε την απόδειξη σε μερικά λήμματα:

Λήμμα 11.4 (i) Αν $x \in \mathcal{A}$ και $x = x^*$, τότε $\varphi(x) \in \mathbb{R}$ για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$.

(ii) Για κάθε $y \in \mathcal{A}$ και $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, ισχύει $\varphi(y^*) = \overline{\varphi(y)}$.

Απόδειξη (i) Θυμίζω ότι $\|\varphi\| = \varphi(\mathbf{1}) = 1$. Έστω $n \in \mathbb{Z}$ και $y = x + in\mathbf{1}$. Θέτω $\varphi(x) = \alpha + i\beta$ με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Τότε $\varphi(y) = \varphi(x) + in\varphi(\mathbf{1}) = \alpha + i(\beta + n)$, οπότε

$$\begin{aligned} \alpha^2 + (\beta + n)^2 &= |\varphi(y)|^2 \leq \|y\|^2 = \|y^*y\| = \|(x - in\mathbf{1})(x + in\mathbf{1})\| \\ &= \|x^2 + n^2\mathbf{1}\| \leq \|x\|^2 + n^2 \end{aligned}$$

άρα $\alpha^2 + \beta^2 + 2\beta n \leq \|x\|^2$ για κάθε $n \in \mathbb{Z}$, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνον αν $\beta = 0$, δηλαδή $\varphi(x) \in \mathbb{R}$.

(ii) Κάθε $y \in \mathcal{A}$ γράφεται μοναδικά $y = y_1 + iy_2$ με $y_i^* = y_i$ (όπου $y_1 = (y + y^*)/2$, $y_2 = (y - y^*)/2i$). Από το (i) έχουμε $\varphi(y_i) \in \mathbb{R}$. Συνεπώς

$$\varphi(y^*) = \varphi(y_1 - iy_2) = \varphi(y_1) - i\varphi(y_2) = \overline{\varphi(y_1) + i\varphi(y_2)} = \overline{\varphi(y)}. \quad \square$$

Παρατήρηση Στην απόδειξη του Λήμματος, οι μόνες ιδιότητες του φ που χρησιμοποιήθηκαν είναι ότι $\varphi(\mathbf{1}) = 1$ και ότι $\|\varphi\| = 1$. Επομένως το συμπέρασμα του Λήμματος ισχύει για κάθε γραμμική απεικόνιση $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ που έχει αυτές τις δύο ιδιότητες. Μάλιστα, είναι φανερό ότι αρκεί η ιδιότητα $\|\varphi\| = \varphi(\mathbf{1})$. Παρατήρησε επίσης ότι η μεταθετικότητα της C^* άλγεβρας \mathcal{A} δεν χρησιμοποιήθηκε.

Λήμμα 11.5 Για κάθε $x \in \mathcal{A}$ ισχύει $\|x\| = \rho(x)$.

Απόδειξη Από την ιδιότητα C^* έχουμε

$$\|x\|^4 = \|x^*x\|^2 = \|(x^*x)^*(x^*x)\| = \|(x^*x)^2\|.$$

Αλλά η \mathcal{A} είναι μεταθετική, άρα $(x^*x)^2 = x^*xx^*x = x^*x^*xx = (x^2)^*x^2$, επομένως

$$\|x\|^4 = \|(x^2)^*x^2\| = \|x^2\|^2.$$

Με επαγωγή βρίσκουμε, για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $\|x\|^{2^n} = \|x^{2^n}\|$. Άρα

$$\rho(x) = \lim_m \|x^m\|^{1/m} = \lim_n \|x^{2^n}\|^{1/2^n} = \|x\|. \quad \square$$

Απόδειξη του Θεωρήματος 11.3 Από το Λήμμα 11.4 προκύπτει ότι ο μετασχηματισμός Gelfand διατηρεί την ενέλιξη: Πράγματι, αν $x \in \mathcal{A}$ έχουμε

$$\mathcal{G}(x^*)(\varphi) = \varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)} = \overline{\mathcal{G}(x)(\varphi)} = (\mathcal{G}x)^*(\varphi)$$

για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, άρα $\mathcal{G}(x^*) = (\mathcal{G}x)^*$.

Από το Λήμμα 11.5 έχουμε ότι

$$\|\hat{x}\|_\infty = \rho(x) = \|x\|$$

για κάθε $x \in \mathcal{A}$. Επομένως ο μετασχηματισμός Gelfand είναι ισομετρία της \mathcal{A} επί της εικόνας του $\widehat{\mathcal{A}}$, η οποία, συνεπώς, είναι $\|\cdot\|_\infty$ -κλειστή υπάλγεβρα της $C(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$. Η \mathcal{A} περιέχει τις σταθερές συναρτήσεις. Επίσης, χωρίζει τα σημεία του $\mathcal{M}(\mathcal{A})$: πράγματι αν $\varphi, \psi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ και $\hat{x}(\varphi) = \hat{x}(\psi)$, δηλαδή $\varphi(x) = \psi(x)$, για κάθε $x \in \mathcal{A}$, τότε $\varphi = \psi$. Τέλος, αν $f = \hat{x} \in \widehat{\mathcal{A}}$, τότε η $f^* = \mathcal{G}(x^*)$ ανήκει επίσης στην $\widehat{\mathcal{A}}$.

Δηλαδή η $\widehat{\mathcal{A}}$ ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος Stone - Weierstrass (μυγαδική μορφή) και επομένως ισούται με την $C(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$. \square

Παρατήρηση 11.6 Από το θεώρημα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι άλγεβρες Banach $A(\mathbb{D})$ και $\ell^1(\mathbb{Z})$ δεν είναι C^* -άλγεβρες. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν ενελίξεις στις άλγεβρες αυτές με τις οποίες να γίνονται C^* -άλγεβρες. Γιατί αν πχ. η $A(\mathbb{D})$ ήταν C^* -άλγεβρα, τότε ο μετασχηματισμός Gelfand θα ήταν ισομορφισμός επί της άλγεβρας $C(K)$, όπου K ο χώρος των χαρακτήρων της $A(\mathbb{D})$. Όμως έχουμε δείξει (Παράγραφος 10.3) ότι ο μετασχηματισμός Gelfand για την $A(\mathbb{D})$ δεν είναι επί. Το ίδιο και για την άλγεβρα $\ell^1(\mathbb{Z})$.

Πρόταση 11.7 Αν $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ είναι μεταθετικές C^* -άλγεβρες με μονάδα, τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα

1. Οι C^* -άλγεβρες \mathcal{A}_1 και \mathcal{A}_2 είναι ισομετρικά $*$ -ισόμορφες.
2. Οι άλγεβρες \mathcal{A}_1 και \mathcal{A}_2 είναι αλγεβρικά ισόμορφες.
3. Οι τοπολογικοί χώροι $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1)$ και $\mathcal{M}(\mathcal{A}_2)$ είναι ομοιομορφικοί.

Απόδειξη (1) \Rightarrow (2) Προφανές.

(2) \Rightarrow (3) Έστω $T : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2$ αλγεβρικός ισομορφισμός.

Για κάθε $\psi \in \mathcal{M}(\mathcal{A}_2)$, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\psi \circ T : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathbb{C}.$$

Είναι σύνθεση μορφισμών, άρα μορφισμός, και δεν μηδενίζεται, γιατί $\psi(T(\mathbf{1})) = \psi(\mathbf{1}) = 1$. Δηλαδή $\psi \circ T \in \mathcal{M}(\mathcal{A}_1)$. Ορίζεται λοιπόν μια απεικόνιση

$$\omega : \mathcal{M}(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathcal{M}(\mathcal{A}_1) : \psi \rightarrow \psi \circ T.$$

Η ω είναι 1-1, γιατί αν $\psi \circ T = \psi_1 \circ T$ τότε $\psi = \psi_1$ αφού η T είναι 1-1.

Η ω είναι επί, γιατί για κάθε $\phi \in \mathcal{M}(\mathcal{A}_1)$, αν $\psi = \phi \circ T^{-1}$, ο ψ είναι χαρακτήρας της \mathcal{A}_2 και $\omega(\psi) = \phi$.

Τέλος η ω είναι συνεχής ως προς τις ασθενείς- $*$ τοπολογίες, γιατί αν $\psi_i, \psi \in \mathcal{M}(\mathcal{A}_2)$ και $\psi_i \xrightarrow{w^*} \psi$, δηλαδή $\psi_i(b) \rightarrow \psi(b)$ για κάθε $b \in \mathcal{A}_2$, τότε για κάθε $a \in \mathcal{A}_1$ έχουμε

$$\omega(\psi_i)(a) = \psi_i(T(a)) \rightarrow \psi(T(a)) = \omega(\psi)(a),$$

δηλαδή $\omega(\psi_i) \xrightarrow{w^*} \omega(\psi)$. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται ότι και η ω^{-1} είναι συνεχής.

(3) \Rightarrow (1) Υποθέτουμε ότι υπάρχει ομοιομορφισμός

$$\gamma : K_2 := \mathcal{M}(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathcal{M}(\mathcal{A}_1) := K_1.$$

Τότε για κάθε $f \in C(K_1)$ η συνάρτηση $f \circ \gamma : K_2 \rightarrow \mathbb{C}$ είναι συνεχής (σύνθεση συνεχών συναρτήσεων). Έτσι ορίζεται μια απεικόνιση

$$T_1 : C(K_1) \rightarrow C(K_2) : f \rightarrow f \circ \gamma.$$

Ελέγχεται εύκολα ότι η απεικόνιση αυτή είναι 1-1 και επί, με αντίστροφη την $g \rightarrow g \circ \gamma^{-1}$.

Είναι επίσης άμεσο ότι η T_1 διατηρεί το άθροισμα το γινόμενο και την ενέλιξη:
 $(f_1 + f_2) \circ \gamma = f_1 \circ \gamma + f_2 \circ \gamma$, $(f_1 \cdot f_2) \circ \gamma = (f_1 \circ \gamma) \cdot (f_2 \circ \gamma)$, $\overline{f \circ \gamma} = \overline{f} \circ \gamma$.

Τέλος, η T_1 διατηρεί και τη νόρμα:

$$\|T_1(f)\| = \sup\{f(\gamma(t)) : t \in K_2\} = \sup\{f(s) : s \in K_1\} = \|f\|$$

όπου χρησιμοποιήσαμε ότι η γ απεικονίζει τον K_2 επί του K_1 .

Δηλαδή, η T_1 είναι ένας ισομετρικός *-ισομορφισμός από την $C(K_1)$ επί της $C(K_2)$.

Όμως, από το θεώρημα Gelfand-Naimark ξέρουμε ότι, για $i = 1, 2$, ο μετασχηματισμός Gelfand \mathcal{G}_i απεικονίζει την μεταθετική C*-άλγεβρα \mathcal{A}_i ισομετρικά και *-ισομορφικά επί της $C(K_i)$. Επομένως η σύνθεση

$$T : \mathcal{A}_1 \xrightarrow{\mathcal{G}_1} C(K_1) \xrightarrow{T_1} C(K_2) \xrightarrow{\mathcal{G}_2^{-1}} \mathcal{A}_2$$

είναι ένας ισομετρικός *-ισομορφισμός από την \mathcal{A}_1 επί της \mathcal{A}_2 .

11.3 Μεταθετικές C*-άλγεβρες χωρίς μονάδα

Αν \mathcal{A} είναι μεταθετική C*-άλγεβρα χωρίς μονάδα, η μοναδοποίηση της, \mathcal{A}_1 , με την νόρμα που ορίστηκε στην 11.1.2, είναι μεταθετική C*-άλγεβρα με μονάδα, επομένως ο μετασχηματισμός Gelfand $a \rightarrow \hat{a}$ είναι ισομετρικός *-ισομορφισμός της \mathcal{A}_1 επί της $C(K_1)$, όπου K_1 το σύνολο $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1)$ των χαρακτήρων της \mathcal{A}_1 με την ασθενή-* τοπολογία.

Παρατήρησε ότι η \mathcal{A} είναι μεγιστικό ιδεώδες της \mathcal{A}_1 , επομένως (Θεώρημα 10.7) υπάρχει μοναδικό $\varphi_\infty \in K_1$ ώστε $\ker \varphi_\infty = \mathcal{A}$. Κάθε άλλος χαρακτήρας της \mathcal{A}_1 , περιοριζόμενος στην \mathcal{A} , ορίζει έναν χαρακτήρα της \mathcal{A} . Αντίστροφα κάθε χαρακτήρας φ της \mathcal{A} επεκτείνεται μοναδικά σε έναν χαρακτήρα $\tilde{\varphi}$ της \mathcal{A}_1 θέτοντας $\tilde{\varphi}(x, \lambda) := \varphi(x) + \lambda$. Δηλαδή αν ονομάσουμε $K_o \subseteq K_1$ το σύνολο των χαρακτήρων της \mathcal{A}_1 που δεν μηδενίζουν την \mathcal{A} , έχουμε $K_1 = K_o \cup \{\varphi_\infty\}$ και $K_o = \{\tilde{\varphi} : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\}$.

Ισχυρισμός Αν K είναι ο τοπολογικός χώρος $(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$, τότε ο K είναι ομοιομορφικός με τον K_o .

Πράγματι, αν $\varphi_i, \varphi \in K$ τότε $\varphi_i(x) \rightarrow \varphi(x)$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$ αν και μόνον αν $\tilde{\varphi}_i(x, \lambda) \rightarrow \tilde{\varphi}(x, \lambda)$ για κάθε $(x, \lambda) \in \mathcal{A}_1$. Άρα η απεικόνιση $\varphi \rightarrow \tilde{\varphi} : K \rightarrow K_o$ είναι ομοιομορφισμός.

Παρατήρησε ότι για κάθε $x \in \mathcal{A}$ και $\varphi \in K$ ισχύει $\tilde{\varphi}(x, 0) = \varphi(x)$. Επομένως, αν ταυτίσουμε τους χώρους K και K_o (μέσω της απεικόνισης $\varphi \rightarrow \tilde{\varphi}$), ο μετασχηματισμός Gelfand $x \rightarrow \hat{x}$ του x (ως προς την \mathcal{A}) δεν είναι παρά ο περιορισμός του μετασχηματισμού Gelfand $(x, 0) \rightarrow \widehat{(x, 0)}$ (ως προς την \mathcal{A}_1) στον K_o , δηλαδή

$$\widehat{(x, 0)}(\tilde{\varphi}) = \hat{x}(\varphi) \quad \varphi \in K.$$

Είναι φανερό ότι οι συναρτήσεις $\widehat{(x, 0)}$ με $x \in \mathcal{A}$ είναι ακριβώς εκείνες οι συναρτήσεις $f \in C(K_1)$ με την ιδιότητα $f(\varphi_\infty) = 0$. Πράγματι κάθε $f \in C(K_1)$ είναι της μορφής $f = \hat{a}$ για ένα (μοναδικό) $a \in \mathcal{A}_1$, και ισχύει $\hat{a}(\varphi_\infty) = 0$ αν και μόνον αν $\varphi_\infty(a) = 0$, δηλαδή αν και μόνον $a \in \mathcal{A}$.

Επομένως η \mathcal{A} είναι ισομετρική και *-ισομορφική με την C^* -άλγεβρα $\{f \in C(K_1) : f(\varphi_\infty) = 0\}$.

Αλλά η απεικόνιση $f \rightarrow f|_{K_o}$ είναι ισομετρικός ισομορφισμός της $\{f \in C(K_1) : f(\varphi_\infty) = 0\}$ επί της $C_o(K_o)$.

Πράγματι: αν μία $f \in C(K_1)$ μηδενίζεται στο σημείο φ_∞ τότε (αφού είναι συνεχής στο φ_∞) για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει ανοικτή περιοχή $U \subseteq K_1$ του φ_∞ ώστε $|f(\psi)| < \varepsilon$ για κάθε $\psi \in U$. Θέτοντας $\Omega = U^c$, που είναι συμπαγές υποσύνολο του K_o , βλέπουμε ότι $f|_{K_o} \in C_o(K_o)$ (και φυσικά $\|f\|_\infty = \|f|_{K_o}\|_\infty$).

Αντίστροφα, κάθε $g \in C_o(K_o)$ επεκτείνεται στο K_1 θέτοντας $g(\varphi_\infty) = 0$, και η επέκταση είναι συνεχής στο φ_∞ , γιατί για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $K_\varepsilon \subseteq K_o$ συμπαγές ώστε $|g(\psi)| < \varepsilon$ για κάθε $\psi \notin K_\varepsilon$ (αφού $g \in C_o(K_o)$), δηλαδή υπάρχει ανοικτή περιοχή $U = (K_\varepsilon)^c$ του φ_∞ όπου $|g(\psi)| < \varepsilon$.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε το

Θεώρημα 11.8 *Αν \mathcal{A} μεταθετική C^* -άλγεβρα, ο μετασχηματισμός Gelfand είναι ισομετρικός *-ισομορφισμός της \mathcal{A} επί της $C_o(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$. Η \mathcal{A} έχει μονάδα αν και μόνον αν ο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ είναι w^* -συμπαγής.*

Απόδειξη Αν η \mathcal{A} δεν έχει μονάδα, τότε, όπως δείξαμε παραπάνω, είναι ισομετρικά *-ισόμορφη με την $C_o(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$. Επεται ότι ο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ δεν είναι w^* -συμπαγής γιατί αν ήταν, η σταθερή συνάρτηση **1** θα ανήκε στην $C_o(\mathcal{M}(\mathcal{A}), w^*)$, άρα η \mathcal{A} θα είχε μονάδα. Αν πάλι η \mathcal{A} έχει μονάδα, τότε ο $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ είναι συμπαγής, άρα $C_o(\mathcal{M}(\mathcal{A})) = C(\mathcal{M}(\mathcal{A}))$ και το αποτέλεσμα έπεται από το **11.3**. \square

11.4 Ο συναρτησιακός λογισμός για συνεχείς συναρτήσεις

Εγκαταλείπουμε τώρα τις μεταθετικές C^* άλγεβρες, και ενδιαφερόμαστε να εφαρμόσουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα σε τυχαίες C^* άλγεβρες.

Έστω \mathcal{A} μια C^* άλγεβρα με μονάδα και $x \in \mathcal{A}$. Αν p είναι πολυώνυμο, η απεικόνιση $p \rightarrow p(x)$ είναι μορφισμός από την άλγεβρα των πολυωνύμων στην \mathcal{A} . Με άλλα λόγια (δοθέντος του $x \in \mathcal{A}$) είναι ένας “κανόνας υπολογισμού” (calculus) του στοιχείου $p(x) \in \mathcal{A}$ συναρτήσεως του p . Η Θεωρία Gelfand επιτρέπει, όπως θα δούμε, να επεκτείνουμε αυτόν τον κανόνα υπολογισμού από τα πολυώνυμα σε κάποιες συνεχείς συναρτήσεις που προσεγγίζονται από πολυώνυμα²¹. Οι συναρτήσεις αυτές θα έχουν πεδίο ορισμού το φάσμα του στοιχείου x . Για να εφαρμόσουμε εδώ την μεταθετική θεωρία, είναι αναγκαίο να δείξουμε ότι, σε C^* άλγεβρες, το φάσμα δεν εξαρτάται από την άλγεβρα:

Λήμμα 11.9 *Αν \mathcal{A} είναι C^* άλγεβρα με μονάδα $\mathbf{1}$ και \mathcal{B} είναι C^* -υπό-άλγεβρα της \mathcal{A} με $\mathbf{1} \in \mathcal{B}$, τότε για κάθε $x \in \mathcal{B}$ ισχύει $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{B}}(x)$.*

Απόδειξη Αρκεί (γιατί;) να δείξουμε ότι αν το $x \in \mathcal{B}$ έχει αντίστροφο x^{-1} στην \mathcal{A} , τότε το x^{-1} είναι στοιχείο της \mathcal{B} .

Υποθέτουμε πρώτα ότι $x = x^*$, και ονομάζουμε $\mathcal{C} = C^*(x)$ την μικρότερη C^* υπό-άλγεβρα της \mathcal{A} που περιέχει το x και την $\mathbf{1}$ (είναι η κλειστή θήκη του συνόλου των πολυωνύμων του x). Είναι φανερό ότι $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}$, και ότι η \mathcal{C} είναι μεταθετική C^* άλγεβρα. Θα δείξω ότι το x είναι αντιστρέψιμο στοιχείο της \mathcal{C} . Από το Λήμμα 11.4 γνωρίζουμε ότι $\varphi(x) \in \mathbb{R}$ για κάθε $\varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$, άρα $\sigma_{\mathcal{C}}(x) = \{\varphi(x) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{C})\} \subseteq \mathbb{R}$. Συνεπώς, για κάθε $n \in \mathbb{N}$, το στοιχείο $x_n := x - \frac{i}{n}\mathbf{1}$ είναι αντιστρέψιμο στην \mathcal{C} , άρα και στην \mathcal{A} . Επειδή $\lim_n x_n = x$ και η πράξη $y \rightarrow y^{-1}$ είναι συνεχής στο σύνολο $\text{Inn}(\mathcal{A})$, η ακολουθία $((x_n)^{-1})_n$ είναι βασική και αποτελείται από στοιχεία της \mathcal{C} . Επομένως και το όριό της, x^{-1} , θα ανήκει στην \mathcal{C} και άρα στην \mathcal{B} .

Για την γενική περίπτωση θέτω $y = x^*x$ και παρατηρώ ότι, αφού το x είναι αντιστρέψιμο στην \mathcal{A} , το ίδιο ισχύει για το y (γιατί $x^{-1}(x^{-1})^* \cdot y = y \cdot x^{-1}(x^{-1})^* = \mathbf{1}$). Από την προηγούμενη παράγραφο, το y^{-1} ανήκει στην \mathcal{B} . Επειδή $\mathbf{1} = y^{-1}(x^*x) = (y^{-1}x^*)x$, η μοναδικότητα του αντιστρόφου δείχνει τώρα ότι $x^{-1} = y^{-1}x^*$, που ανήκει στην \mathcal{B} . \square

Πόρισμα 11.10 *Έστω \mathcal{A} μια C^* -άλγεβρα.*

²¹ Η επέκταση αυτή δεν προϋποθέτει τον συναρτησιακό λογισμό για ολόμορφες συναρτήσεις. Θα συγκρίνουμε τους δύο λογισμούς στο τέλος της παραγράφου.

(i) Αν $x \in \mathcal{A}$ είναι φυσιολογικό (normal) (δηλ. αν $x^*x = xx^*$) τότε $\|x\| = \rho(x)$.

(ii) Αν $x \in \mathcal{A}$ είναι αυτοσυζυγές (δηλαδή αν $x = x^*$), τότε $\sigma(x) \subseteq \mathbb{R}$.

Απόδειξη Περνώντας εν ανάγκη στην μοναδοποίηση, μπορώ να υποθέσω ότι η \mathcal{A} έχει μονάδα. Αν $x \in \mathcal{A}$ είναι φυσιολογικό, η C^* -υπόαλγεβρα $\mathcal{C} = C^*(x)$ που παράγεται από το x είναι μεταθετική, άρα $\|x\| = \rho(x)$ από το Λήμμα 11.5.

Το (ii) είναι άμεσο από το προηγούμενο Λήμμα και την απόδειξή του. \square

Παρατήρηση Η σχέση $\|x\| = \rho(x)$ δεν ισχύει βέβαια εν γένει για τυχαία στοιχεία μιάς (μη μεταθετικής) C^* άλγεβρας (π.χ. μπορεί $x^2 = 0$). Παρόλα αυτά, από το Λήμμα έπεται ότι σε μια C^* άλγεβρα \mathcal{A} η νόρμα καθορίζεται μοναδικά από την αλγεβρική δομή της \mathcal{A} . Πράγματι, για κάθε $x \in \mathcal{A}$ έχουμε $\|x\|^2 = \|x^*x\| = \rho(x^*x)$:

$$\|x\|^2 = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x^*x)\}.$$

Δηλαδή η $\|x\|^2$ ισούται με το supremum των απολύτων τιμών των στοιχείων του φάσματος $\sigma(x^*x)$, που είναι ένα καθαρά αλγεβρικό αντικείμενο. Από την παρατήρηση αυτή συμπεραίνουμε ότι οι απεικονίσεις μεταξύ C^* αλγεβρών που διατηρούν την αλγεβρική δομή είναι αυτομάτως συνεχείς. Συγκεκριμένα

Πρόταση 11.11 (Αυτόματη συνέχεια μορφισμών) Αν \mathcal{A}, \mathcal{B} είναι C^* άλγεβρες με μονάδα²² και $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ είναι $*$ -μορφισμός, τότε ο φ είναι συνεχής και μά-
λιστα $\|\varphi\| \leq 1$. Αν ο φ είναι $*$ -ισομορφισμός, τότε είναι ισομετρία.

Απόδειξη Παρατηρώ ότι το $\varphi(\mathbf{1})$ είναι μονάδα της $*$ -άλγεβρας $\varphi(\mathcal{A})$, άρα και της κλειστής της θήκης, έστω \mathcal{C} . Επομένως, περιοριζόμενος εν ανάγκη στην C^* άλγεβρα \mathcal{C} , μπορώ να υποθέσω ότι $\varphi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$. Παρατήρησε ότι $\sigma(\varphi(y)) \subseteq \sigma(y)$ (αν $\lambda\mathbf{1} - y \in \text{Inn}(\mathcal{A})$, τότε $\lambda\mathbf{1} - \varphi(y) = \varphi(\lambda\mathbf{1} - y) \in \text{Inn}(\mathcal{C})$) για κάθε $y \in \mathcal{A}$. Επομένως για κάθε $x \in \mathcal{A}$ έχουμε $\rho(\varphi(x^*x)) \leq \rho(x^*x)$, άρα

$$\|\varphi(x)\|^2 = \|\varphi(x)^*\varphi(x)\| = \rho(\varphi(x)^*\varphi(x)) = \rho(\varphi(x^*x)) \leq \rho(x^*x) = \|x^*x\| = \|x\|^2,$$

δηλαδή $\|\varphi(x)\| \leq \|x\|$. Αν ο φ είναι $*$ -ισομορφισμός, τότε εφαρμόζοντας τα προηγούμενα στον φ και στον φ^{-1} , βρίσκουμε

$$\|\varphi(x)\| \leq \|x\| = \|\varphi^{-1}(\varphi(x))\| \leq \|\varphi(x)\|$$

άρα $\|\varphi(x)\| = \|x\|$. \square

²²το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει και για C^* άλγεβρες χωρίς μονάδα

Πρόταση 11.12 (Μοναδικότητα της νόρμας) *Αν \mathcal{A} είναι μία άλγεβρα με ενέλιξη, τότε ορίζεται το πολύ μία νόρμα στην \mathcal{A} ως προς την οποία είναι C^* άλγεβρα.*

Προχωρούμε τώρα στην κατασκευή του συναρτησιακού λογισμού. Θα χρειασθεί ένα Λήμμα.

Λήμμα 11.13 *Έστω \mathcal{A} μια C^* άλγεβρα με μονάδα $\mathbf{1}$ και $x \in \mathcal{A}$ με $x^*x = xx^*$. Αν $\mathcal{C} = C^*(x)$ είναι η C^* -υπόάλγεβρα της \mathcal{A} που παράγεται από το x και την $\mathbf{1}$, τότε ο χώρος $\mathcal{M}(\mathcal{C})$ των χαρακτήρων της \mathcal{C} είναι ομοιομορφικός με το φάσμα $\sigma(x)$ του x .*

Απόδειξη Επειδή $\sigma(x) = \sigma_{\mathcal{C}}(x) = \{\varphi(x) : \varphi \in \mathcal{M}(\mathcal{C})\}$, η απεικόνιση

$$\hat{x} : \mathcal{M}(\mathcal{C}) \rightarrow \sigma(x) : \varphi \rightarrow \varphi(x)$$

είναι επί, και είναι βεβαίως συνεχής (από τον ορισμό της τοπολογίας του χώρου $\mathcal{M}(\mathcal{C})$).

Αρκεί λοιπόν να δειχθεί ότι είναι 1-1. Έστω $\varphi, \psi \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$ με $\hat{x}(\varphi) = \hat{x}(\psi)$, δηλαδή $\varphi(x) = \psi(x)$. Τότε $\varphi(x^n) = \psi(x^n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Αλλά από το Λήμμα 11.4 έχουμε $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)} = \overline{\psi(x)} = \psi(x^*)$. Επομένως $\varphi(x^{*m}) = \overline{\psi(x^{*m})}$ για κάθε $m \in \mathbb{N}$ και άρα $\varphi(x^n x^{*m}) = \psi(x^n x^{*m})$ για κάθε $n, m \in \mathbb{N}$. Όμως η \mathcal{C} είναι η κλειστή γραμμική θήκη του συνόλου $\{x^n x^{*m} : n, m = 0, 1, 2, \dots\}$ και οι φ και ψ είναι συνεχείς. Έπεται λοιπόν ότι $\varphi = \psi$. \square

Θεώρημα 11.14 (Συναρτησιακός λογισμός) *Έστω \mathcal{A} μια C^* άλγεβρα με μονάδα $\mathbf{1}$ και $x \in \mathcal{A}$. Ο συναρτησιακός λογισμός για πολυώνυμα*

$$\Phi_{\pi} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A} : p \rightarrow p(x)$$

*επεκτείνεται σε *-μορφισμό*

$$\Phi_{\mathcal{C}} : C(\sigma(x)) \rightarrow \mathcal{A}$$

*αν και μόνον αν $x^*x = xx^*$. Η επέκταση αυτή (αν υπάρχει) είναι μοναδική και ισομετρική, και το πεδίο τιμών της είναι ακριβώς η C^* -υπόάλγεβρα $C^*(x)$ της \mathcal{A} που παράγεται από το x και την $\mathbf{1}$.*

Αν $f \in C(\sigma(x))$, γράφουμε συνήθως $f(x)$ αντί για $\Phi_{\mathcal{C}}(f)$.

Απόδειξη (α) Η συνθήκη $x^*x = xx^*$ είναι αναγκαία για την ύπαρξη του Φ_c . Πράγματι, αν $f_o : \sigma(x) \rightarrow \mathbb{C}$ είναι η συνάρτηση $f_o(z) = z$, τότε (αφού η f_o είναι πολυώνυμο) $\Phi_c(f_o) = \Phi_\pi(f_o) = x$. Επομένως $x^* = (\Phi_c(f_o))^* = \Phi_c(f_o^*)$ αφού η Φ_c είναι *-μορφισμός. Αλλά οι συναρτήσεις f_o και f_o^* μετατίθενται, συνεπώς και οι εικόνες τους x και x^* πρέπει να μετατίθενται.

(β) Υποθέτουμε τώρα ότι η συνθήκη $x^*x = xx^*$ ικανοποιείται. Από το Λήμμα, η απεικόνιση $\hat{x} : \mathcal{M}(\mathcal{C}) \rightarrow \sigma(x)$ είναι ομοιομορφισμός. Είναι εύκολο να ελέγξεις ότι η απεικόνιση

$$\Psi : C(\sigma(x)) \rightarrow C(\mathcal{M}(\mathcal{C})) : f \rightarrow f \circ \hat{x}$$

είναι ισομετρικός *-ισομορφισμός. Αλλά από το Θεώρημα Gelfand - Naimark (11.3) η απεικόνιση

$$\mathcal{G}^{-1} : C(\mathcal{M}(\mathcal{C})) \rightarrow \mathcal{C} : \hat{y} \rightarrow y$$

είναι ισομετρικός *-ισομορφισμός. Αν ονομάσω Φ_c την σύνθεση $\mathcal{G}^{-1} \circ \Psi$, τότε η Φ_c είναι ισομετρικός *-ισομορφισμός της $C(\sigma(x))$ επί την $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$.

Μένει να ελεγχθεί ότι η Φ_c επεκτείνει τον συναρτησιακό λογισμό για πολυώνυμα. Αρκεί γι' αυτό να ελέγξουμε ότι $\Phi_c(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ και ότι $\Phi_c(f_o) = x$. Η πρώτη σχέση αληθεύει γιατί $\Psi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ και $\Theta(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$. Η δεύτερη επίσης αληθεύει γιατί $\Psi(f_o) = \hat{x}$ και $\Theta(\hat{x}) = x$.

(γ) (Μοναδικότητα) Έστω $\Phi : C(\sigma(x)) \rightarrow \mathcal{A}$ *-μορφισμός με $\Phi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ και $\Phi(f_o) = x$. Επειδή οι $C(\sigma(x))$ και \mathcal{A} είναι C^* άλγεβρες με μονάδα, έπεται από την Πρόταση 11.11 ότι ο Φ είναι συνεχής. Εφόσον όμως ο Φ είναι *-μορφισμός, για κάθε $n, m = 0, 1, \dots$ θα έχουμε

$$\Phi(f_o^n f_o^{*m}) = \Phi(f_o)^n \Phi(f_o)^{*m} = x^n x^{*m} = \Phi_c(f_o)^n \Phi_c(f_o)^{*m} = \Phi_c(f_o^n f_o^{*m}).$$

Επομένως οι Φ και Φ_c ταυτίζονται στην γραμμική θήκη του συνόλου $\{f_o^n f_o^{*m} : n, m = 0, 1, \dots\}$. Αλλά η γραμμική αυτή θήκη είναι αυτοσυζυγής υπάλγεβρα της $C(\sigma(x))$ που περιέχει τις σταθερές συναρτήσεις και χωρίζει τα σημεία του $\sigma(x)$. Επομένως, από το Θεώρημα Stone - Weierstrass, είναι πυκνή στην $C(\sigma(x))$. Αφού οι Φ και Φ_c είναι συνεχείς, έπεται ότι θα ταυτίζονται. \square

Είναι άμεσο πόρισμα του συναρτησιακού λογισμού ότι το Λήμμα 7.1 (φασματικής απεικόνισης) επεκτείνεται από τα πολυώνυμα σε όλη την $C(\sigma(x))$:

Θεώρημα 11.15 (φασματικής απεικόνισης) Έστω \mathcal{A} μια C^* -άλγεβρα με μονάδα. Αν $x \in \mathcal{A}$ φυσιολογικό και $f \in C(\sigma(x))$ τότε

$$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x)) = \{f(z) : z \in \sigma(x)\}.$$

Απόδειξη Αν $C^*(x)$ είναι η μικρότερη C^* -υπόαλγεβρα της \mathcal{A} που περιέχει το x και την $\mathbf{1}$, η απεικόνιση

$$\Phi_c : C(\sigma(x)) \longrightarrow C^*(x) : f \longrightarrow f(x)$$

είναι ισομορφισμός αλγεβρών. Επομένως, $\lambda \mathbf{1} - f(x) \in \text{Inn}(C^*(x))$ αν και μόνον αν $\lambda \mathbf{1} - f \in \text{Inn}(C(\sigma(x)))$. Αυτό όμως συμβαίνει αν και μόνον αν $\lambda \notin f(\sigma(x))$. Συνεπώς $\sigma_{C^*(x)}(f(x)) = f(\sigma(x))$. Ξέρουμε όμως τώρα (Λήμμα 11.4) ότι $\sigma_{C^*(x)}(f(x)) = \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$. \square

Σύγκριση των συναρτησιακών λογισμών

Ο συναρτησιακός λογισμός $\Phi_c : C(\sigma(x)) \rightarrow \mathcal{A}$ που κατασκευάσαμε επεκτείνεται, όταν η \mathcal{A} είναι C^* -άλγεβρα και το x είναι φυσιολογικό, τον συναρτησιακό λογισμό $f \rightarrow \mathbf{f}(x) : \text{Hol}(x) \rightarrow \mathcal{A}$ που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλγεβρα Banach.

Πράγματι, αν p είναι πολυώνυμο (μάς μεταβλητής), τότε $p \in \text{Hol}(x)$ και $\mathbf{p}(x) = \Phi_c(p)$. Εφόσον οι $f \rightarrow \mathbf{f}(x)$ και Φ_c είναι μορφισμοί που στέλνουν την μονάδα στην μονάδα, έπεται ότι θα ταυτίζονται και σε κάθε ρητή συνάρτηση. Αν τώρα $f \in \text{Hol}(x)$ με πεδίο ορισμού $U \supseteq \sigma(x)$, υπάρχει ακολουθία $r_n \in \text{Hol}(x)$ από ρητές συναρτήσεις που συγκλίνει στην f ομοιόμορφα στα συμπαγή υποσύνολα του U , άρα $\mathbf{r}_n(x) \rightarrow \mathbf{f}(x)$. Από την άλλη μεριά όμως η ακολουθία (r_n) συγκλίνει στην f ομοιόμορφα στο $\sigma(x)$, άρα $\Phi_c(r_n) \rightarrow \Phi_c(f)$. Επομένως $\mathbf{f}(x) = \Phi_c(f)$.

Ο λογισμός $f \rightarrow \mathbf{f}(x) : \text{Hol}(x) \rightarrow \mathcal{A}$ έχει βέβαια πολύ ευρύτερη εφαρμογή: ορίζεται για κάθε στοιχείο κάθε άλγεβρας Banach, ενώ ο Φ_c ορίζεται μόνον για C^* -άλγεβρες, και μάλιστα μόνον για φυσιολογικά στοιχεία. Από την άλλη μεριά, όταν ορίζεται, ο Φ_c έχει σημαντικότερα πλεονεκτήματα:

(α) Ορίζεται σε κάθε συνεχή συνάρτηση, όχι μόνον στην $\text{Hol}(x)$.

(β) Διατηρεί την ενέλιξη, δηλαδή

$$f(x)^* = (\Phi_c(f))^* = \Phi_c(f^*) = f^*(x) \quad \text{και}$$

(γ) είναι ισομετρικός, δηλαδή

$$\|f(x)\| = \sup\{|f(z)| : z \in \sigma(x)\}.$$

Παρατήρηση Το Θεώρημα 11.14 λέει ότι, αν x είναι ένα φυσιολογικό στοιχείο μιας C^* -άλγεβρας \mathcal{A} , “μπορούμε να θεωρούμε το x ως συνάρτηση ορισμένη

στο $\sigma(x)$ ” και, παίρνοντας σύνθεση, να κατασκευάζουμε “συναρτήσεις του x ”. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κατασκευάσουμε τα εξής χρησιμότητα στοιχεία μιας C^* άλγεβρας \mathcal{A} (μεταθετικής ή όχι):

Έστω $x \in \mathcal{A}$ με $x = x^*$ (τέτοια στοιχεία λέγονται **αυτοσυζυγή (selfadjoint)** ή καμιά φορά ερμιτιανά (hermitian)). Ξέρουμε τώρα ότι $\sigma(x) \subseteq \mathbb{R}$. Θεωρούμε τις εξής συναρτήσεις, ορισμένες στο $\sigma(x)$:

$$f_1(t) = |t|, \quad f_+(t) = (|t| + t)/2, \quad f_-(t) = (|t| - t)/2, \quad f_4(t) = \sqrt{t}$$

(η τελευταία ορίζεται μόνον όταν επιπλέον $\sigma(x) \subseteq [0, +\infty)$). Ονομάζουμε τα αντίστοιχα στοιχεία της \mathcal{A}

$$f_1(x) = |x|, \quad f_+(x) = x_+, \quad f_-(x) = x_-, \quad f_4(x) = x^{1/2}$$

Από τις αντίστοιχες ιδιότητες των συναρτήσεων συμπεραίνουμε αμέσως ότι $x = x_+ - x_-$, $|x| = x_+ + x_-$, $x_+x_- = 0 = x_-x_+$. Έτσι, κάθε αυτοσυζυγές στοιχείο μιας C^* -άλγεβρας έχει “θετικό και αρνητικό μέρος”, “απόλυτη τιμή”, και, όταν $\sigma(x) \subseteq [0, +\infty)$, “τετραγωνική ρίζα”. Ας σημειώσουμε όμως ότι η απόλυτη τιμή δεν ικανοποιεί μερικές από τις αναμενόμενες ιδιότητες: για παράδειγμα, δεν είναι εν γένει αλήθεια ότι $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Άσκηση Αν \mathcal{A} είναι C^* -άλγεβρα με μονάδα και $x = x^* \in \mathcal{A}$ με $\sigma(x) \subseteq [0, +\infty)$, να αποδειχθεί ότι η τετραγωνική ρίζα $x^{1/2}$ είναι το μοναδικό θετικό στοιχείο y της \mathcal{A} που ικανοποιεί $y^2 = x$ (λέμε ότι ένα στοιχείο y μιάς C^* -άλγεβρας \mathcal{A} είναι θετικό όταν είναι αυτοσυζυγές και $\sigma(y) \subseteq [0, +\infty)$).

Παρατήρηση Αν το x είναι φυσιολογικό στοιχείο μιας C^* άλγεβρας \mathcal{A} χωρίς μονάδα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον συναρτησιακό λογισμό θεωρώντας το x ως στοιχείο της μοναδοποίησης \mathcal{A}_1 , με την παρατήρηση ότι, αν η f είναι συνεχής στο $\sigma(x)$, το στοιχείο $f(x)$ της \mathcal{A}_1 ανήκει στην \mathcal{A} αν και μόνον αν $f(0) = 0$ (γιατί:).

Αναφορές

- [1] J.B. Conway, A course in Functional Analysis, Springer, 1985.
- [2] P. Enflo, A counterexample to the approximation problem in Banach spaces. *Acta Math.*, 130, 1973.
- [3] P.R. Halmos, A Hilbert Space Problem Book, 2nd. Edition, Springer, 1982.
- [4] H.Heuser, Functional Analysis, Wiley, 1982.
- [5] Α. Κατάβολος, Εισαγωγή στην Θεωρία Τελεστών, Εκδ. Συμμετρία, 2008.
- [6] Yitzhak Katznelson, An introduction to harmonic analysis, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Cambridge, third edition, 2004.
- [7] Γ. Κουμουλλής, Σ. Νεγρεπόντης, Θεωρία Μέτρου, Εκδ. Συμμετρία, 1988.
- [8] Σ. Νεγρεπόντης, Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής, Αθήνα 1982.
- [9] Σ. Νεγρεπόντης, Θ. Ζαχαριάδης, Ν. Καλαμίδας, Β. Φαρμάκη, Γενική Τοπολογία και Συναρτησιακή Ανάλυση, Εκδ. Συμμετρία, 1988.
- [10] W. Rudin, Real and Complex Analysis, 2nd Edition, Tata McGraw-Hill, New Delhi 1977.
- [11] W. Rudin, Functional Analysis, Tata McGraw-Hill, New Delhi 1974.