

Απειροστικός Λογισμός II

Πρόχειρες Σημειώσεις

Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα, 2008

Περιεχόμενα

1	Υπακολουθίες και βασικές ακολουθίες	1
1.1	Υπακολουθίες	1
1.2	Θεώρημα Bolzano-Weierstrass	2
1.2α'	Απόδειξη με χρήση της αρχής του κιβωτισμού	4
1.3	Ανώτερο και κατώτερο όριο ακολουθίας	5
1.4	Ακολουθίες Cauchy	9
1.5	*Παράρτημα: συζήτηση για το αξίωμα της πληρότητας	12
1.6	Ασκήσεις	14
2	Σειρές πραγματικών αριθμών	19
2.1	Σύγκλιση σειράς	19
2.2	Σειρές με μη αρνητικούς όρους	24
2.2α'	Σειρές με φθίνοντες μη αρνητικούς όρους	25
2.2β'	Ο αριθμός e	26
2.3	Γενικά κριτήρια	29
2.3α'	Απόλυτη σύγκλιση σειράς	29
2.3β'	Κριτήρια σύγκρισης	30
2.3γ'	Κριτήριο λόγου και κριτήριο ρίζας	32
2.3δ'	Το κριτήριο του Dirichlet	35
2.3ε'	*Δεκαδική παράσταση πραγματικών αριθμών	36
2.4	Δυναμοσειρές	41
2.5	Ασκήσεις	44
3	Ομοιόμορφη συνέχεια	49
3.1	Ομοιόμορφη συνέχεια	49
3.2	Χαρακτηρισμός της ομοιόμορφης συνέχειας μέσω ακολουθιών	53
3.3	Συνεχείς συναρτήσεις σε κλειστά διαστήματα	55
3.4	Συστολές – θεώρημα σταθερού σημείου	59
3.5	Ασκήσεις	60

4	Ολοκλήρωμα Riemann	65
4.1	Ο ορισμός του Darboux	65
4.2	Το κριτήριο ολοκληρωσιμότητας του Riemann	69
4.3	Δύο κλάσεις Riemann ολοκληρώσιμων συναρτήσεων	74
4.4	Ιδιότητες του ολοκληρώματος Riemann	76
4.5	Ο ορισμός του Riemann*	84
4.6	Ασκήσεις	88
5	Το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού	95
5.1	Το θεώρημα μέσης του Ολοκληρωτικού Λογισμού	95
5.2	Τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού	97
5.3	Μέθοδοι ολοκλήρωσης	101
5.4	Ασκήσεις	104
7	Θεώρημα Taylor	107
7.1	Θεώρημα Taylor	107
7.2	Δυναμοσειρές και αναπτύγματα Taylor	113
7.2α'	Η εκθετική συνάρτηση $f(x) = e^x$	113
7.2β'	Η συνάρτηση $f(x) = \cos x$	114
7.2γ'	Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$	114
7.2δ'	Η συνάρτηση $f(x) = \ln(1 + x)$, $x \in (-1, 1]$	115
7.2ε'	Η διωνυμική συνάρτηση $f(x) = (1 + x)^a$, $x > -1$	117
7.2ς'	Η συνάρτηση $f(x) = \arctan x$, $ x \leq 1$	118
7.3	Ασκήσεις	119
8	Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις	123
8.1	Ορισμός	123
8.2	Κυρτές συναρτήσεις ορισμένες σε ανοικτό διάστημα	124
8.3	Παραγωγίσιμες κυρτές συναρτήσεις	127
8.4	Ανισότητα του Jensen	128
8.5	Ασκήσεις	131
9	Υποδείξεις για τις Ασκήσεις	135
9.1	Υπακολουθίες και ακολουθίες Cauchy	135
9.2	Σειρές πραγματικών αριθμών	142
9.3	Ομοιόμορφη συνέχεια	154
9.4	Ολοκλήρωμα Riemann	161
9.5	Παράγωγος και Ολοκλήρωμα	173
9.6	Τεχνικές Ολοκλήρωσης	180
9.7	Κυρτές και Κοίλες Συναρτήσεις	189

Κεφάλαιο 1

Υπακολουθίες και βασικές ακολουθίες

1.1 Υπακολουθίες

Ορισμός 1.1.1. Έστω (a_n) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Η ακολουθία (b_n) λέγεται *υπακολουθία* της (a_n) αν υπάρχει γνησίως αύξουσα ακολουθία φυσικών αριθμών $k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$ ώστε

$$b_n = a_{k_n} \text{ για κάθε } n \in \mathbb{N}.$$

Με άλλα λόγια, οι όροι της (b_n) είναι οι $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$, όπου $k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$. Γενικά, μια ακολουθία έχει πολλές (συνήθως άπειρες το πλήθος) διαφορετικές υπακολουθίες.

Παραδείγματα 1.1.2. Έστω (a_n) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών.

(α) Η υπακολουθία (a_{2n}) των «άρτιων όρων» της (a_n) έχει όρους τους

$$a_2, a_4, a_6, \dots$$

Εδώ, $k_n = 2n$.

(β) Η υπακολουθία (a_{2n-1}) των «περιττών όρων» της (a_n) έχει όρους τους

$$a_1, a_3, a_5, \dots$$

Εδώ, $k_n = 2n - 1$.

(γ) Η υπακολουθία (a_{n^2}) της (a_n) έχει όρους τους

$$a_1, a_4, a_9, \dots$$

Εδώ, $k_n = n^2$.

(δ) Κάθε τελικό τμήμα $(a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots)$ της (a_n) είναι υπακολουθία της (a_n) . Εδώ, $k_n = m + n - 1$.

Παρατήρηση 1.1.3. Έστω (k_n) μια γνησίως αύξουσα ακολουθία φυσικών αριθμών. Τότε, $k_n \geq n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Απόδειξη. Με επαγωγή: αφού ο k_1 είναι φυσικός αριθμός, είναι φανερό ότι $k_1 \geq 1$. Για το επαγωγικό βήμα υποθέτουμε ότι $k_m \geq m$. Αφού η (k_n) είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $k_{m+1} > k_m$, άρα $k_{m+1} > m$. Αφού οι k_{m+1} και m είναι φυσικοί αριθμοί, έπεται ότι $k_{m+1} \geq m + 1$ (θυμηθείτε ότι ανάμεσα στον m και στον $m + 1$ δεν υπάρχει άλλος φυσικός). \square

Η επόμενη Πρόταση δείχνει ότι αν μια ακολουθία συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό τότε όλες οι υπακολουθίες της είναι συγκλίνουσες και συγκλίνουν στον ίδιο πραγματικό αριθμό.

Πρόταση 1.1.4. Αν $a_n \rightarrow a$ τότε για κάθε υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ισχύει $a_{k_n} \rightarrow a$.

Απόδειξη. Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού $a_n \rightarrow a$, υπάρχει $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ με την εξής ιδιότητα:

$$\text{Για κάθε } m \geq n_0 \text{ ισχύει } |a_m - a| < \varepsilon.$$

Από την Παρατήρηση 1.1.3 για κάθε $n \geq n_0$ έχουμε $k_n \geq n \geq n_0$. Θέτοντας λοιπόν $m = k_n$ στην προηγούμενη σχέση, παίρνουμε:

$$\text{Για κάθε } n \geq n_0 \text{ ισχύει } |a_{k_n} - a| < \varepsilon.$$

Αυτό αποδεικνύει ότι $a_{k_n} \rightarrow a$: για το τυχόν $\varepsilon > 0$ βρήκαμε $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε όλοι οι όροι $a_{k_{n_0}}, a_{k_{n_0+1}}, \dots$ της (a_{k_n}) να ανήκουν στο $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. \square

Παρατήρηση 1.1.5. Η προηγούμενη Πρόταση είναι πολύ χρήσιμη αν θέλουμε να δείξουμε ότι μια ακολουθία (a_n) δεν συγκλίνει σε κανέναν πραγματικό αριθμό. Αρκεί να βρούμε δύο υπακολουθίες της (a_n) οι οποίες να έχουν διαφορετικά όρια.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε την $(a_n) = (-1)^n$. Τότε, $a_{2n} = (-1)^{2n} = 1 \rightarrow 1$ και $a_{2n-1} = (-1)^{2n-1} = -1 \rightarrow -1$.

Ας υποθέσουμε ότι $a_n \rightarrow a$. Οι (a_{2n}) και (a_{2n-1}) είναι υπακολουθίες της (a_n) , πρέπει λοιπόν να ισχύει $a_{2n} \rightarrow a$ και $a_{2n-1} \rightarrow a$. Από τη μοναδικότητα του ορίου της (a_{2n}) παίρνουμε $a = 1$ και από τη μοναδικότητα του ορίου της (a_{2n-1}) παίρνουμε $a = -1$. Δηλαδή, $1 = -1$. Καταλήξαμε σε άτοπο, άρα η (a_n) δεν συγκλίνει.

1.2 Θεώρημα Bolzano-Weierstrass

Θεώρημα 1.2.1 (Bolzano-Weierstrass). Κάθε φραγμένη ακολουθία έχει τουλάχιστον μία υπακολουθία που συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό.

Θα δώσουμε δύο αποδείξεις αυτού του Θεωρήματος. Η πρώτη βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε μονότονη και φραγμένη ακολουθία συγκλίνει. Για να βρούμε συγκλίνουσα υπακολουθία μιας φραγμένης ακολουθίας αρκεί να βρούμε μια μονότονη υπακολουθία της. Το τελευταίο ισχύει εντελώς γενικά, όπως δείχνει το επόμενο Θεώρημα:

Θεώρημα 1.2.2. *Κάθε ακολουθία έχει τουλάχιστον μία μονότονη υπακολουθία.*

Απόδειξη. Θα χρειαστούμε την έννοια του σημείου κορυφής μιας ακολουθίας.

Ορισμός 1.2.3. Έστω (a_n) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Λέμε ότι ο a_m είναι **σημείο κορυφής** της (a_n) αν $a_m \geq a_n$ για κάθε $n \geq m$.

[Για να εξοικειωθείτε με τον ορισμό ελέγξτε τα εξής. Αν η (a_n) είναι φθίνουσα τότε κάθε όρος της είναι σημείο κορυφής της. Αν η (a_n) είναι γνησίως αύξουσα τότε δεν έχει κανένα σημείο κορυφής.]

Έστω (a_n) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(α) $H(a_n)$ έχει άπειρα το πλήθος σημεία κορυφής. Τότε, υπάρχουν φυσικοί αριθμοί $k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$ ώστε όλοι οι όροι $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}, \dots$ να είναι σημεία κορυφής της (a_n) (εξηγήστε γιατί). Αφού $k_n < k_{n+1}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, η (a_{k_n}) είναι υπακολουθία της (a_n) . Από τον ορισμό του σημείου κορυφής βλέπουμε ότι για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $a_{k_n} \geq a_{k_{n+1}}$ (έχουμε $k_{n+1} > k_n$ και ο a_{k_n} είναι σημείο κορυφής της (a_n)). Δηλαδή,

$$a_{k_1} \geq a_{k_2} \geq \dots \geq a_{k_n} \geq a_{k_{n+1}} \geq \dots$$

Άρα, η υπακολουθία (a_{k_n}) είναι φθίνουσα.

(β) $H(a_n)$ έχει πεπερασμένα το πλήθος σημεία κορυφής. Τότε, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ με την εξής ιδιότητα: αν $m \geq N$ τότε ο a_m δεν είναι σημείο κορυφής της (a_n) (πάρτε $N = k + 1$ όπου a_k το τελευταίο σημείο κορυφής της (a_n) ή $N = 1$ αν δεν υπάρχουν σημεία κορυφής).

Με βάση τον ορισμό του σημείου κορυφής αυτό σημαίνει ότι: αν $m \geq N$ τότε υπάρχει $n > m$ ώστε $a_n > a_m$.

Εφαρμόζουμε διαδοχικά το παραπάνω. Θέτουμε $k_1 = N$ και βρίσκουμε $k_2 > k_1$ ώστε $a_{k_2} > a_{k_1}$. Κατόπιν βρίσκουμε $k_3 > k_2$ ώστε $a_{k_3} > a_{k_2}$ και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή $k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$ ώστε

$$a_{k_1} < a_{k_2} < \dots < a_{k_n} < a_{k_{n+1}} < \dots$$

Τότε, η (a_{k_n}) είναι γνησίως αύξουσα υπακολουθία της (a_n) . □

Μπορούμε τώρα να αποδείξουμε το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass.

Απόδειξη του Θεωρήματος 1.2.1. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία. Από το Θεώρημα 1.2.2 η (a_n) έχει μονότονη υπακολουθία (a_{k_n}) . Η (a_{k_n}) είναι μονότονη και φραγμένη, συνεπώς συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό. \square

1.2α' Απόδειξη με χρήση της αρχής του κιβωτισμού

Η δεύτερη απόδειξη του Θεωρήματος Bolzano-Weierstrass χρησιμοποιεί την αρχή των κιβωτισμένων διαστημάτων. Έστω (a_n) μια φραγμένη ακολουθία πραγματικών αριθμών. Τότε, υπάρχει κλειστό διάστημα $[b_1, c_1]$ στο οποίο ανήκουν όλοι οι όροι a_n .

Χωρίζουμε το $[b_1, c_1]$ σε δύο διαδοχικά διαστήματα που έχουν το ίδιο μήκος $\frac{c_1 - b_1}{2}$: τα $[b_1, \frac{b_1 + c_1}{2}]$ και $[\frac{b_1 + c_1}{2}, c_1]$. Κάποιο από αυτά τα δύο διαστήματα περιέχει άπειρους το πλήθος όρους της (a_n) . Παίρνοντας σαν $[b_2, c_2]$ αυτό το υποδιάστημα του $[b_1, c_1]$ έχουμε δείξει το εξής.

Υπάρχει κλειστό διάστημα $[b_2, c_2] \subset [b_1, c_1]$ το οποίο περιέχει άπειρους όρους της (a_n) και έχει μήκος

$$c_2 - b_2 = \frac{c_1 - b_1}{2}.$$

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο: χωρίζουμε το $[b_2, c_2]$ σε δύο διαδοχικά διαστήματα μήκους $\frac{c_2 - b_2}{2}$: τα $[b_2, \frac{b_2 + c_2}{2}]$ και $[\frac{b_2 + c_2}{2}, c_2]$. Αφού το $[b_2, c_2]$ περιέχει άπειρους όρους της (a_n) , κάποιο από αυτά τα δύο διαστήματα περιέχει άπειρους το πλήθος όρους της (a_n) . Παίρνοντας σαν $[b_3, c_3]$ αυτό το υποδιάστημα του $[b_2, c_2]$ έχουμε δείξει το εξής.

Υπάρχει κλειστό διάστημα $[b_3, c_3] \subset [b_2, c_2]$ το οποίο περιέχει άπειρους όρους της (a_n) και έχει μήκος

$$c_3 - b_3 = \frac{c_2 - b_2}{2} = \frac{c_1 - b_1}{2^2}.$$

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε ακολουθία $([b_m, c_m])_{m \in \mathbb{N}}$ κλειστών διαστημάτων που ικανοποιεί τα εξής:

- (i) Για κάθε $m \in \mathbb{N}$ ισχύει $[b_{m+1}, c_{m+1}] \subset [b_m, c_m]$.
- (ii) Για κάθε $m \in \mathbb{N}$ ισχύει $c_m - b_m = (c_1 - b_1)/2^{m-1}$.
- (iii) Για κάθε $m \in \mathbb{N}$ υπάρχουν άπειροι όροι της (a_n) στο $[b_m, c_m]$.

Χρησιμοποιώντας την τρίτη συνθήκη, μπορούμε να βρούμε υπακολουθία (a_{k_m}) της (a_n) με την ιδιότητα: για κάθε $m \in \mathbb{N}$ ισχύει $a_{k_m} \in [b_m, c_m]$. Πράγματι, υπάρχει $k_1 \in \mathbb{N}$ ώστε $a_{k_1} \in [b_1, c_1]$ – για την ακρίβεια, όλοι οι όροι της (a_n) βρίσκονται στο $[b_1, c_1]$. Τώρα, αφού το $[b_2, c_2]$ περιέχει άπειρους όρους της (a_n) , κάποιος από αυτούς έχει δείκτη μεγαλύτερο από k_1 . Δηλαδή, υπάρχει $k_2 > k_1$ ώστε $a_{k_2} \in [b_2, c_2]$. Με τον ίδιο τρόπο, αν έχουν οριστεί $k_1 < \dots < k_m$ ώστε $a_{k_s} \in [b_s, c_s]$ για κάθε $s = 1, \dots, m$, μπορούμε να βρούμε $k_{m+1} > k_m$ ώστε $a_{k_{m+1}} \in [b_{m+1}, c_{m+1}]$ (διότι, το $[b_{m+1}, c_{m+1}]$ περιέχει άπειρους όρους της (a_n)). Έτσι, ορίζεται μια υπακολουθία (a_{k_m}) της (a_n) που ικανοποιεί το ζητούμενο.

Θα δείξουμε ότι η (a_{k_m}) συγκλίνει. Από την αρχή των κιβωτισμένων διαστημάτων (και λόγω της (ii)) υπάρχει μοναδικός $a \in \mathbb{R}$ ο οποίος ανήκει σε όλα τα κλειστά διαστήματα $[b_m, c_m]$. Θυμηθείτε ότι

$$\lim_{m \rightarrow \infty} b_m = a = \lim_{m \rightarrow \infty} c_m.$$

Αφού $b_m \leq a_{k_m} \leq c_m$ για κάθε m , το κριτήριο των ισοσυγκλινοσών ακολουθιών δείχνει ότι $a_{k_m} \rightarrow a$. \square

1.3 Ανώτερο και κατώτερο όριο ακολουθίας

Σκοπός μας σε αυτήν την Παράγραφο είναι να μελετήσουμε πιο προσεκτικά τις υπακολουθίες μιας φραγμένης ακολουθίας. Θυμηθείτε ότι αν η ακολουθία (a_n) συγκλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό a τότε η κατάσταση είναι πολύ απλή. Αν (a_{k_n}) είναι τυχούσα υπακολουθία της (a_n) , τότε $a_{k_n} \rightarrow a$. Δηλαδή, όλες οι υπακολουθίες μιας συγκλίνουσας ακολουθίας συγκλίνουν και μάλιστα στο όριο της ακολουθίας.

Ορισμός 1.3.1. Έστω (a_n) μια ακολουθία. Λέμε ότι ο $x \in \mathbb{R}$ είναι **οριακό σημείο** (ή **υπακολουθιακό όριο** ή **οριακό σημείο**) της (a_n) αν υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow x$.

Τα οριακά σημεία μιας ακολουθίας χαρακτηρίζονται από το επόμενο Λήμμα.

Λήμμα 1.3.2. *Ο x είναι οριακό σημείο της (a_n) αν και μόνο αν για κάθε $\varepsilon > 0$ και για κάθε $m \in \mathbb{N}$ υπάρχει $n \geq m$ ώστε $|a_n - x| < \varepsilon$.*

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι ο x είναι οριακό σημείο της (a_n) . Υπάρχει λοιπόν υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow x$.

Έστω $\varepsilon > 0$ και $m \in \mathbb{N}$. Υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε $|a_{k_n} - x| < \varepsilon$ για κάθε $n \geq n_0$. Θεωρούμε τον $n_1 = \max\{m, n_0\}$. Τότε $k_{n_1} \geq n_1 \geq m$ και $n_1 \geq n_0$, άρα $|a_{k_{n_1}} - x| < \varepsilon$.

Αντίστροφα: Παίρνουμε $\varepsilon = 1$ και $m = 1$. Από την υπόθεση υπάρχει $k_1 \geq 1$ ώστε $|a_{k_1} - x| < 1$. Στη συνέχεια παίρνουμε $\varepsilon = \frac{1}{2}$ και $m = k_1 + 1$. Εφαρμόζοντας την υπόθεση βρίσκουμε $k_2 \geq k_1 + 1 > k_1$ ώστε $|a_{k_2} - x| < \frac{1}{2}$.

Επαγωγικά βρίσκουμε $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ ώστε

$$|a_{k_n} - x| < \frac{1}{n}$$

(κάνετε μόνοι σας το επαγωγικό βήμα). Είναι φανερό ότι $a_{k_n} \rightarrow x$. \square

Έστω (a_n) μια φραγμένη ακολουθία. Δηλαδή, υπάρχει $M > 0$ ώστε $|a_n| \leq M$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Θεωρούμε το σύνολο

$$K = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ είναι οριακό σημείο της } (a_n)\}.$$

1. Το K είναι μη κενό. Από το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass υπάρχει τουλάχιστον μία υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) που συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό. Το όριο της (a_{k_n}) είναι εξ ορισμού στοιχείο του K .

2. Το K είναι φραγμένο. Αν $x \in K$, υπάρχει $a_{k_n} \rightarrow x$ και αφού $-M \leq a_{k_n} \leq M$ για κάθε n , έπεται ότι $-M \leq x \leq M$.

Από το αξίωμα της πληρότητας προκύπτει ότι υπάρχουν τα $\sup K$ και $\inf K$. Το επόμενο Λήμμα δείχνει ότι το K έχει μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο.

Λήμμα 1.3.3. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία και

$$K = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ είναι οριακό σημείο της } (a_n)\}.$$

Τότε, $\sup K \in K$ και $\inf K \in K$.

Απόδειξη. Έστω $a = \sup K$. Θέλουμε να δείξουμε ότι ο a είναι οριακό σημείο της (a_n) , και σύμφωνα με το Λήμμα 1.3.2 αρκεί να δούμε ότι για κάθε $\varepsilon > 0$ και για κάθε $m \in \mathbb{N}$ υπάρχει $n \geq m$ ώστε $|a_n - a| < \varepsilon$.

Έστω $\varepsilon > 0$ και $m \in \mathbb{N}$. Αφού $a = \sup K$, υπάρχει $x \in K$ ώστε $a - \frac{\varepsilon}{2} < x \leq a$. Ο x είναι οριακό σημείο της (a_n) , άρα υπάρχει $n \geq m$ ώστε $|a_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$. Τότε,

$$|a_n - a| \leq |a_n - x| + |x - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Με ανάλογο τρόπο δείχνουμε ότι $\inf K \in K$. \square

Ορισμός 1.3.4. Έστω (a_n) μια φραγμένη ακολουθία. Αν

$$K = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ είναι οριακό σημείο της } (a_n)\},$$

ορίζουμε

(i) $\limsup a_n = \sup K$, το **ανώτερο όριο** της (a_n) ,

(ii) $\liminf a_n = \inf K$ το **κατώτερο όριο** της (a_n) .

Σύμφωνα με το Λήμμα 1.3.3, το $\limsup a_n$ είναι το μέγιστο στοιχείο και το $\liminf a_n$ είναι το ελάχιστο στοιχείο του K αντίστοιχα:

Θεώρημα 1.3.5. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία. Το $\limsup a_n$ είναι ο μεγαλύτερος πραγματικός αριθμός x για τον οποίο υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) με $a_{k_n} \rightarrow x$. Το $\liminf a_n$ είναι ο μικρότερος πραγματικός αριθμός y για τον οποίο υπάρχει υπακολουθία (a_{l_n}) της (a_n) με $a_{l_n} \rightarrow y$. \square

Το ανώτερο και το κατώτερο όριο μιας φραγμένης ακολουθίας περιγράφονται μέσω των περιοχών τους ως εξής:

Θεώρημα 1.3.6. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία πραγματικών αριθμών και έστω $x \in \mathbb{R}$. Τότε,

(1) $x \leq \limsup a_n$ αν και μόνο αν: για κάθε $\varepsilon > 0$ το σύνολο $\{n \in \mathbb{N} : x - \varepsilon < a_n\}$ είναι άπειρο.

(2) $x \geq \limsup a_n$ αν και μόνο αν: για κάθε $\varepsilon > 0$ το σύνολο $\{n \in \mathbb{N} : x + \varepsilon < a_n\}$ είναι πεπερασμένο.

(3) $x \geq \liminf a_n$ αν και μόνο αν: για κάθε $\varepsilon > 0$ το σύνολο $\{n \in \mathbb{N} : a_n < x + \varepsilon\}$ είναι άπειρο.

(4) $x \leq \liminf a_n$ αν και μόνο αν: για κάθε $\varepsilon > 0$ το σύνολο $\{n \in \mathbb{N} : a_n < x - \varepsilon\}$ είναι πεπερασμένο.

(5) $x = \limsup a_n$ αν και μόνο αν: για κάθε $\varepsilon > 0$ το $\{n \in \mathbb{N} : x - \varepsilon < a_n\}$ είναι άπειρο και το $\{n \in \mathbb{N} : x + \varepsilon < a_n\}$ είναι πεπερασμένο.

(6) $x = \liminf a_n$ αν και μόνο αν: για κάθε $\varepsilon > 0$ το $\{n \in \mathbb{N} : a_n < x + \varepsilon\}$ είναι άπειρο και το $\{n \in \mathbb{N} : a_n < x - \varepsilon\}$ είναι πεπερασμένο.

Απόδειξη. (1: \Rightarrow) Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) με $a_{k_n} \rightarrow \limsup a_n$, άρα υπάρχει n_0 ώστε για κάθε $n \geq n_0$

$$a_{k_n} > \limsup a_n - \varepsilon \geq x - \varepsilon.$$

Έπεται ότι το $\{n : a_n > x - \varepsilon\}$ είναι άπειρο.

(2: \Rightarrow) Έστω $\varepsilon > 0$. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ με $a_{k_n} > x + \varepsilon$. Τότε, η υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) έχει όλους τους όρους της μεγαλύτερους από $x + \varepsilon$. Μπορούμε να βρούμε συγκλίνουσα υπακολουθία $(a_{k_{s_n}})$ της (a_{k_n}) (από το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass) και τότε $a_{k_{s_n}} \rightarrow y \geq x + \varepsilon$. Όμως τότε, η $(a_{k_{s_n}})$ είναι υπακολουθία της (a_n) (εξηγήστε γιατί), οπότε

$$\limsup a_n \geq y \geq x + \varepsilon \geq \limsup a_n + \varepsilon.$$

Αυτό είναι άτοπο. Άρα, το $\{n : a_n > x + \varepsilon\}$ είναι πεπερασμένο.

(1: \Leftarrow) Έστω ότι $x > \limsup a_n$. Τότε υπάρχει $\varepsilon > 0$ ώστε αν $y = x - \varepsilon$ να έχουμε $x > y > \limsup a_n$. Από την υπόθεσή μας, το $\{n \in \mathbb{N} : y < a_n\}$ είναι άπειρο. Όμως $y > \limsup a_n$ οπότε από την (2: \Rightarrow) το σύνολο $\{n \in \mathbb{N} : y < a_n\}$ είναι πεπερασμένο (γράψτε $y = \limsup a_n + \varepsilon_1$ για κάποιο $\varepsilon_1 > 0$). Οι δύο ισχυρισμοί έρχονται σε αντίφαση.

(2: \Leftarrow) Όμοια, υποθέτουμε ότι $x < \limsup a_n$ και βρίσκουμε y ώστε $x < y < \limsup a_n$. Αφού $y > x$, συμπεραίνουμε ότι το $\{n \in \mathbb{N} : y < a_n\}$ είναι πεπερασμένο (αυτή είναι η υπόθεσή μας) και αφού $y < \limsup a_n$ συμπεραίνουμε ότι το $\{n \in \mathbb{N} : y < a_n\}$ είναι άπειρο (από την (1: \Rightarrow)). Έτσι καταλήγουμε σε άτοπο.

Η (5) είναι άμεση συνέπεια των (1) και (2).

Για τις (3), (4) και (6) εργαζόμαστε όμοια. \square

Μια εναλλακτική περιγραφή των $\limsup a_n$ και $\liminf a_n$ δίνεται από το επόμενο θεώρημα:

Θεώρημα 1.3.7. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία.

(α) Θέτουμε $b_n = \sup\{a_k : k \geq n\}$. Τότε, $\limsup a_n = \inf\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$.

(β) Θέτουμε $\gamma_n = \inf\{a_k : k \geq n\}$. Τότε, $\liminf a_n = \sup\{\gamma_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Απόδειξη. Δείχνουμε πρώτα ότι οι αριθμοί $\inf\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ και $\sup\{\gamma_n : n \in \mathbb{N}\}$ ορίζονται καλά:

Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, ισχύει $\gamma_n \leq a_n \leq b_n$ (εξηγήστε γιατί). Επίσης, η (b_n) είναι φθίνουσα, ενώ η (a_n) είναι αύξουσα (εξηγήστε γιατί). Αφού η (a_n) είναι φραγμένη, έπεται ότι η (b_n) είναι φθίνουσα και κάτω φραγμένη, ενώ η (γ_n) είναι αύξουσα και άνω φραγμένη. Από το θεώρημα σύγκλισης μονότονων ακολουθιών συμπεραίνουμε ότι $b_n \rightarrow \inf\{b_n : n \in \mathbb{N}\} := b$ και $\gamma_n \rightarrow \sup\{\gamma_n : n \in \mathbb{N}\} := \gamma$.

Θα δείξουμε ότι $\limsup a_n = b$. Από το Λήμμα 1.3.3 υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) με $a_{k_n} \rightarrow \limsup a_n$. Όμως, $a_{k_n} \leq b_{k_n}$ και $b_{k_n} \rightarrow b$ (εξηγήστε γιατί). Άρα,

$$\limsup a_n = \lim a_{k_n} \leq \lim b_{k_n} = b.$$

Για την αντίστροφη ανισότητα δείχνουμε ότι ο b είναι οριακό σημείο της (a_n) . Έστω $\varepsilon > 0$ και έστω $m \in \mathbb{N}$. Υπάρχει $n \geq m$ ώστε $|b - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. Αλλά, $b_n = \sup\{a_k : k \geq n\}$, άρα υπάρχει $k \geq n \geq m$ ώστε $b_n \geq a_k > b_n - \frac{\varepsilon}{2}$ δηλαδή $|b_n - a_k| < \frac{\varepsilon}{2}$. Έπεται ότι

$$|b - a_k| \leq |b - b_n| + |b_n - a_k| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Από το Λήμμα 1.3.2 ο b είναι οριακό σημείο της (a_n) , και συνεπώς, $b \leq \limsup a_n$.

Με ανάλογο τρόπο δείχνουμε ότι $\liminf a_n = \gamma$. \square

Κλείνουμε με έναν χαρακτηρισμό της σύγκλισης για φραγμένες ακολουθίες.

Θεώρημα 1.3.8. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία. Η (a_n) συγκλίνει αν και μόνο αν $\limsup a_n = \liminf a_n$.

Απόδειξη. Αν $a_n \rightarrow a$ τότε για κάθε υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) έχουμε $a_{k_n} \rightarrow a$. Επομένως, ο a είναι το μοναδικό οριακό σημείο της (a_n) . Έχουμε $K = \{a\}$, άρα

$$\limsup a_n = \liminf a_n = a.$$

Αντίστροφα: έστω $\varepsilon > 0$. Από το Θεώρημα 1.3.6 ο αριθμός $a = \limsup a_n = \liminf a_n$ έχει την εξής ιδιότητα:

Τα σύνολα $\{n \in \mathbb{N} : a_n < a - \varepsilon\}$ και $\{n \in \mathbb{N} : a_n > a + \varepsilon\}$ είναι πεπερασμένα.

Δηλαδή, το σύνολο

$$\{n \in \mathbb{N} : |a_n - a| > \varepsilon\}$$

είναι πεπερασμένο. Ισοδύναμα, υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ με την ιδιότητα: για κάθε $n \geq n_0$,

$$|a_n - a| \leq \varepsilon.$$

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, έπεται ότι $a_n \rightarrow a$. \square

Παρατήρηση 1.3.9. Ας υποθέσουμε ότι η ακολουθία (a_n) δεν είναι φραγμένη. Αν η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη, τότε υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow +\infty$ (άσκηση). Με άλλα λόγια, ο $+\infty$ είναι «οριακό σημείο» της (a_n) . Σε αυτήν την περίπτωση είναι λογικό να ορίσουμε $\limsup a_n = +\infty$. Εντελώς ανάλογα, αν η (a_n) δεν είναι κάτω φραγμένη, τότε υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow -\infty$ (άσκηση). Δηλαδή, ο $-\infty$ είναι «οριακό σημείο» της (a_n) . Τότε, ορίζουμε $\liminf a_n = -\infty$.

1.4 Ακολουθίες Cauchy

Ο ορισμός της ακολουθίας Cauchy έχει σαν αφετηρία την εξής παρατήρηση: ας υποθέσουμε ότι $a_n \rightarrow a$. Τότε, οι όροι της (a_n) είναι τελικά «κοντά» στο a , άρα είναι τελικά και «μεταξύ τους κοντά». Για να εκφράσουμε αυστηρά αυτή την παρατήρηση, ας θεωρήσουμε τυχόν $\varepsilon > 0$. Υπάρχει $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε για κάθε $n \geq n_0$ να ισχύει $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Τότε, για κάθε $n, m \geq n_0$ έχουμε

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ορισμός 1.4.1. Μια ακολουθία (a_n) λέγεται **ακολουθία Cauchy** (ή βασική ακολουθία) αν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε:

$$\text{αν } m, n \geq n_0(\varepsilon), \text{ τότε } |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Παρατήρηση 1.4.2. Αν η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy, τότε για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε

$$\text{αν } n \geq n_0(\varepsilon), \text{ τότε } |a_n - a_{n+1}| < \varepsilon.$$

Το αντίστροφο δεν ισχύει: αν, από κάποιον δείκτη και πέρα, διαδοχικοί όροι είναι κοντά, δεν έπεται ότι η ακολουθία είναι Cauchy. Για παράδειγμα, θεωρήστε την

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Τότε,

$$|a_{n+1} - a_n| = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$$

όταν $n \rightarrow \infty$, όμως

$$|a_{2n} - a_n| = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \geq \frac{n}{\sqrt{2n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}} \rightarrow +\infty$$

όταν $n \rightarrow \infty$, απ' όπου βλέπουμε ότι η (a_n) δεν είναι ακολουθία Cauchy. Πράγματι, αν η (a_n) ήταν ακολουθία Cauchy, θα έπρεπε (εφαρμόζοντας τον ορισμό με $\varepsilon = 1$) για μεγάλα $n, m = 2n$ να ισχύει

$$|a_{2n} - a_n| < 1 \text{ δηλαδή } \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}} < 1,$$

το οποίο οδηγεί σε άτοπο.

Σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι μια ακολουθία πραγματικών αριθμών είναι συγκλίνουσα αν και μόνο αν είναι ακολουθία Cauchy. Η απόδειξη γίνεται σε τρία βήματα.

Πρόταση 1.4.3. Κάθε ακολουθία Cauchy είναι φραγμένη.

Απόδειξη. Έστω (a_n) ακολουθία Cauchy. Πάρτε $\varepsilon = 1 > 0$ στον ορισμό: υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε $|a_n - a_m| < 1$ για κάθε $n, m \geq n_0$. Ειδικότερα, $|a_n - a_{n_0}| < 1$ για κάθε $n > n_0$. Δηλαδή,

$$|a_n| < 1 + |a_{n_0}| \text{ για κάθε } n > n_0.$$

Θέτουμε $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{n_0}|, 1 + |a_{n_0}|\}$ και εύκολα επαληθεύουμε ότι

$$|a_n| \leq M$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. □

Πρόταση 1.4.4. *Αν μια ακολουθία Cauchy (a_n) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία, τότε η (a_n) συγκλίνει.*

Απόδειξη. Υποθέτουμε ότι η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy και ότι η υπακολουθία (a_{k_n}) συγκλίνει στο $a \in \mathbb{R}$. Θα δείξουμε ότι $a_n \rightarrow a$.

Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού $a_{k_n} \rightarrow a$, υπάρχει $n_1 \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n \geq n_1$,

$$|a_{k_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Αφού η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy, υπάρχει $n_2 \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n, m \geq n_2$

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Θέτουμε $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Έστω $n \geq n_0$. Τότε $k_n \geq n \geq n_0 \geq n_1$, άρα

$$|a_{k_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Επίσης $k_n, n \geq n_0 \geq n_2$, άρα

$$|a_{k_n} - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Έπεται ότι

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{k_n}| + |a_{k_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Δηλαδή, $|a_n - a| < \varepsilon$ για κάθε $n \geq n_0$. Αυτό σημαίνει ότι $a_n \rightarrow a$. \square

Θεώρημα 1.4.5. *Μια ακολουθία (a_n) συγκλίνει αν και μόνο αν είναι ακολουθία Cauchy.*

Απόδειξη. Η μία κατεύθυνση αποδείχτηκε στην εισαγωγή αυτής της παραγράφου: αν υποθέσουμε ότι $a_n \rightarrow a$ και αν θεωρήσουμε τυχόν $\varepsilon > 0$, υπάρχει $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε για κάθε $n \geq n_0$ να ισχύει $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Τότε, για κάθε $n, m \geq n_0$ έχουμε

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Άρα, η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση: έστω (a_n) ακολουθία Cauchy. Από την Πρόταση 1.4.3, η (a_n) είναι φραγμένη. Από το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass, η (a_n) έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Τέλος, από την Πρόταση 1.4.4 έπεται ότι η (a_n) συγκλίνει. \square

Αυτό το κριτήριο σύγκλισης είναι πολύ χρήσιμο. Πολλές φορές θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη ορίου για μια ακολουθία χωρίς να μας ενδιαφέρει

η τιμή του ορίου. Αρκεί να δείξουμε ότι η ακολουθία είναι Cauchy, δηλαδή ότι οι όροι της είναι «κοντά» για μεγάλους δείκτες, κάτι που δεν απαιτεί να μαντέψουμε εκ των προτέρων ποιό είναι το όριο. Αντίθετα, για να δουλέψουμε με τον ορισμό του ορίου, πρέπει ήδη να ξέρουμε ποιό είναι το υποψήφιο όριο (συγκρίνετε τους δύο ορισμούς: « $a_n \rightarrow a$ » και « (a_n) ακολουθία Cauchy».)

1.5 *Παράρτημα: συζήτηση για το αξίωμα της πληρότητας

Όλη μας η δουλειά ξεκινάει με την «παραδοχή» ότι το \mathbb{R} είναι ένα διατεταγμένο σώμα που ικανοποιεί το αξίωμα της πληρότητας: κάθε μη κενό, άνω φραγμένο υποσύνολό του έχει ελάχιστο άνω φράγμα. Χρησιμοποιώντας την υπαρξη supremum δείξαμε την Αρχιμήδεια ιδιότητα:

(*) Αν $a \in \mathbb{R}$ και $\varepsilon > 0$, υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $n\varepsilon > a$.

Χρησιμοποιώντας και πάλι το αξίωμα της πληρότητας, δείξαμε ότι κάθε μονότονη και φραγμένη ακολουθία συγκλίνει. Σαν συνέπεια πήραμε το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass: κάθε φραγμένη ακολουθία έχει συγκλίνουσα υπακολουθία. Αυτό με τη σειρά του μας επέτρεψε να δείξουμε την «ιδιότητα Cauchy» των πραγματικών αριθμών:

(**) Κάθε ακολουθία Cauchy πραγματικών αριθμών συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό.

Σε αυτήν την παράγραφο θα δείξουμε ότι το αξίωμα της πληρότητας είναι λογική συνέπεια των (*) και (**). Αν δηλαδή δεχτούμε το \mathbb{R} σαν ένα διατεταγμένο σώμα που έχει την Αρχιμήδεια ιδιότητα και την ιδιότητα Cauchy, τότε μπορούμε να αποδείξουμε το «αξίωμα της πληρότητας» σαν θεώρημα:

Θεώρημα 1.5.1. Έστω \mathbb{R}^* ένα διατεταγμένο σώμα που περιέχει το \mathbb{Q} και έχει, επιπλέον, τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. Αν $a \in \mathbb{R}^*$ και $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$, $\varepsilon > 0$, τότε υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $n\varepsilon > a$.
2. Κάθε ακολουθία Cauchy στοιχείων του \mathbb{R}^* συγκλίνει σε στοιχείο του \mathbb{R}^* .

Τότε, κάθε μη κενό και άνω φραγμένο $A \subset \mathbb{R}^*$ έχει ελάχιστο άνω φράγμα.

Απόδειξη. Έστω A μη κενό και άνω φραγμένο υποσύνολο του \mathbb{R}^* .

Ξεκινάμε με τυχόν στοιχείο $a_0 \in A$ (υπάρχει αφού $A \neq \emptyset$). Έστω b άνω φράγμα του A . Από την Συνθήκη 1, υπάρχει $k \in \mathbb{N}$ για τον οποίο $a_0 + k > b$. Δηλαδή, υπάρχει φυσικός k με την ιδιότητα

$$\text{για κάθε } a \in A, \quad a < a_0 + k.$$

Από την αρχή του ελαχίστου έπεται ότι υπάρχει ελάχιστος τέτοιος φυσικός. Ας τον πούμε k_1 . Τότε,

- Για κάθε $a \in A$ ισχύει $a < a_0 + k_1$.
- Υπάρχει $a_1 \in A$ ώστε $a_0 + (k_1 - 1) \leq a_1$.

Επαγωγικά θα βρούμε $a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$ στο A και $k_n \in \mathbb{N}$ που ικανοποιούν τα εξής:

- Για κάθε $a \in A$ ισχύει $a < a_{n-1} + \frac{k_n}{2^{n-1}}$.
- $a_{n-1} + \frac{k_n-1}{2^{n-1}} \leq a_n$.

Απόδειξη του επαγωγικού βήματος: Έχουμε $a_n \in A$ και από την Συνθήκη 1 υπάρχει ελάχιστος φυσικός k_{n+1} με την ιδιότητα: για κάθε $a \in A$,

$$a < a_n + \frac{k_{n+1}}{2^n}.$$

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει a_{n+1} με

$$a_n + \frac{k_{n+1}-1}{2^n} \leq a_{n+1}.$$

Ισχυρισμός 1: Η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy.

Πράγματι, έχουμε

$$a_{n-1} + \frac{k_n-1}{2^{n-1}} \leq a_n < a_{n-1} + \frac{k_n}{2^{n-1}},$$

άρα

$$|a_n - a_{n-1}| < \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Αν λοιπόν $n, m \in \mathbb{N}$ και $n < m$, τότε

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &\leq |a_m - a_{m-1}| + |a_{m-1} - a_{m-2}| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \\ &< \frac{1}{2^{m-1}} + \frac{1}{2^{m-2}} + \dots + \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

Αν τα n, m είναι αρκετά μεγάλα, αυτό γίνεται όσο θέλουμε μικρό. Πιο συγκεκριμένα, αν μας δώσουν $\varepsilon > 0$, υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ τ.ω $1/2^{n_0-1} < \varepsilon$, οπότε για κάθε $n, m \geq n_0$ έχουμε $|a_m - a_n| < \varepsilon$. \square

Αφού το \mathbb{R}^* έχει την ιδιότητα Cauchy, υπάρχει ο $a^* = \lim a_n$.

Ισχυρισμός 2: Ο a^* είναι το ελάχιστο άνω φράγμα του A .

(α) Ο a^* είναι άνω φράγμα του A : ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $a \in A$ με $a > a^*$. Μπορούμε να βρούμε $\varepsilon > 0$ ώστε $a > a^* + \varepsilon$. Όμως,

$$a < a_{n-1} + \frac{k_n}{2^{n-1}} \leq a_n + \frac{1}{2^{n-1}}$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Άρα,

$$\begin{aligned} a^* + \varepsilon &< a_n + \frac{1}{2^{n-1}} \\ \implies a^* + \varepsilon &\leq \lim \left(a_n + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \\ \implies a^* + \varepsilon &\leq a^*, \end{aligned}$$

το οποίο είναι άτοπο.

(β) Αν a^{**} είναι άνω φράγμα του A , τότε $a^{**} \geq a^*$: έχουμε $a^{**} \geq a_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, άρα

$$a^{**} \geq \lim a_n = a^*.$$

Από τα (α) και (β) είναι σαφές ότι $a^* = \sup A$. □

1.6 Ασκήσεις

A. Ερωτήσεις κατανόησης

Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

1. $a_n \rightarrow +\infty$ αν και μόνο αν για κάθε $M > 0$ υπάρχουν άπειροι όροι της (a_n) που είναι μεγαλύτεροι από M .
2. Η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη αν και μόνο αν υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow +\infty$.
3. Κάθε υπακολουθία μιας συγκλίνουσας ακολουθίας συγκλίνει.
4. Αν μια ακολουθία δεν έχει φθίνουσα υπακολουθία τότε έχει μια γνησίως αύξουσα υπακολουθία.
5. Αν η (a_n) είναι φραγμένη και $a_n \not\rightarrow a$ τότε υπάρχουν $b \neq a$ και υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow b$.
6. Υπάρχει φραγμένη ακολουθία που δεν έχει συγκλίνουσα υπακολουθία.
7. Αν η (a_n) δεν είναι φραγμένη, τότε δεν έχει φραγμένη υπακολουθία.
8. Έστω (a_n) αύξουσα ακολουθία. Κάθε υπακολουθία της (a_n) είναι αύξουσα.
9. Αν η (a_n) είναι αύξουσα και για κάποια υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) έχουμε $a_{k_n} \rightarrow a$, τότε $a_n \rightarrow a$.
10. Αν $a_n \rightarrow 0$ τότε υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $n^2 a_{k_n} \rightarrow 0$.

B. Βασικές ασκήσεις

1. Έστω (a_n) μια ακολουθία. Δείξτε ότι $a_n \rightarrow a$ αν και μόνο αν οι υπακολουθίες (a_{2k}) και (a_{2k-1}) συγκλίνουν στο a .
2. Έστω (a_n) μια ακολουθία. Υποθέτουμε ότι οι υπακολουθίες (a_{2k}) , (a_{2k-1}) και (a_{3k}) συγκλίνουν. Δείξτε ότι:
- (α) $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k}$.
- (β) Η (a_n) συγκλίνει.
3. Έστω (a_n) μια ακολουθία. Υποθέτουμε ότι $a_{2n} \leq a_{2n+2} \leq a_{2n+1} \leq a_{2n-1}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n-1} - a_{2n}) = 0$. Τότε η (a_n) συγκλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό a που ικανοποιεί την $a_{2n} \leq a \leq a_{2n-1}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.
4. Έστω (a_n) μια ακολουθία και έστω (x_k) ακολουθία οριακών σημείων της (a_n) . Υποθέτουμε ότι $x_k \rightarrow x$. Δείξτε ότι ο x είναι οριακό σημείο της (a_n) .
5. Δείξτε ότι η ακολουθία (a_n) δεν συγκλίνει στον πραγματικό αριθμό a , αν και μόνο αν υπάρχουν $\varepsilon > 0$ και υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $|a_{k_n} - a| \geq \varepsilon$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.
6. Έστω (a_n) ακολουθία πραγματικών αριθμών και έστω $a \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι $a_n \rightarrow a$ αν και μόνο αν κάθε υπακολουθία της (a_n) έχει υπακολουθία που συγκλίνει στο a .
7. Ορίζουμε μια ακολουθία (a_n) με $a_1 > 0$ και

$$a_{n+1} = 1 + \frac{2}{1 + a_n}.$$

Δείξτε ότι οι υπακολουθίες (a_{2k}) και (a_{2k-1}) είναι μονότονες και φραγμένες. Βρείτε, αν υπάρχει, το $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

8. Βρείτε το ανώτερο και το κατώτερο όριο των ακολουθιών

$$\begin{aligned} a_n &= (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n} \right), \\ b_n &= \cos \left(\frac{\pi n}{3} \right) + \frac{1}{n+1}, \\ \gamma_n &= \frac{n^2((-1)^n + 1) + 2n + 1}{n+1}. \end{aligned}$$

9. Έστω (a_n) , (b_n) φραγμένες ακολουθίες. Δείξτε ότι

$$\begin{aligned} \liminf a_n + \liminf b_n &\leq \liminf (a_n + b_n) \\ &\leq \limsup (a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n. \end{aligned}$$

10. Έστω $a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$.

(α) Δείξτε ότι

$$\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

(β) Αν $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = x$, τότε $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow x$.

11. Έστω (a_n) φραγμένη ακολουθία. Δείξτε ότι

$$\limsup(-a_n) = -\liminf a_n \quad \text{και} \quad \liminf(-a_n) = -\limsup a_n.$$

12. Χρησιμοποιώντας την ανισότητα

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2},$$

δείξτε ότι η ακολουθία $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ δεν είναι ακολουθία Cauchy. Συμπεράνατε ότι $a_n \rightarrow +\infty$.

13. Έστω $0 < \mu < 1$ και ακολουθία (a_n) για την οποία ισχύει

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \mu |a_n - a_{n-1}|, \quad n \geq 2.$$

Δείξτε ότι η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy.

14. Ορίζουμε $a_1 = a$, $a_2 = b$ και $a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{2}$, $n \geq 2$. Εξετάστε αν η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy.

Γ. Ασκήσεις

1. Έστω (a_n) μια ακολουθία. Αν $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = 1$ και $a_n \neq 1$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, τότε υπάρχει γνησίως αύξουσα υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow 1$.

2. Έστω (a_n) ακολουθία θετικών αριθμών. Θεωρούμε το σύνολο $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Αν $\inf A = 0$, δείξτε ότι η (a_n) έχει φθίνουσα υπακολουθία που συγκλίνει στο 0.

3. Ορίζουμε μια ακολουθία ως εξής:

$$a_0 = 0, \quad a_{2n+1} = \frac{1}{2} + a_{2n}, \quad a_{2n} = \frac{a_{2n-1}}{2}.$$

Βρείτε όλα τα οριακά σημεία της (a_n) . [Υπόδειξη: Γράψτε τους δέκα πρώτους όρους της ακολουθίας.]

4. Έστω (x_n) ακολουθία με την ιδιότητα $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$. Αν $a < b$ είναι δύο οριακά σημεία της (x_n) , δείξτε ότι κάθε $y \in [a, b]$ είναι οριακό σημείο της (x_n) .
[Υπόδειξη: Απαγωγή σε άτοπο.]

5. Έστω (a_n) μια ακολουθία. Ορίζουμε

$$b_n = \sup\{|a_{n+k} - a_n| : k \in \mathbb{N}\}.$$

Δείξτε ότι η (a_n) συγκλίνει αν και μόνο αν $b_n \rightarrow 0$.

Κεφάλαιο 2

Σειρές πραγματικών αριθμών

2.1 Σύγκλιση σειράς

Ορισμός 2.1.1. Έστω (a_k) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Θεωρούμε την ακολουθία

$$(2.1.1) \quad s_n = a_1 + \cdots + a_n.$$

Δηλαδή,

$$(2.1.2) \quad s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \quad s_3 = a_1 + a_2 + a_3, \quad \dots$$

Το σύμβολο $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ είναι η σειρά με k -οστό όρο τον a_k . Το άθροισμα $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ είναι το n -οστό μερικό άθροισμα της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ και η (s_n) είναι η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Αν η (s_n) συγκλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό s , τότε γράφουμε

$$(2.1.3) \quad s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \quad \text{ή} \quad s = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

και λέμε ότι η σειρά συγκλίνει (στο s), το δε όριο $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ είναι το άθροισμα της σειράς.

Αν $s_n \rightarrow +\infty$ ή αν $s_n \rightarrow -\infty$, τότε γράφουμε $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$ ή $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = -\infty$ και λέμε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει στο $+\infty$ ή στο $-\infty$ αντίστοιχα.

Αν η (s_n) δεν συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό, τότε λέμε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει.

Παρατηρήσεις 2.1.2. (α) Πολλές φορές εξετάζουμε τη σύγκλιση σειρών της μορφής $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ή $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$ όπου $m \geq 2$. Σε αυτήν την περίπτωση θέτουμε $s_{n+1} = a_0 + a_1 + \dots + a_n$ ή $s_{n-m+1} = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$ (για $n \geq m$) αντίστοιχα, και εξετάζουμε τη σύγκλιση της ακολουθίας (s_n) .

(β) Από τους ορισμούς που δώσαμε είναι φανερό ότι για να εξετάσουμε τη σύγκλιση ή απόκλιση μιας σειράς, απλώς εξετάζουμε τη σύγκλιση ή απόκλιση μιας ακολουθίας (της ακολουθίας (s_n)) των μερικών αθροισμάτων της σειράς). Ο n -οστός όμως όρος της ακολουθίας (s_n) είναι ένα «άθροισμα με ολοένα αυξανόμενο μήκος», το οποίο αδυνατούμε (συνήθως) να γράψουμε σε κλειστή μορφή. Συνεπώς, η εύρεση του ορίου $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ (όταν αυτό υπάρχει) είναι πολύ συχνά ανέφικτη. Σκοπός μας είναι λοιπόν να αναπτύξουμε κάποια κριτήρια τα οποία να μας επιτρέπουν (τουλάχιστον) να πούμε αν η (s_n) συγχλίνει σε πραγματικό αριθμό ή όχι.

Πριν προχωρήσουμε σε παραδείγματα, θα δούμε κάποιες απλές προτάσεις που θα χρησιμοποιούμε ελεύθερα στη συνέχεια.

Αν έχουμε δύο σειρές $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, μπορούμε να σχηματίσουμε τον γραμμικό συνδυασμό τους $\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda a_k + \mu b_k)$, όπου $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Πρόταση 2.1.3. Αν $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$ και $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = t$, τότε

$$(2.1.4) \quad \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda s + \mu t = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \mu \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Απόδειξη. Αν $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $t_n = \sum_{k=1}^n b_k$ και $u_n = \sum_{k=1}^n (\lambda a_k + \mu b_k)$ είναι τα n -οστά μερικά αθροίσματα των σειρών, τότε $u_n = \lambda s_n + \mu t_n$. Αυτό προκύπτει εύκολα από τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού, αφού έχουμε αθροίσματα με πεπερασμένους το πλήθος όρους. Όμως, $s_n \rightarrow s$ και $t_n \rightarrow t$, άρα $u_n \rightarrow \lambda s + \mu t$. Από τον ορισμό του αθροίσματος σειράς έπεται η (2.1.4). \square

Πρόταση 2.1.4. (α) Αν απαλείψουμε πεπερασμένο πλήθος «αρχικών» όρων μιας σειράς, δεν επηρεάζεται η σύγκλιση ή απόκλιση της.

(β) Αν αλλάξουμε πεπερασμένους το πλήθος όρους μιας σειράς, δεν επηρεάζεται η σύγκλιση ή απόκλιση της.

Απόδειξη. (α) Θεωρούμε τη σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Με τη φράση «απαλείφουμε τους αρχικούς όρους a_1, a_2, \dots, a_{m-1} » εννοούμε ότι θεωρούμε την καινούργια σειρά

$\sum_{k=m}^{\infty} a_k$. Αν συμβολίσουμε με s_n και t_n τα n -οστά μερικά αθροίσματα των δύο σειρών αντιστοίχως, τότε για κάθε $n \geq m$ έχουμε

$$(2.1.5) \quad s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{m-1} + a_m + \cdots + a_n = a_1 + \cdots + a_{m-1} + t_{n-m+1}.$$

Άρα η (s_n) συγκλίνει αν και μόνον αν η (t_{n-m+1}) συγκλίνει, δηλαδή αν και μόνον αν η (t_n) συγκλίνει. Επίσης, αν $s_n \rightarrow s$ και $t_n \rightarrow t$, τότε $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_{m-1} + t$. Δηλαδή,

$$(2.1.6) \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + \cdots + a_{m-1} + \sum_{k=m}^{\infty} a_k.$$

(β) Θεωρούμε τη σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Αλλάζουμε πεπερασμένους το πλήθος όρους της (a_k) . Θεωρούμε δηλαδή μια νέα σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ που όμως έχει την εξής ιδιότητα: υπάρχει $m \in \mathbb{N}$ ώστε $a_k = b_k$ για κάθε $k \geq m$. Αν απαλείψουμε τους πρώτους $m - 1$ όρους των δύο σειρών, προκύπτει η ίδια σειρά $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$. Τώρα, εφαρμόζουμε το (α). \square

Πρόταση 2.1.5. (α) Αν $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$, τότε $a_n \rightarrow 0$.

(β) Αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, τότε για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n \geq N$,

$$(2.1.7) \quad \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \right| < \varepsilon.$$

Απόδειξη. (α) Αν $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$, τότε $s_n \rightarrow s$ και $s_{n-1} \rightarrow s$. Άρα,

$$(2.1.8) \quad a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow s - s = 0.$$

(β) Αν $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$, τότε από την (2.1.6) έχουμε

$$(2.1.9) \quad \beta_n := \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = s - s_n \rightarrow 0$$

καθώς το $n \rightarrow \infty$. Από τον ορισμό του ορίου ακολουθίας, για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n \geq N$, $|\beta_n| < \varepsilon$. \square

Σημείωση. Το μέρος (α) της Πρότασης 2.1.5 χρησιμοποιείται σαν κριτήριο απόκλισης: Αν η ακολουθία (a_k) δεν συγκλίνει στο 0 τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αναγκαστικά αποκλίνει.

Παραδείγματα

(α) Η γεωμετρική σειρά με λόγο $x \in \mathbb{R}$ είναι η σειρά

$$(2.1.10) \quad \sum_{k=0}^{\infty} x^k.$$

Δηλαδή $a_k = x^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$. Αν $x = 1$ τότε $s_n = n + 1$, ενώ αν $x \neq 1$ έχουμε

$$(2.1.11) \quad s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}.$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

- (i) Αν $|x| \geq 1$ τότε $|a_k| = |x|^k \geq 1$, δηλαδή $a_k \not\rightarrow 0$. Από την Πρόταση 2.1.5(α) βλέπουμε ότι η σειρά (2.1.10) αποκλίνει.
- (ii) Αν $|x| < 1$ τότε $x^{n+1} \rightarrow 0$, οπότε η (2.1.11) δείχνει ότι $s_n \rightarrow \frac{1}{1-x}$. Δηλαδή,

$$(2.1.12) \quad \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

(β) Τηλεσκοπικές σειρές. Υποθέτουμε ότι η ακολουθία (a_k) ικανοποιεί την

$$(2.1.13) \quad a_k = b_k - b_{k+1}$$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$, όπου (b_k) μια άλλη ακολουθία. Τότε, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει αν και μόνον αν η ακολουθία (b_k) συγκλίνει. Πράγματι, έχουμε

$$(2.1.14) \quad s_n = a_1 + \dots + a_n = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1},$$

οπότε $b_n \rightarrow b$ αν και μόνον αν $s_n \rightarrow b_1 - b$.

Σαν παράδειγμα θεωρούμε τη σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$. Τότε,

$$(2.1.15) \quad a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = b_{k+1} - b_k,$$

όπου $b_k = \frac{1}{k}$. Άρα,

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + \cdots + a_n \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Δηλαδή,

$$(2.1.16) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

Θεώρημα 2.1.6 (κριτήριο Cauchy). Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει αν και μόνο αν ισχύει το εξής: για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε: αν $N \leq m < n$ τότε

$$(2.1.17) \quad \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| = |a_{m+1} + \cdots + a_n| < \varepsilon.$$

Απόδειξη. Αν $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ είναι το n -οστό μερικό άθροισμα της σειράς, η σειρά συγκλίνει αν και μόνον αν η (s_n) συγκλίνει. Δηλαδή, αν και μόνον αν η (s_n) είναι ακολουθία Cauchy. Αυτό όμως είναι (από τον ορισμό της ακολουθίας Cauchy) ισοδύναμο με το εξής: για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε για κάθε $N \leq m < n$,

$$(2.1.18) \quad |a_{m+1} + \cdots + a_n| = |(a_1 + \cdots + a_n) - (a_1 + \cdots + a_m)| = |s_n - s_m| < \varepsilon. \quad \square$$

Παράδειγμα: Η αρμονική σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

Έχουμε $a_k = \frac{1}{k}$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Παρατηρούμε ότι: αν $n > m$ τότε

$$(2.1.19) \quad a_{m+1} + \cdots + a_n = \frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \frac{n-m}{n}.$$

Εφαρμόζουμε το κριτήριο του Cauchy. Αν η αρμονική σειρά συγκλίνει, τότε, για $\varepsilon = \frac{1}{4}$, πρέπει να υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε: αν $N \leq m < n$ τότε

$$(2.1.20) \quad |a_{m+1} + \cdots + a_n| < \frac{1}{4}.$$

Επιλέγουμε $m = N$ και $n = 2N$. Τότε, συνδυάζοντας τις (2.1.19) και (2.1.20) παίρνουμε

$$(2.1.21) \quad \frac{1}{4} > a_{N+1} + \cdots + a_{2N} \geq \frac{2N - N}{2N} = \frac{1}{2},$$

που είναι άτοπο. Άρα, η αρμονική σειρά αποκλίνει.

Σημείωση: Το παράδειγμα της αρμονικής σειράς δείχνει ότι το αντίστροφο της Προτάσης 2.1.5(α) δεν ισχύει. Αν $a_k \rightarrow 0$ δεν είναι απαραίτητα σωστό ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.

2.2 Σειρές με μη αρνητικούς όρους

Σε αυτήν την παράγραφο συζητάμε τη σύγκλιση ή απόκλιση σειρών με μη αρνητικούς όρους. Η βασική παρατήρηση είναι ότι αν για την ακολουθία (a_k) έχουμε $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$, τότε η ακολουθία (s_n) των μερικών αθροισμάτων είναι αύξουσα: πράγματι, για κάθε $n \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$(2.2.1) \quad s_{n+1} - s_n = (a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1}) - (a_1 + \cdots + a_n) = a_{n+1} \geq 0.$$

Θεώρημα 2.2.1. Έστω (a_k) ακολουθία με $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει αν και μόνον αν η ακολουθία (s_n) των μερικών αθροισμάτων είναι άνω φραγμένη. Αν η (s_n) δεν είναι άνω φραγμένη, τότε $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$.

Απόδειξη. Η (s_n) είναι αύξουσα ακολουθία. Αν είναι άνω φραγμένη τότε συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό, άρα η σειρά συγκλίνει. Αν η (s_n) δεν είναι άνω φραγμένη τότε, αφού είναι αύξουσα, έχουμε $s_n \rightarrow +\infty$. \square

Σημείωση. Είδαμε ότι μια σειρά με μη αρνητικούς όρους συγκλίνει ή αποκλίνει στο $+\infty$. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της αρμονικής σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, βλέπουμε ότι, αφού δεν συγκλίνει, αποκλίνει στο $+\infty$:

$$(2.2.2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty.$$

Θα δώσουμε μια απευθείας απόδειξη για το γεγονός ότι η ακολουθία $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ τείνει στο $+\infty$. Πιο συγκεκριμένα, θα δείξουμε με επαγωγή ότι

$$(*) \quad s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \quad \text{για κάθε } n \in \mathbb{N}.$$

Για $n = 1$ η ανισότητα ισχύει ως ισότητα: $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$. Υποθέτουμε ότι η $(*)$ ισχύει για κάποιον φυσικό n . Τότε,

$$s_{2^{n+1}} = s_{2^n} + \frac{1}{2^n + 1} + \frac{1}{2^n + 2} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Παρατηρήστε ότι ο $s_{2^{n+1}} - s_{2^n}$ είναι ένα άθροισμα 2^n το πλήθος αριθμών και ότι ο μικρότερος από αυτούς είναι ο $\frac{1}{2^{n+1}}$. Συνεπώς,

$$s_{2^{n+1}} \geq s_{2^n} + 2^n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} = s_{2^n} + \frac{1}{2} \geq 1 + \frac{n}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n+1}{2}.$$

Άρα, η (*) ισχύει για τον φυσικό $n+1$. Έπεται ότι $s_{2^n} \rightarrow +\infty$. Αφού η (s_n) είναι αύξουσα και έχει υπακολουθία που τείνει στο $+\infty$, συμπεραίνουμε ότι $s_n \rightarrow +\infty$.

2.2α' Σειρές με φθίνοντες μη αρνητικούς όρους

Πολλές φορές συναντάμε σειρές $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ των οποίων οι όροι a_k φθίνουν προς το 0: $a_{k+1} \leq a_k$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και $a_k \rightarrow 0$. Ένα κριτήριο σύγκλισης που εφαρμόζεται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το κριτήριο συμπίκνωσης.

Πρόταση 2.2.2 (Κριτήριο συμπίκνωσης - Cauchy). Έστω (a_k) μια φθίνουσα ακολουθία με $a_k > 0$ και $a_k \rightarrow 0$. Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει αν και μόνο αν η σειρά $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ συγκλίνει.

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι η $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ συγκλίνει. Τότε, η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων

$$(2.2.3) \quad t_n = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n}$$

είναι άνω φραγμένη. Έστω M ένα άνω φράγμα της (t_n) . Θα δείξουμε ότι ο M είναι άνω φράγμα για τα μερικά αθροίσματα της $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Έστω $s_m = a_1 + \cdots + a_m$. Ο αριθμός m βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικές δυνάμεις του 2: υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $2^n \leq m < 2^{n+1}$. Τότε, χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι η (a_k) είναι φθίνουσα, έχουμε

$$\begin{aligned} s_m &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots + (a_{2^{n-1}} + \cdots + a_{2^n-1}) \\ &\quad + (a_{2^n} + \cdots + a_m) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^{n-1}a_{2^{n-1}} + 2^n a_{2^n} \\ &\leq M. \end{aligned}$$

Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ έχει μη αρνητικούς όρους και η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων της είναι άνω φραγμένη, το Θεώρημα 2.2.1 δείχνει ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.

Αντίστροφα: υποθέτουμε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει, δηλαδή ότι η (s_m) είναι άνω φραγμένη: υπάρχει $M \in \mathbb{R}$ ώστε $s_m \leq M$ για κάθε $m \in \mathbb{N}$. Τότε, για το τυχόν μερικό άθροισμα (t_n) της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ έχουμε

$$\begin{aligned} t_n &= a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} \\ &\leq 2a_1 + 2a_2 + 2(a_3 + a_4) + \cdots + 2(a_{2^{n-1}+1} + \cdots + a_{2^n}) \\ &= 2s_{2^n} \leq 2M. \end{aligned}$$

Αφού η (t_n) είναι άνω φραγμένη, το Θεώρημα 2.2.1 δείχνει ότι η $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ συγχλίνει. \square

Παραδείγματα

(α) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$, όπου $p > 0$. Έχουμε $a_k = \frac{1}{k^p}$. Αφού $p > 0$, η (a_k) φθίνει προς το 0. Θεωρούμε την

$$(2.2.4) \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^p} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^k.$$

Η τελευταία σειρά είναι γεωμετρική σειρά με λόγο $x_p = \frac{1}{2^{p-1}}$. Είδαμε ότι συγχλίνει αν $x_p = \frac{1}{2^{p-1}} < 1$, δηλαδή αν $p > 1$ και αποκλίνει αν $x_p = \frac{1}{2^{p-1}} \geq 1$, δηλαδή αν $p \leq 1$.

Από το κριτήριο συμπίκνωσης, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ συγχλίνει αν $p > 1$ και αποκλίνει στο $+\infty$ αν $0 < p \leq 1$.

(β) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\log k)^p}$, όπου $p > 0$. Έχουμε $a_k = \frac{1}{k(\log k)^p}$. Αφού $p > 0$, η (a_k) φθίνει προς το 0. Θεωρούμε την

$$(2.2.5) \quad \sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \frac{1}{2^k (\log(2^k))^p} = \frac{1}{(\log 2)^p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}.$$

Από το προηγούμενο παράδειγμα, αυτή συγχλίνει αν $p > 1$ και αποκλίνει αν $p \leq 1$. Από το κριτήριο συμπίκνωσης, η σειρά $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\log k)^p}$ συγχλίνει αν $p > 1$ και αποκλίνει στο $+\infty$ αν $0 < p \leq 1$.

2.2β' Ο αριθμός e

Έχουμε ορίσει τον αριθμό e ως το όριο της γνησίως αύξουσας και άνω φραγμένης ακολουθίας $\alpha_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ καθώς το $n \rightarrow \infty$.

Πρόταση 2.2.3. Ο αριθμός e ικανοποιεί την

$$(2.2.6) \quad e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

Απόδειξη. Θυμηθείτε ότι $0! = 1$. Γράφουμε s_n για το n -οστό μερικό άθροισμα της σειράς στο δεξιό μέλος:

$$(2.2.7) \quad s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Από το διωνυμικό ανάπτυγμα, έχουμε

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + \binom{n}{1} \frac{1}{n} + \binom{n}{2} \frac{1}{n^2} + \cdots + \binom{n}{n} \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + \frac{n}{1!} \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} \\ &\quad + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 2 \cdot 1}{n!} \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)\right] \\ &\leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \end{aligned}$$

δηλαδή,

$$(2.2.8) \quad \alpha_n \leq s_n.$$

Έστω $n \in \mathbb{N}$. Ο προηγούμενος υπολογισμός δείχνει ότι αν $k > n$ τότε

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{k}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left[\left(1 - \frac{1}{k}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{k}\right)\right] \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{k!} \left[\left(1 - \frac{1}{k}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{k}\right)\right] \\ &\geq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{k}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left[\left(1 - \frac{1}{k}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{k}\right)\right]. \end{aligned}$$

Κρατώντας το n σταθερό και αφήνοντας το $k \rightarrow \infty$, βλέπουμε ότι

$$(2.2.9) \quad e = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \geq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} = s_n.$$

Αφού η αύξουσα ακολουθία (s_n) είναι άνω φραγμένη από τον e , έπεται ότι η (s_n) συγκλίνει και $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \leq e$. Από την άλλη πλευρά, η (2.2.8) δείχνει ότι $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Άρα,

$$(2.2.10) \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!},$$

όπως ισχυρίζεται η Πρόταση. \square

Χρησιμοποιώντας αυτήν την αναπαράσταση του e , θα δείξουμε ότι είναι άρρητος αριθμός.

Πρόταση 2.2.4. *Ο e είναι άρρητος.*

Απόδειξη. Υποθέτουμε ότι ο e είναι ρητός. Τότε, υπάρχουν $m, n \in \mathbb{N}$ ώστε

$$(2.2.11) \quad e = \frac{m}{n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

Δηλαδή,

$$(2.2.12) \quad \frac{m}{n} = \left(1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) + \left(\frac{1}{(n+1)!} + \cdots + \frac{1}{(n+s)!} + \cdots\right).$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (2.2.12) με $n!$, μπορούμε να γράψουμε

$$\begin{aligned} 0 < A &= n! \left[\frac{m}{n} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) \right] \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+1)\cdots(n+s)} + \cdots. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι, από τον τρόπο ορισμού του, ο

$$(2.2.13) \quad A = n! \left[\frac{m}{n} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) \right]$$

είναι φυσικός αριθμός. Όμως, για κάθε $s \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+1)\cdots(n+s)} &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^s} \\ &< \frac{2}{3} + \frac{1}{8} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}. \end{aligned}$$

Άρα,

$$(2.2.14) \quad \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+1)\cdots(n+s)} + \cdots \leq \frac{11}{12}.$$

Έπεται ότι ο φυσικός αριθμός A ικανοποιεί την

$$(2.2.15) \quad 0 < A \leq \frac{11}{12}$$

και έχουμε καταλήξει σε άτοπο. \square

2.3 Γενικά κριτήρια

2.3α' Απόλυτη σύγκλιση σειράς

Ορισμός 2.3.1. Λέμε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει απολύτως αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει. Λέμε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει υπό συνθήκη αν συγκλίνει αλλά δεν συγκλίνει απολύτως.

Η επόμενη πρόταση δείχνει ότι η απόλυτη σύγκλιση είναι ισχυρότερη από την (απλή) σύγκλιση.

Πρόταση 2.3.2. Αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει απολύτως, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.

Απόδειξη. Θα δείξουμε ότι ικανοποιείται το κριτήριο Cauchy (Θεώρημα 2.1.6). Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $N \leq m < n$,

$$(2.3.1) \quad \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon.$$

Τότε, για κάθε $N \leq m < n$ έχουμε

$$(2.3.2) \quad \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon.$$

Άρα η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ικανοποιεί το κριτήριο Cauchy. Από το Θεώρημα 2.1.6, συγκλίνει. \square

Παραδείγματα

(α) Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}$ συγκλίνει. Μπορούμε να ελέγξουμε ότι συγκλίνει απολύτως: έχουμε

$$(2.3.3) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

και η τελευταία σειρά συγκλίνει (είναι της μορφής $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ με $p = 2 > 1$).

(β) Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ δεν συγχλίνει απολύτως, αφού

$$(2.3.4) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

(αρμονική σειρά). Μπορούμε όμως να δείξουμε ότι η σειρά συγχλίνει υπό συνθήκη. Θεωρούμε πρώτα το μερικό άθροισμα

$$\begin{aligned} s_{2m} &= \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m} \\ &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \cdots + \frac{1}{(2m-1)2m}. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$(2.3.5) \quad s_{2m+2} = s_{2m} + \frac{1}{(2m+1)(2m+2)} > s_{2m},$$

δηλαδή, η υπακολουθία (s_{2m}) είναι γνησίως αύξουσα. Παρατηρούμε επίσης ότι η (s_{2m}) είναι άνω φραγμένη, αφού

$$(2.3.6) \quad s_{2m} < \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2m-1)^2},$$

και το δεξιό μέλος της (2.3.6) φράσσεται από το $(2m-1)$ -οστό μερικό άθροισμα της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ η οποία συγχλίνει. Άρα η υπακολουθία (s_{2m}) συγχλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό s . Τότε,

$$(2.3.7) \quad s_{2m-1} = s_{2m} + \frac{1}{2m} \rightarrow s + 0 = s.$$

Αφού οι υπακολουθίες (s_{2m}) και (s_{2m-1}) των άρτιων και των περιττών όρων της (s_m) συγχλίνουν στον s , συμπεραίνουμε ότι $s_n \rightarrow s$.

2.3β' Κριτήρια σύγκρισης

Θεώρημα 2.3.3 (κριτήριο σύγκρισης). Θεωρούμε τις σειρές $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ και $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, όπου $b_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Υποθέτουμε ότι υπάρχει $M > 0$ ώστε

$$(2.3.8) \quad |a_k| \leq M \cdot b_k$$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγχλίνει. Τότε, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει απολύτως.

Απόδειξη. Θέτουμε $s_n = \sum_{k=1}^n |a_k|$ και $t_n = \sum_{k=1}^n b_k$. Από την (2.3.8) έπεται ότι

$$(2.3.9) \quad s_n \leq M \cdot t_n$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Αφού η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει, η ακολουθία (t_n) είναι άνω φραγμένη. Από την (2.3.9) συμπεραίνουμε ότι και η (s_n) είναι άνω φραγμένη. Άρα, η $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει. \square

Θεώρημα 2.3.4 (οριακό κριτήριο σύγκρισης). Θεωρούμε τις σειρές $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$

και $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, όπου $b_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Υποθέτουμε ότι

$$(2.3.10) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell \in \mathbb{R}$$

και ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει. Τότε, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει απολύτως.

Απόδειξη. Η ακολουθία $\left(\frac{a_k}{b_k}\right)$ συγκλίνει, άρα είναι φραγμένη. Δηλαδή, υπάρχει $M > 0$ ώστε

$$(2.3.11) \quad \left| \frac{a_k}{b_k} \right| \leq M$$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Τότε, ικανοποιείται η (2.3.8) και μπορούμε να εφαρμόσουμε το Θεώρημα 2.3.3. \square

Θεώρημα 2.3.5 (ισοδύναμη συμπεριφορά). Θεωρούμε τις σειρές $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$

και $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, όπου $a_k, b_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Υποθέτουμε ότι

$$(2.3.10) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell > 0.$$

Τότε, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει αν και μόνο αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.

Απόδειξη. Αν η $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει, τότε η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει από το Θεώρημα 2.3.4.

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει. Αφού $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow \ell > 0$, έχουμε $\frac{b_k}{a_k} \rightarrow \frac{1}{\ell}$. Εναλλάσσοντας τους ρόλους των (a_k) και (b_k) , βλέπουμε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει, χρησιμοποιώντας ξανά το Θεώρημα 2.3.4. \square

Παραδείγματα

(α) Εξετάζουμε τη σύγκλιση της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^2}$, όπου $x \in \mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι

$$(2.3.12) \quad \left| \frac{\sin(kx)}{k^2} \right| \leq \frac{1}{k^2}.$$

Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει, συμπεραίνουμε (από το κριτήριο σύγκρισης) ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^2}$ συγκλίνει απολύτως.

(β) Εξετάζουμε τη σύγκλιση της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^4+k^2+3}$. Παρατηρούμε ότι αν $a_k = \frac{k+1}{k^4+k^2+3}$ και $b_k = \frac{1}{k^3}$, τότε

$$(2.3.13) \quad \frac{a_k}{b_k} = \frac{k^4 + k^3}{k^4 + k^2 + 3} \rightarrow 1.$$

Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ συγκλίνει, συμπεραίνουμε (από το οριακό κριτήριο σύγκρισης) ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^4+k^2+3}$ συγκλίνει.

(γ) Τέλος, εξετάζουμε τη σύγκλιση της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^2+2}$. Όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, αν θεωρήσουμε τις ακολουθίες $b_k = \frac{k+1}{k^2+2}$ και $a_k = \frac{1}{k}$, τότε

$$(2.3.14) \quad \frac{a_k}{b_k} = \frac{k^2 + 2}{k^2 + k} \rightarrow 1 > 0.$$

Από το Θεώρημα 2.3.5 έπεται ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^2+2}$ έχει την ίδια συμπεριφορά με την $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, δηλαδή αποκλίνει.

2.3γ' Κριτήριο λόγου και κριτήριο ρίζας

Θεώρημα 2.3.6 (Κριτήριο λόγου - D' Alembert). Έστω $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ μια σειρά με μη μηδενικούς όρους.

(α) Αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| < 1$, τότε η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει απολύτως.

(β) Αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| > 1$, τότε η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει.

Απόδειξη. (α) Υποθέτουμε ότι $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \ell < 1$. Έστω $x > 0$ με $\ell < x < 1$. Τότε, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε: $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq x$ για κάθε $k \geq N$. Δηλαδή,

$$(2.3.15) \quad |a_{N+1}| \leq x|a_N|, \quad |a_{N+2}| \leq x|a_{N+1}| \leq x^2|a_N| \quad \text{κλπ.}$$

Επαγωγικά δείχνουμε ότι

$$(2.3.16) \quad |a_k| \leq x^{k-N}|a_N| = \frac{|a_N|}{x^N} \cdot x^k$$

για κάθε $k \geq N$.

Συγκρίνουμε τις σειρές $\sum_{k=N}^{\infty} |a_k|$ και $\sum_{k=N}^{\infty} x^k$. Από την (2.3.16) βλέπουμε ότι

$$(2.3.17) \quad |a_k| \leq M \cdot x^k$$

για κάθε $k \geq N$, όπου $M = \frac{|a_N|}{x^N}$. Η σειρά $\sum_{k=N}^{\infty} x^k$ συγκλίνει, διότι προέρχεται από την γεωμετρική σειρά $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ (με απαλοιφή των πρώτων όρων της) και $0 < x < 1$. Άρα, η $\sum_{k=N}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει. Έπεται ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει κι αυτή.

(β) Αφού $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| > 1$, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \geq 1$ για κάθε $k \geq N$. Δηλαδή,

$$(2.3.18) \quad |a_k| \geq |a_{k-1}| \geq \dots \geq |a_N| > 0$$

για κάθε $k \geq N$. Τότε, $a_k \not\rightarrow 0$ και, από την Πρόταση 2.1.5(α), η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει. \square

Σημείωση. Αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = 1$, πρέπει να εξετάσουμε αλλιώς τη σύγκλιση ή απόκλιση της $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Παρατηρήστε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει και $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1$, ενώ η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει και $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{k^2}{(k+1)^2} \rightarrow 1$.

Παράδειγμα

Εξετάζουμε τη σύγκλιση της σειράς $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$. Έχουμε

$$(2.3.19) \quad \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{k!}{(k+1)!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 < 1.$$

Άρα, η σειρά συγκλίνει.

Θεώρημα 2.3.7 (κριτήριο ρίζας - Cauchy). Έστω $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ μια σειρά πραγματικών αριθμών.

(α) Αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1$, τότε η σειρά συγκλίνει απολύτως.

(β) Αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$, τότε η σειρά αποκλίνει.

Απόδειξη (α) Επιλέγουμε $x > 0$ με την ιδιότητα $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} < x < 1$. Τότε, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε $\sqrt[k]{|a_k|} \leq x$ για κάθε $k \geq N$. Ισοδύναμα,

$$(2.3.21) \quad |a_k| \leq x^k$$

για κάθε $k \geq n$. Συγκρίνουμε τις σειρές $\sum_{k=N}^{\infty} |a_k|$ και $\sum_{k=N}^{\infty} x^k$. Αφού $x < 1$, η δεύτερη σειρά συγκλίνει. Άρα η $\sum_{k=N}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει. Έπεται ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει απολύτως.

(β) Αφού $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε $\sqrt[k]{|a_k|} \geq 1$ για κάθε $k \geq N$.

Δηλαδή, $|a_k| \geq 1$ τελικά. Άρα $a_k \not\rightarrow 0$ και η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει. \square

Σημείωση. Αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = 1$, πρέπει να εξετάσουμε αλλιώς τη σύγκλιση ή απόκλιση της $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Για τις $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ έχουμε $\sqrt[k]{|a_k|} \rightarrow 1$. Η πρώτη αποκλίνει ενώ η δεύτερη συγκλίνει.

Παραδείγματα

(α) Εξετάζουμε τη σύγκλιση της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$, όπου $x \in \mathbb{R}$. Έχουμε $\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{|x|}{\sqrt[k]{k}} \rightarrow |x|$. Αν $|x| < 1$, τότε $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = |x| < 1$ και η σειρά συγκλίνει απολύτως. Αν $|x| > 1$, τότε $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = |x| > 1$ και η σειρά αποκλίνει. Αν $|x| = 1$, το κριτήριο ρίζας δεν δίνει συμπέρασμα. Για $x = 1$ παίρνουμε την αρμονική σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ η οποία αποκλίνει. Για $x = -1$ παίρνουμε την «εναλλασσόμενη σειρά» $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ η οποία συγκλίνει. Άρα, η σειρά συγκλίνει αν και μόνο αν $-1 \leq x < 1$.

(β) Εξετάζουμε τη σύγκλιση της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{k^2}$, όπου $x \in \mathbb{R}$. Έχουμε $\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{x^2}{\sqrt[k]{k^2}} \rightarrow x^2$. Άρα, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = x^2$. Αν $|x| > 1$ η σειρά αποκλίνει. Αν $|x| < 1$ η σειρά συγκλίνει απολύτως. Αν $|x| = 1$ το κριτήριο ρίζας δεν δίνει συμπέρασμα. Στην περίπτωση $x = \pm 1$ η σειρά παίρνει τη μορφή $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, δηλαδή συγκλίνει. Άρα, η σειρά συγκλίνει απολύτως όταν $|x| \leq 1$.

2.3δ' Το κριτήριο του Dirichlet

Το κριτήριο του Dirichlet εξασφαλίζει (μερικές φορές) τη σύγκλιση μιας σειράς η οποία δεν συγκλίνει απολύτως (συγκλίνει υπό συνθήκη).

Λήμμα 2.3.8 (άθροιση κατά μέρη - Abel). Έστω (a_k) και (b_k) δύο ακολουθίες. Ορίζουμε $s_n = a_1 + \dots + a_n$, $s_0 = 0$. Για κάθε $1 \leq m < n$, ισχύει η ισότητα

$$(2.3.22) \quad \sum_{k=m}^n a_k b_k = \sum_{k=m}^{n-1} s_k (b_k - b_{k+1}) + s_n b_n - s_{m-1} b_m.$$

Απόδειξη. Γράφουμε

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n a_k b_k &= \sum_{k=m}^n (s_k - s_{k-1}) b_k \\ &= \sum_{k=m}^n s_k b_k - \sum_{k=m}^n s_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=m}^n s_k b_k - \sum_{k=m-1}^{n-1} s_k b_{k+1} \\ &= \sum_{k=m}^{n-1} s_k (b_k - b_{k+1}) + s_n b_n - s_{m-1} b_m, \end{aligned}$$

που είναι το ζητούμενο. □

Θεώρημα 2.3.9 (κριτήριο Dirichlet). Έστω (a_k) και (b_k) δύο ακολουθίες με τις εξής ιδιότητες:

- (α) Η (b_k) έχει θετικούς όρους και φθίνει προς το 0.
 (β) Η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων $s_n = a_1 + \dots + a_n$ της (a_k) είναι φραγμένη: υπάρχει $M > 0$ ώστε

$$(2.3.23) \quad |s_n| \leq M$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Τότε, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ συγκλίνει.

Απόδειξη. Θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο του Cauchy. Έστω $\varepsilon > 0$. Χρησιμοποιώντας την υπόθεση (α), βρίσκουμε $N \in \mathbb{N}$ ώστε

$$(2.3.24) \quad \frac{\varepsilon}{2M} > b_N \geq b_{N+1} \geq b_{N+2} \geq \dots > 0.$$

Αν $N \leq m < n$, τότε

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=m}^{n-1} s_k (b_k - b_{k+1}) + s_n b_n - s_{m-1} b_m \right| \\ &\leq \sum_{k=m}^{n-1} |s_k| |b_k - b_{k+1}| + |s_n| |b_n| + |s_{m-1}| |b_m| \\ &\leq M \sum_{k=m}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) + M b_n + M b_m \\ &= 2M b_m < 2M \frac{\varepsilon}{2M} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Από το κριτήριο του Cauchy, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ συγχλίνει. \square

Παράδειγμα (κριτήριο Leibniz)

Σειρές με εναλλασσόμενα πρόσημα $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} b_k$, όπου η $\{b_k\}$ φθίνει προς το 0.

Τα μερικά αθροίσματα της $((-1)^{k-1})$ είναι φραγμένα, αφού $s_n = 0$ αν ο n είναι άρτιος και $s_n = 1$ αν ο n είναι περιττός. Άρα, κάθε τέτοια σειρά συγχλίνει.

Παράδειγμα, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

2.3ε' * Δεκαδική παράσταση πραγματικών αριθμών

Σκοπός μας σε αυτήν την παράγραφο είναι να δείξουμε ότι κάθε πραγματικός αριθμός έχει δεκαδική παράσταση: είναι δηλαδή άθροισμα σειράς της μορφής

$$(2.3.25) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots,$$

όπου $a_0 \in \mathbb{Z}$ και $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ για κάθε $k \geq 1$.

Παρατηρήστε ότι κάθε σειρά αυτής της μορφής συγχλίνει και ορίζει έναν πραγματικό αριθμό $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}$. Πράγματι, η γεωμετρική σειρά $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^k}$ συγχλίνει και επειδή $0 \leq \frac{a_k}{10^k} \leq \frac{9}{10^k}$ για κάθε $k \geq 1$, η σειρά $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}$ συγχλίνει σύμφωνα με το κριτήριο σύγκρισης σειρών.

Λήμμα 2.3.10. Αν $N \geq 1$ και $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ για κάθε $k \geq N$, τότε

$$(2.3.26) \quad 0 \leq \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \leq \frac{1}{10^{N-1}}.$$

Η αριστερή ανισότητα ισχύει σαν ισότητα αν και μόνον αν $a_k = 0$ για κάθε $k \geq N$, ενώ η δεξιά ανισότητα ισχύει σαν ισότητα αν και μόνον αν $a_k = 9$ για κάθε $k \geq N$.

Απόδειξη. Έχουμε

$$(2.3.27) \quad \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \geq \sum_{k=N}^{\infty} \frac{0}{10^k} = 0.$$

Αν $a_k = 0$ για κάθε $k \geq N$, τότε $\sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = 0$. Αντίστροφα, αν $a_m \geq 1$ για κάποιον $m \geq N$, τότε

$$\begin{aligned} \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} &= \frac{a_m}{10^m} + \sum_{\substack{k=N \\ k \neq m}}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \\ &\geq \frac{1}{10^m} + \sum_{\substack{k=N \\ k \neq m}}^{\infty} \frac{0}{10^k} \\ &= \frac{1}{10^m} > 0. \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά,

$$(2.3.28) \quad \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \leq \sum_{k=N}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10^N} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots \right) = \frac{1}{10^{N-1}}.$$

Αν $a_k = 9$ για κάθε $k \geq N$, τότε

$$(2.3.29) \quad \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = \sum_{k=N}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{1}{10^{N-1}}.$$

Αντίστροφα, αν $a_m \leq 8$ για κάποιον $m \geq N$, τότε

$$\begin{aligned} \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} &= \frac{a_m}{10^m} + \sum_{\substack{k=N \\ k \neq m}}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \\ &\leq \frac{8}{10^m} + \sum_{\substack{k=N \\ k \neq m}}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10^m} - \frac{1}{10^m} + \sum_{\substack{k=N \\ k \neq m}}^{\infty} \frac{9}{10^k} \\ &= -\frac{1}{10^m} + \sum_{k=N}^{\infty} \frac{9}{10^k} \\ &= -\frac{1}{10^m} + \frac{1}{10^{N-1}} \\ &< \frac{1}{10^{N-1}}, \end{aligned}$$

κι αυτό συμπληρώνει την απόδειξη του Λήμματος. \square

Λήμμα 2.3.11. Έστω n μη αρνητικός ακέραιος και έστω $N \geq 0$. Τότε υπάρχουν ακέραιοι p_0, p_1, \dots, p_N ώστε: $p_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ για $0 \leq k \leq N-1$, $p_N \geq 0$ και

$$(2.3.30) \quad n = 10^N p_N + 10^{N-1} p_{N-1} + \dots + 10p_1 + p_0.$$

Απόδειξη. Διαιρώντας διαδοχικά με 10 παίρνουμε

$$\begin{aligned} n &= 10q_1 + p_0, & \text{όπου } 0 \leq p_0 \leq 9 & \text{ και } q_1 \geq 0 \\ q_1 &= 10q_2 + p_1, & \text{όπου } 0 \leq p_1 \leq 9 & \text{ και } q_2 \geq 0 \\ q_2 &= 10q_3 + p_2, & \text{όπου } 0 \leq p_2 \leq 9 & \text{ και } q_3 \geq 0 \\ &\vdots & & \\ q_{N-1} &= 10p_N + p_{N-1}, & \text{όπου } 0 \leq p_{N-1} \leq 9 & \text{ και } q_N \geq 0. \end{aligned}$$

Επαγωγικά, έχουμε:

$$\begin{aligned} n &= 10q_1 + p_0 = 10^2 q_2 + 10p_1 + p_0 = 10^3 q_3 + 10^2 p_2 + 10p_1 + p_0 = \dots \\ &= 10^N q_N + 10^{N-1} p_{N-1} + 10p_1 + p_0. \end{aligned}$$

Θέτοντας $p_N = q_N$ έχουμε το ζητούμενο. \square

Χρησιμοποιώντας τα Λήμματα 2.3.10 και 2.3.11 θα δείξουμε ότι κάθε πραγματικός αριθμός έχει δεκαδική παράσταση.

Θεώρημα 2.3.12. (α) Κάθε πραγματικός αριθμός $x \geq 0$ γράφεται σαν άθροισμα «δεκαδικής σειράς»:

$$(2.3.31) \quad x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots,$$

όπου $a_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ και $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ για κάθε $k \geq 1$. Τότε, λέμε ότι ο x έχει τη δεκαδική παράσταση $x = a_0.a_1a_2a_3\dots$.

(β) Οι αριθμοί της μορφής $x = \frac{m}{10^N}$ όπου $m \in \mathbb{N}$ και $N \geq 0$ έχουν ακριβώς δύο δεκαδικές παραστάσεις:

$$(2.3.32) \quad x = a_0.a_1a_2\dots a_N 9999\dots = a_0.a_1a_2\dots a_{N-1}(a_N + 1)000\dots$$

Όλοι οι άλλοι μη αρνητικοί πραγματικοί αριθμοί έχουν μοναδική δεκαδική παράσταση.

Απόδειξη. (α) Έστω $x \geq 0$. Υπάρχει μη αρνητικός ακέραιος a_0 , το ακέραιο μέρος του x , ώστε:

$$(2.3.33) \quad a_0 \leq x < a_0 + 1.$$

Χωρίζουμε το διάστημα $[a_0, a_0 + 1)$ σε 10 ίσα υποδιαστήματα μήκους $\frac{1}{10}$. Ο x ανήκει σε ένα από αυτά. Άρα, υπάρχει $a_1 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ώστε

$$(2.3.34) \quad a_0 + \frac{a_1}{10} \leq x < a_0 + \frac{a_1 + 1}{10}.$$

Χωρίζουμε το νέο αυτό διάστημα (που έχει μήκος $\frac{1}{10}$) σε 10 ίσα υποδιαστήματα μήκους $\frac{1}{10^2}$. Ο x ανήκει σε ένα από αυτά, άρα υπάρχει $a_2 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ώστε

$$(2.3.35) \quad a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} \leq x < a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2 + 1}{10^2}.$$

Συνεχίζοντας επαγωγικά, για κάθε $k \geq 1$ βρίσκουμε $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ώστε

$$(2.3.36) \quad a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_k}{10^k} \leq x < a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_k + 1}{10^k}.$$

Από την κατασκευή, τα μερικά αθροίσματα s_n της σειράς $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}$ η οποία δημιουργείται, ικανοποιούν την $s_n \leq x < s_n + \frac{1}{10^n}$. Άρα,

$$(2.3.37) \quad 0 \leq x - s_n < \frac{1}{10^n}.$$

Έπεται ότι $s_n \rightarrow x$, δηλαδή

$$(2.3.38) \quad x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}.$$

(β) Ας υποθέσουμε ότι κάποιος $x \geq 0$ έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικές δεκαδικές παραστάσεις. Δηλαδή,

$$(2.3.39) \quad x = a_0.a_1a_2 \dots = b_0.b_1b_2 \dots,$$

όπου $a_0, b_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $a_k, b_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ για κάθε $k \geq 1$, και υπάρχει $m \geq 0$ με την ιδιότητα $a_m \neq b_m$.

Έστω $N \geq 0$ ο ελάχιστος m για τον οποίο $a_m \neq b_m$. Δηλαδή,

$$(2.3.40) \quad a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_{N-1} = b_{N-1}, a_N \neq b_N.$$

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι $a_N < b_N$. Από την

$$(2.3.41) \quad \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = \sum_{k=N}^{\infty} \frac{b_k}{10^k}$$

και από το Λήμμα 2.3.10 έπεται ότι

$$\begin{aligned}\frac{1}{10^N} &\leq \frac{b_N - a_N}{10^N} \\ &= \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} - \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{b_k}{10^k} \\ &\leq \frac{1}{10^N} - 0 \\ &= \frac{1}{10^N}.\end{aligned}$$

Άρα, όλες οι ανισότητες είναι ισότητες. Δηλαδή,

$$(2.3.42) \quad b_N - a_N = 1$$

και

$$(2.3.43) \quad \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = \frac{1}{10^N}, \quad \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{b_k}{10^k} = 0.$$

Από το Λήμμα 2.3.10,

$$\begin{aligned}b_N &= a_N + 1, \\ a_k &= 9, \text{ αν } k \geq N + 1, \\ b_k &= 0, \text{ αν } k \geq N + 1.\end{aligned}$$

Άρα, αν ο x έχει περισσότερες από μία δεκαδικές παραστάσεις, τότε έχει ακριβώς δύο παραστάσεις, τις ακόλουθες:

$$(2.3.44) \quad x = a_0.a_1a_2 \cdots a_N999 \cdots = a_0.a_1a_2 \cdots a_{N-1}(a_N + 1)00 \cdots$$

Τότε, ο x ισούται με

$$\begin{aligned}x &= a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \cdots + \frac{a_{N-1}}{10^{N-1}} + \frac{a_N + 1}{10^N} \\ &= \frac{10^N a_0 + 10^{N-1} a_1 + \cdots + 10 a_{N-1} + a_N + 1}{10^N} \\ &= \frac{m}{10^N}\end{aligned}$$

για κάποιους $m \in \mathbb{N}$ και $N \geq 0$.

Αντίστροφα, έστω ότι $x = \frac{m}{10^N}$, όπου $m \in \mathbb{N}$ και $N \geq 0$. Από το Λήμμα 2.3.11 μπορούμε να γράψουμε

$$(2.3.45) \quad m = 10^N p_N + 10^{N-1} p_{N-1} + \cdots + 10 p_1 + p_0,$$

όπου $p_N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ και $p_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ για $0 \leq k \leq N-1$. Αν p_m είναι ο πρώτος μη μηδενικός όρος της ακολουθίας $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}, p_N$, τότε

$$\begin{aligned} x &= \frac{10^N p_N + \dots + 10^m p_m}{10^N} \\ &= p_N + \frac{p_{N-1}}{10} + \dots + \frac{p_m}{10^{N-m}} \\ &= p_N \cdot p_{N-1} \dots p_m 000 \dots = p_N \cdot p_{N-1} \dots (p_m - 1) 99 \dots . \end{aligned}$$

Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη του (β). \square

2.4 Δυναμοσειρές

Ορισμός 2.4.1. Έστω (a_k) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Η σειρά

$$(2.4.1) \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

λέγεται *δυναμοσειρά* με συντελεστές a_k .

Ο x είναι μια παράμετρος από το \mathbb{R} . Το πρόβλημα που θα συζητήσουμε εδώ είναι: για δοθείσα ακολουθία συντελεστών (a_k) να βρεθούν οι τιμές του x για τις οποίες η αντίστοιχη δυναμοσειρά συγκλίνει. Για κάθε τέτοιο x λέμε ότι η δυναμοσειρά *συγκλίνει στο x* .

Πρόταση 2.4.2. Έστω $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ μια δυναμοσειρά με συντελεστές a_k .

(α) Αν η δυναμοσειρά συγκλίνει στο $y \neq 0$ και αν $|x| < |y|$, τότε η δυναμοσειρά συγκλίνει απολύτως στο x .

(β) Αν η δυναμοσειρά αποκλίνει στο y και αν $|x| > |y|$, τότε η δυναμοσειρά αποκλίνει στο x .

Απόδειξη. (α) Αφού η $\sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k$ συγκλίνει, έχουμε $a_k y^k \rightarrow 0$. Άρα, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε

$$(2.4.2) \quad |a_k y^k| \leq 1 \quad \text{για κάθε } k \geq N.$$

Έστω $x \in \mathbb{R}$ με $|x| < |y|$. Για κάθε $k \geq N$ έχουμε

$$(2.4.3) \quad |a_k x^k| = |a_k y^k| \cdot \left| \frac{x}{y} \right|^k \leq \left| \frac{x}{y} \right|^k.$$

Η γεωμετρική σειρά $\sum_{k=N}^{\infty} \left| \frac{x}{y} \right|^k$ συγκλίνει, διότι $\left| \frac{x}{y} \right| < 1$. Από το κριτήριο σύγκρισης έπεται το συμπέρασμα.

(β) Αν η δυναμοσειρά συνέκλινε στο x , από το (α) θα συνέκλινε απολύτως στο y , άτοπο. \square

Έστω $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ μια δυναμοσειρά με συντελεστές a_k . Με βάση την Πρόταση 2.4.2 μπορούμε να δείξουμε ότι το σύνολο των σημείων στα οποία συγκλίνει η δυναμοσειρά είναι «ουσιαστικά» ένα διάστημα συμμετρικό ως προς το 0 (ή, ενδεχομένως, το $\{0\}$ ή το \mathbb{R}). Αυτό φαίνεται ως εξής: ορίζουμε

$$(2.4.4) \quad R := \sup\{|x| : \text{η δυναμοσειρά συγκλίνει στο } x\}.$$

Το σύνολο στο δεξιό μέλος είναι μη κενό, αφού η δυναμοσειρά συγκλίνει στο 0. Η Πρόταση 2.4.2 δείχνει ότι αν $|x| < R$ τότε η δυναμοσειρά συγκλίνει απολύτως στο x . Πράγματι, από τον ορισμό του R υπάρχει y με $R \geq |y| > |x|$ ώστε η δυναμοσειρά να συγκλίνει στο y , οπότε εφαρμόζεται η Πρόταση 2.4.2(α) στο x . Από τον ορισμό του R είναι φανερό ότι αν $|x| > R$ τότε η δυναμοσειρά αποκλίνει στο x . Άρα, η δυναμοσειρά συγκλίνει σε κάθε $x \in (-R, R)$ και αποκλίνει σε κάθε x με $|x| > R$.

Το διάστημα $(-R, R)$ ονομάζεται *διάστημα σύγκλισης* της δυναμοσειράς. Η συζήτηση που κάναμε δείχνει ότι το *σύνολο σύγκλισης* της δυναμοσειράς, δηλαδή το σύνολο όλων των σημείων στα οποία συγκλίνει, προκύπτει από το $(-R, R)$ με την προσθήκη (ίσως) του R ή του $-R$ ή των $\pm R$. Στην περίπτωση που $R = +\infty$, η δυναμοσειρά συγκλίνει σε κάθε $x \in \mathbb{R}$. Στην περίπτωση που $R = 0$, η δυναμοσειρά συγκλίνει μόνο στο σημείο $x = 0$.

Το πρόβλημα είναι λοιπόν τώρα το εξής: πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε την *ακτίνα σύγκλισης* μιας δυναμοσειράς συναρτήσει των συντελεστών της. Μια απάντησή μας δίνει το κριτήριο της ρίζας για τη σύγκλιση σειρών.

Θεώρημα 2.4.3. Έστω $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ μια δυναμοσειρά με συντελεστές a_k . Υποθέτουμε ότι υπάρχει το $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = a$ και θέτουμε $R = \frac{1}{a}$ με τη σύμβαση ότι $\frac{1}{0} = +\infty$ και $\frac{1}{+\infty} = 0$.

(α) Αν $x \in (-R, R)$ η δυναμοσειρά συγκλίνει απολύτως στο x .

(β) Αν $x \notin [-R, R]$ η δυναμοσειρά αποκλίνει στο x .

Απόδειξη. Εφαρμόζουμε το κριτήριο της ρίζας για τη σύγκλιση σειρών. Εξετάζουμε μόνο την περίπτωση $0 < a < +\infty$ (οι περιπτώσεις $a = 0$ και $a = +\infty$ αφήνονται σαν άσκηση).

(α) Αν $|x| < R$ τότε

$$(2.4.5) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k x^k|} = |x| \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = |x|a = \frac{|x|}{R} < 1.$$

Από το κριτήριο της ρίζας, η $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ συγκλίνει απολύτως.

(β) Αν $|x| > R$ τότε

$$(2.4.6) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k x^k|} = \frac{|x|}{R} > 1.$$

Από το κριτήριο της ρίζας, η $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ αποκλίνει. \square

Παρατήρηση 2.4.4. Το Θεώρημα 2.4.3 δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε αμέσως τις συμβαίνει στα «άκρα $\pm R$ του διαστήματος σύγκλισης». Όπως δείχνουν τα επόμενα παραδείγματα, μπορεί η δυναμοσειρά να συγκλίνει σε ένα, σε κανένα ή και στα δύο άκρα.

1. Για την $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ ελέγχουμε ότι $R = 1$. Για $x = \pm 1$ έχουμε τις σειρές

$$\sum_{k=0}^{\infty} 1^k \quad \text{και} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$$

οι οποίες αποκλίνουν.

2. Για την $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(k+1)^2}$ ελέγχουμε ότι $R = 1$. Για $x = \pm 1$ έχουμε τις σειρές

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^2} \quad \text{και} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2}$$

οι οποίες συγκλίνουν.

3. Για την $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k+1}$ ελέγχουμε ότι $R = 1$. Για $x = \pm 1$ έχουμε τις σειρές

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \quad \text{και} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Η πρώτη αποκλίνει, ενώ η δεύτερη συγκλίνει.

Αντίστοιχο αποτέλεσμα προκύπτει αν χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο του λόγου στη θέση του κριτηρίου της ρίζας.

Θεώρημα 2.4.5. Έστω $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ μια δυναμοσειρά με συντελεστές $a_k \neq 0$.

Υποθέτουμε ότι υπάρχει το $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = a$ και θέτουμε $R = \frac{1}{a}$.

(α) Αν $x \in (-R, R)$ η δυναμοσειρά συγκλίνει απολύτως στο x .

(β) Αν $x \notin [-R, R]$ η δυναμοσειρά αποκλίνει στο x .

Απόδειξη. Εφαρμόστε το κριτήριο του λόγου για τη σύγκλιση σειρών. \square

2.5 Ασκήσεις

A. Ερωτήσεις κατανόησης

Έστω (a_k) μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

1. Αν $a_k \rightarrow 0$ τότε η ακολουθία $s_n = a_1 + \dots + a_n$ είναι φραγμένη.
2. Αν η ακολουθία $s_n = a_1 + \dots + a_n$ είναι φραγμένη τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.
3. Αν $|a_k| \rightarrow 0$, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει απολύτως.
4. Αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ συγκλίνει, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.
5. Αν $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και αν $0 < \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.
6. Αν $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και αν $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει.
7. Αν $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και αν $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow +\infty$, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει.
8. Αν $a_k \rightarrow 0$, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ συγκλίνει.
9. Αν $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{a_k}$ συγκλίνει.
10. Αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ συγκλίνει.
11. Αν $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ συγκλίνει.

12. Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2k)}{k!}$ συγχλίνει.

13. Η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} k(1+k^2)^p$ συγχλίνει αν και μόνο αν $p < -1$.

B. Βασικές ασκήσεις

1. Δείξτε ότι αν $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = b$ τότε $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b$.

2. Δείξτε ότι

$$(\alpha) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \quad (\beta) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k + 3^k}{6^k} = \frac{3}{2} \quad (\gamma) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k^2+k}} = 1.$$

3. Υπολογίστε το άθροισμα της σειράς $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

4. Εξετάστε για ποιές τιμές του πραγματικού αριθμού x συγχλίνει η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^k}$.

5. Εφαρμόστε τα κριτήρια λόγου και ρίζας στις ακόλουθες σειρές:

$$(\alpha) \sum_{k=1}^{\infty} k^k x^k \quad (\beta) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad (\gamma) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2} \quad (\delta) \sum_{k=0}^{\infty} k^3 x^k$$

$$(\epsilon) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} x^k \quad (\sigma\tau) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k x^k}{k^2} \quad (\zeta) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^3}{3^k} x^k \quad (\eta) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{10} x^k}{k!}.$$

Αν για κάποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ κανένα από αυτά τα δύο κριτήρια δεν δίνει απάντηση, εξετάστε τη σύγκλιση ή απόκλιση της σειράς με άλλο τρόπο.

6. Εξετάστε αν συγχλίνουν ή αποκλίνουν οι σειρές

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \cdots$$

και

$$\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{64} + \cdots.$$

7. Εξετάστε αν συγχλίνει ή αποκλίνει η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ στις παρακάτω περιπτώσεις:

$$(\alpha) a_k = \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \quad (\beta) a_k = \sqrt{1+k^2} - k$$

$$(\gamma) a_k = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{k} \quad (\delta) a_k = (\sqrt[k]{k} - 1)^k.$$

8. Εξετάστε αν συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι σειρές

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + \sqrt{k}}{2k^3 - 1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt[k]{k} - 1), \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos^2 k}{k^2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k}.$$

9. Εξετάστε ως προς τη σύγκλιση τις παρακάτω σειρές. Όπου εμφανίζονται οι παράμετροι $p, q, x \in \mathbb{R}$ να βρεθούν οι τιμές τους για τις οποίες οι αντίστοιχες σειρές συγκλίνουν.

$$\begin{aligned} (\alpha) \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-k^2} & \quad (\beta) \sum_{k=1}^{\infty} p^k k^p \quad (0 < p) & \quad (\gamma) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{p-kq}} \quad (0 < q < p) \\ (\delta) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1+\frac{1}{k}}} & \quad (\epsilon) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p^k - q^k} \quad (0 < q < p) & \quad (\sigma\tau) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^k}{2^k} \\ (\zeta) \sum_{k=1}^{\infty} k^p \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}\right) & \quad (\eta) \sum_{k=1}^{\infty} k^p \left(\sqrt{k+1} - 2\sqrt{k} + \sqrt{k-1}\right). \end{aligned}$$

10. Έστω ότι $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Δείξτε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{1+k^2 a_k}$ συγκλίνει.

11. Ορίζουμε μια ακολουθία (a_k) ως εξής: αν ο k είναι τετράγωνο φυσικού αριθμού θέτουμε $a_k = \frac{1}{k}$ και αν ο k δεν είναι τετράγωνο φυσικού αριθμού θέτουμε $a_k = \frac{1}{k^2}$. Εξετάστε αν συγκλίνει η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

12. Εξετάστε αν συγκλίνει ή αποκλίνει η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^p}$, όπου $p \in \mathbb{R}$.

13. Έστω $\{a_k\}$ φθίνουσα ακολουθία που συγκλίνει στο 0. Ορίζουμε

$$s = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k.$$

Δείξτε ότι $0 \leq (-1)^n (s - s_n) \leq a_{n+1}$.

14. Έστω (a_k) φθίνουσα ακολουθία θετικών αριθμών. Δείξτε ότι: αν η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει τότε $ka_k \rightarrow 0$.

15. Έστω ότι $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Αν η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, δείξτε ότι οι

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{1+a_k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^2}{1+a_k^2}$$

συγκλίνουν επίσης.

16. Υποθέτουμε ότι $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει. Δείξτε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{a_k a_{k+1}}$ συγκλίνει. Δείξτε ότι, αν η $\{a_k\}$ είναι φθίνουσα, τότε ισχύει και το αντίστροφο.

17. Υποθέτουμε ότι $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει. Δείξτε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_k}}{k}$ συγκλίνει.

18. Υποθέτουμε ότι $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει. Δείξτε ότι

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)} = 1.$$

Γ. Ασκήσεις*

1. Έστω (a_k) φθίνουσα ακολουθία θετικών αριθμών με $a_k \rightarrow 0$. Δείξτε ότι: αν η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει τότε

$$\sum_{k=1}^{\infty} \min \left\{ a_k, \frac{1}{k} \right\} = +\infty.$$

2. Υποθέτουμε ότι $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει. Θέτουμε $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

(α) Δείξτε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{1+a_k}$ αποκλίνει.

(β) Δείξτε ότι: για $1 \leq m < n$,

$$\frac{a_{m+1}}{s_{m+1}} + \cdots + \frac{a_n}{s_n} \geq 1 - \frac{s_m}{s_n}$$

και συμπεράνατε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{s_k}$ αποκλίνει.

(γ) Δείξτε ότι $\frac{a_n}{s_n^2} \leq \frac{1}{s_{n-1}} - \frac{1}{s_n}$ και συμπεράνατε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{s_k^2}$ συγκλίνει.

3. Υποθέτουμε ότι $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει. Θέτουμε

$$r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k.$$

(α) Δείξτε ότι: για $1 \leq m < n$,

$$\frac{a_m}{r_m} + \dots + \frac{a_n}{r_n} \geq 1 - \frac{r_{n+1}}{r_m}$$

και συμπεράνατε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{r_k}$ αποκλίνει.

(β) Δείξτε ότι $\frac{a_n}{\sqrt{r_n}} < 2(\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}})$ και συμπεράνατε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\sqrt{r_k}}$ συγχλίνει.

4. Έστω (a_k) ακολουθία πραγματικών αριθμών. Δείξτε ότι αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει τότε και η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} ka_k$ αποκλίνει.

5. Υποθέτουμε ότι $a_k \geq 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Ορίζουμε

$$b_k = \frac{1}{k} \sum_{m=k+1}^{2k} a_m.$$

Δείξτε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγχλίνει. [Υπόδειξη: Αν s_n και t_n είναι τα μερικά αθροίσματα των δύο σειρών, δοκιμάστε να συγκρίνετε τα s_{2n} και t_n .]

6. Έστω (a_k) ακολουθία θετικών αριθμών ώστε $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$ και $a_k \rightarrow 0$. Δείξτε ότι αν $0 \leq \alpha < \beta$ τότε υπάρχουν φυσικοί $m \leq n$ ώστε

$$\alpha < \sum_{k=m}^n a_k < \beta.$$

7. Δείξτε ότι αν $0 \leq \alpha < \beta$ τότε υπάρχουν φυσικοί $m \leq n$ ώστε

$$\alpha < \frac{1}{m} + \frac{1}{m+1} + \dots + \frac{1}{n} < \beta.$$

Κεφάλαιο 3

Ομοιόμορφη συνέχεια

3.1 Ομοιόμορφη συνέχεια

Πριν δώσουμε τον ορισμό της ομοιόμορφης συνέχειας, θα εξετάσουμε πιο προσεκτικά δύο απλά παραδείγματα συνεχών συναρτήσεων.

(α) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x$, $x \in \mathbb{R}$. Γνωρίζουμε ότι η f είναι συνεχής στο \mathbb{R} , κάτι που εύκολα επιβεβαιώνουμε αυστηρά χρησιμοποιώντας τον ορισμό της συνέχειας:

Έστω $x_0 \in \mathbb{R}$ και έστω $\varepsilon > 0$. Ζητάμε $\delta > 0$ ώστε

$$(3.1.1) \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \text{ δηλαδή } |x - x_0| < \varepsilon.$$

Η επιλογή του δ είναι προφανής: αρκεί να πάρουμε $\delta = \varepsilon$. Παρατηρήστε ότι το δ που βρήκαμε εξαρτάται μόνο από το ε που δόθηκε και όχι από το συγκεκριμένο σημείο x_0 . Η συνάρτηση f μεταβάλλεται με τον «ίδιο ρυθμό» σε ολόκληρο το πεδίο ορισμού της: αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|x - y| < \varepsilon$, τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

(β) Θεωρούμε τώρα τη συνάρτηση $g(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Είναι πάλι γνωστό ότι η g είναι συνεχής στο \mathbb{R} (αφού $g = f \cdot f$). Αν θελήσουμε να το επιβεβαιώσουμε με τον εψιλοντικό ορισμό, θεωρούμε $x_0 \in \mathbb{R}$ και $\varepsilon > 0$, και ζητάμε $\delta > 0$ με την ιδιότητα

$$(3.1.2) \quad |x - x_0| < \delta \implies |x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$

Ένας τρόπος για να επιλέξουμε κατάλληλο δ είναι ο εξής. Συμφωνούμε από την αρχή ότι θα πάρουμε $0 < \delta \leq 1$, οπότε

$$\begin{aligned} |x^2 - x_0^2| &= |x - x_0| \cdot |x + x_0| \leq (|x| + |x_0|) \cdot |x - x_0| \\ &\leq (2|x_0| + 1)|x - x_0|. \end{aligned}$$

Αν λοιπόν επιλέξουμε

$$(3.1.3) \quad \delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2|x_0| + 1} \right\},$$

τότε

$$(3.1.4) \quad |x - x_0| < \delta \implies |x^2 - x_0^2| < (2|x_0| + 1)\delta \leq \varepsilon.$$

Άρα, η g είναι συνεχής στο x_0 . Παρατηρήστε όμως ότι το δ που επιλέξαμε δεν εξαρτάται μόνο από το ε που μας δόθηκε, αλλά και από το σημείο x_0 στο οποίο ελέγχουμε την συνέχεια της g . Η επιλογή που κάναμε στην (3.1.3) δείχνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται το x_0 από το 0, τόσο πιο μικρό πρέπει να επιλέξουμε το δ .

Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς ότι ίσως υπάρχει καλύτερος τρόπος επιλογής του δ , ακόμα και ανεξάρτητος από το σημείο x_0 . Ας δούμε το ίδιο πρόβλημα με έναν δεύτερο τρόπο. Θεωρούμε $x_0 > 0$ και $\varepsilon > 0$. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι $\varepsilon < x_0^2$, αφού τα μικρά ε είναι αυτά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μπορούμε επίσης να κοιτάμε μόνο $x > 0$, αφού μας ενδιαφέρει τι γίνεται κοντά στο x_0 το οποίο έχει υποθεθεί θετικό. Η ανισότητα $|x^2 - x_0^2| < \varepsilon$ ικανοποιείται αν και μόνο αν $x_0^2 - \varepsilon < x^2 < x_0^2 + \varepsilon$, δηλαδή αν και μόνο αν

$$(3.1.5) \quad \sqrt{x_0^2 - \varepsilon} < x < \sqrt{x_0^2 + \varepsilon}.$$

Ισοδύναμα, αν

$$(3.1.6) \quad -\left(x_0 - \sqrt{x_0^2 - \varepsilon}\right) < x - x_0 < \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0.$$

Αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν

$$\begin{aligned} |x - x_0| &< \min \left\{ x_0 - \sqrt{x_0^2 - \varepsilon}, \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0 \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 - \varepsilon} + x_0}, \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon} + x_0} \right\} \\ &= \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon} + x_0}. \end{aligned}$$

Υποθέσαμε ότι $x_0^2 > \varepsilon$. Άρα,

$$(3.1.7) \quad \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon} + x_0} < \frac{x_0^2}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon} + x_0} < \frac{x_0^2}{x_0} = x_0.$$

Αν λοιπόν $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon + x_0}}$, τότε $|x - x_0| < x_0 \Rightarrow x > 0$ και ο προηγούμενος υπολογισμός δείχνει ότι $|x^2 - x_0^2| < \varepsilon$. Δηλαδή, αν $0 < \varepsilon < x_0^2$ τότε η καλύτερη επιλογή του δ στο σημείο x_0 είναι

$$(3.1.8) \quad \delta = \delta(\varepsilon, x_0) = \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon + x_0}}.$$

Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την (3.1.2) αν επιλέξουμε μεγαλύτερο δ .

Αν τα προηγούμενα δύο επιχειρήματα δεν είναι απολύτως πειστικά, δίνουμε κι ένα τρίτο.

Ισχυρισμός. Θεωρούμε την $g(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Έστω $\varepsilon > 0$. **Δεν** υπάρχει $\delta > 0$ με την ιδιότητα: αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|y - x| < \delta$ τότε $|g(y) - g(x)| < \varepsilon$.

Παρατηρήστε ότι ο ισχυρισμός είναι ισοδύναμος με το εξής: για δοθέν $\varepsilon > 0$ δεν υπάρχει κάποια ομοιόμορφη επιλογή του δ που να μας επιτρέπει να ελέγχουμε την (3.1.2) σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$.

Απόδειξη του ισχυρισμού. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $\delta > 0$ ώστε: αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|y - x| < \delta$ τότε $|g(y) - g(x)| < \varepsilon$. Αφού για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε $|x + \frac{\delta}{2} - x| = \frac{\delta}{2} < \delta$, πρέπει, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να ισχύει η

$$(3.1.9) \quad \left| \left(x + \frac{\delta}{2} \right)^2 - x^2 \right| < \varepsilon.$$

Ειδικότερα, για κάθε $x > 0$ πρέπει να ισχύει η

$$(3.1.10) \quad \delta x < \delta x + \frac{\delta^2}{4} = \left| \left(x + \frac{\delta}{2} \right)^2 - x^2 \right| < \varepsilon.$$

Όμως τότε, για κάθε $x > 0$ θα είχαμε

$$(3.1.11) \quad x < \frac{\varepsilon}{\delta}.$$

Αυτό είναι άτοπο: το \mathbb{R} θα ήταν άνω φραγμένο. \square

Τα παραδείγματα που δώσαμε δείχνουν μια «παράλειψη» μας στον ορισμό της συνέχειας. Ένας πιο προσεκτικός ορισμός θα ήταν ο εξής:

Η $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο $x_0 \in A$ αν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\delta(\varepsilon, x_0) > 0$ ώστε: αν $x \in A$ και $|x - x_0| < \delta$, τότε $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Ο συμβολισμός $\delta(\varepsilon, x_0)$ θα έδειχνε ότι το δ εξαρτάται τόσο από το ε όσο και από το σημείο x_0 . Οι συναρτήσεις (όπως η $f(x) = x$) που μας επιτρέπουν να επιλέγουμε το δ ανεξάρτητα από το x_0 λέγονται *ομοιόμορφα συνεχείς*:

Ορισμός 3.1.1. Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση. Λέμε ότι η f είναι **ομοιόμορφα συνεχής** στο A αν για κάθε $\varepsilon > 0$ μπορούμε να βρούμε $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ ώστε

$$(3.1.12) \quad \text{αν } x, y \in A \text{ και } |x - y| < \delta \text{ τότε } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Παραδείγματα

(α) Η $f(x) = x$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} .

(β) Η $g(x) = x^2$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} .

(γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = x^2$ του (β), περιορισμένη όμως στο κλειστό διάστημα $[-M, M]$, όπου $M > 0$. Τότε, για κάθε $x, y \in [-M, M]$ έχουμε

$$(3.1.13) \quad |g(y) - g(x)| = |y^2 - x^2| = |x + y| \cdot |y - x| \leq 2M \cdot |y - x|.$$

Δίνεται $\varepsilon > 0$. Αν επιλέξουμε $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2M}$ τότε η (3.1.13) δείχνει ότι αν $x, y \in [-M, M]$ και $|x - y| < \delta$ έχουμε

$$(3.1.14) \quad |g(y) - g(x)| \leq 2M \cdot |y - x| < 2M\delta = \varepsilon.$$

Δηλαδή, η g είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[-M, M]$.

Το παράδειγμα (γ) οδηγεί στον εξής ορισμό.

Ορισμός 3.1.2. Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση. Λέμε ότι η f είναι *Lipschitz συνεχής* αν υπάρχει $M > 0$ ώστε: για κάθε $x, y \in A$

$$(3.1.15) \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Πρόταση 3.1.3. Κάθε *Lipschitz συνεχής συνάρτηση* είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Απόδειξη. Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ και $M > 0$ ώστε $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ για κάθε $x, y \in A$. Αν μας δώσουν $\varepsilon > 0$, επιλέγουμε $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$. Τότε, για κάθε $x, y \in A$ με $|x - y| < \delta$ έχουμε

$$(3.1.16) \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y| < M\delta = \varepsilon.$$

Έπεται ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο A . □

Η επόμενη Πρόταση μας δίνει ένα χρήσιμο κριτήριο για να εξασφαλίζουμε ότι μια συνάρτηση είναι Lipschitz συνεχής (άρα, ομοιόμορφα συνεχής).

Πρόταση 3.1.4. Έστω I ένα διάστημα και έστω $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι η f' είναι φραγμένη: υπάρχει σταθερά $M > 0$ ώστε: $|f'(x)| \leq M$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του I . Τότε, η f είναι *Lipschitz συνεχής* με σταθερά M .

Απόδειξη. Έστω $x < y$ στο I . Από το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει $\xi \in (x, y)$ ώστε

$$(3.1.17) \quad f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x).$$

Τότε,

$$(3.1.18) \quad |f(y) - f(x)| = |f'(\xi)| \cdot |y - x| \leq M|y - x|.$$

Σύμφωνα με τον Ορισμό 3.1.2, η f είναι Lipschitz συνεχής με σταθερά M . \square

Από τη συζήτηση που προηγήθηκε του ορισμού της ομοιόμορφης συνέχειας, είναι λογικό να περιμένουμε ότι οι ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις είναι συνεχείς. Αυτό αποδεικνύεται με απλή σύγκριση των δύο ορισμών:

Πρόταση 3.1.5. *Αν η $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής, τότε είναι συνεχής.*

Απόδειξη. Πράγματι: έστω $x_0 \in A$ και $\varepsilon > 0$. Από τον ορισμό της ομοιόμορφης συνέχειας, υπάρχει $\delta > 0$ ώστε αν $x, y \in A$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Επιλέγουμε αυτό το δ . Αν $x \in A$ και $|x - x_0| < \delta$, τότε $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ (πάρτε $y = x_0$). Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, η f είναι συνεχής στο x_0 . \square

3.2 Χαρακτηρισμός της ομοιόμορφης συνέχειας μέσω ακολουθιών

Θυμηθείτε τον χαρακτηρισμό της συνέχειας μέσω ακολουθιών: αν $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, τότε η f είναι συνεχής στο $x_0 \in A$ αν και μόνο αν για κάθε ακολουθία (x_n) με $x_n \in A$ και $x_n \rightarrow x_0$, ισχύει $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός της ομοιόμορφης συνέχειας έχει ως εξής:

Θεώρημα 3.2.1. *Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση. Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο A αν και μόνο αν για κάθε ζευγάρι ακολουθιών $(x_n), (y_n)$ στο A με $x_n - y_n \rightarrow 0$ ισχύει*

$$(3.2.1) \quad f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0.$$

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο A . Έστω $(x_n), (y_n)$ δύο ακολουθίες στο A με $x_n - y_n \rightarrow 0$. Θα δείξουμε ότι $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$:

Έστω $\varepsilon > 0$. Από τον ορισμό της ομοιόμορφης συνέχειας, υπάρχει $\delta > 0$ ώστε

$$(3.2.2) \quad \text{αν } x, y \in A \text{ και } |x - y| < \delta \text{ τότε } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Αφού $x_n - y_n \rightarrow 0$, υπάρχει $n_0(\delta) \in \mathbb{N}$ ώστε: αν $n \geq n_0$ τότε $|x_n - y_n| < \delta$. Έστω $n \geq n_0$. Τότε, $|x_n - y_n| < \delta$ και $x_n, y_n \in A$, οπότε η (3.2.2) δίνει

$$(3.2.3) \quad |f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon.$$

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, συμπεραίνουμε ότι $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$.

Αντίστροφα: ας υποθέσουμε ότι

$$(3.2.4) \quad \text{αν } x_n, y_n \in A \text{ και } x_n - y_n \rightarrow 0 \text{ τότε } f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0.$$

Θα δείξουμε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο A . Έστω ότι δεν είναι. Τότε, υπάρχει $\varepsilon > 0$ με την εξής ιδιότητα:

$$\text{Για κάθε } \delta > 0 \text{ υπάρχουν } x_\delta, y_\delta \in A \text{ με } |x_\delta - y_\delta| < \delta \text{ αλλά } |f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \varepsilon.$$

Επιλέγοντας διαδοχικά $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$, βρίσκουμε ζευγάρια $x_n, y_n \in A$ ώστε

$$(3.2.5) \quad |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ αλλά } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon.$$

Θεωρούμε τις ακολουθίες $(x_n), (y_n)$. Από την κατασκευή έχουμε $x_n - y_n \rightarrow 0$, αλλά από την $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ισχύει η $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$ (εξηγήστε γιατί). Αυτό είναι άτοπο, άρα η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο A . \square

Παραδείγματα

(α) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$ στο $(0, 1]$. Η f είναι συνεχής αλλά δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Για να το δούμε, αρκεί να βρούμε δύο ακολουθίες $(x_n), (y_n)$ στο $(0, 1]$ που να ικανοποιούν την $x_n - y_n \rightarrow 0$ αλλά να μην ικανοποιούν την $\frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} \rightarrow 0$.

Παίρνουμε $x_n = \frac{1}{n}$ και $y_n = \frac{1}{2n}$. Τότε, $x_n, y_n \in (0, 1]$ και

$$(3.2.6) \quad x_n - y_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$$

αλλά

$$(3.2.7) \quad f(x_n) - f(y_n) = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} = n - 2n = -n \rightarrow -\infty.$$

(β) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = x^2$ στο \mathbb{R} . Ορίζουμε $x_n = n + \frac{1}{n}$ και $y_n = n$. Τότε,

$$(3.2.8) \quad x_n - y_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

αλλά

$$(3.2.9) \quad g(x_n) - g(y_n) = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 \neq 0.$$

Άρα, η g δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} .

(γ) Ορίζουμε $f(x) = \cos(x^2)$, $x \in \mathbb{R}$. Η f είναι συνεχής στο \mathbb{R} και $|f(x)| \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δηλαδή, η f είναι επιπλέον φραγμένη. Όμως η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής: για να το δείτε, θεωρήστε τις ακολουθίες

$$(3.2.10) \quad x_n = \sqrt{(n+1)\pi} \quad \text{και} \quad y_n = \sqrt{n\pi}.$$

Τότε,

$$(3.2.11) \quad x_n - y_n = \sqrt{(n+1)\pi} - \sqrt{n\pi} = \frac{(n+1)\pi - n\pi}{\sqrt{(n+1)\pi} + \sqrt{n\pi}} = \frac{\pi}{\sqrt{(n+1)\pi} + \sqrt{n\pi}} \rightarrow 0,$$

αλλά

$$(3.2.12) \quad |f(x_n) - f(y_n)| = |\cos((n+1)\pi) - \cos(n\pi)| = 2$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Από το Θεώρημα 3.2.1 έπεται το συμπέρασμα. Υπάρχουν λοιπόν φραγμένες συνεχείς συναρτήσεις που δεν είναι ομοιόμορφα συνεχείς (σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της $\cos(x^2)$ για να δείτε το λόγο: για μεγάλα x , η f ανεβαίνει από την τιμή -1 στην τιμή 1 και κατεβαίνει από την τιμή 1 στην τιμή -1 όλο και πιο γρήγορα - ο ρυθμός μεταβολής της γίνεται πολύ μεγάλος).

3.3 Συνεχείς συναρτήσεις σε κλειστά διαστήματα

Στην παράγραφο §3.1 είδαμε ότι η συνάρτηση $g(x) = x^2$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $I = \mathbb{R}$ αλλά είναι ομοιόμορφα συνεχής σε κάθε διάστημα της μορφής $I = [-M, M]$, $M > 0$ (οσοδήποτε μεγάλο κι αν είναι το M). Αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι κάθε συνεχής συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής:

Θεώρημα 3.3.1. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Τότε, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, b]$.

Απόδειξη. Ας υποθέσουμε ότι η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Τότε, όπως στην απόδειξη του Θεωρήματος 3.2.1, μπορούμε να βρούμε $\varepsilon > 0$ και δύο ακολουθίες (x_n) , (y_n) στο $[a, b]$ με $x_n - y_n \rightarrow 0$ και $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Αφού $a \leq x_n, y_n \leq b$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, οι (x_n) και (y_n) είναι φραγμένες ακολουθίες. Από το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass, υπάρχει υπακολουθία (x_{k_n}) της (x_n) η οποία συγκλίνει σε κάποιο $x \in \mathbb{R}$. Αφού $a \leq x_{k_n} \leq b$ για κάθε n , συμπεραίνουμε ότι $a \leq x \leq b$. Δηλαδή,

$$(3.3.1) \quad x_{k_n} \rightarrow x \in [a, b].$$

Παρατηρήστε ότι $x_{k_n} - y_{k_n} \rightarrow 0$, άρα

$$(3.3.2) \quad y_{k_n} = x_{k_n} - (x_{k_n} - y_{k_n}) \rightarrow x - 0 = x.$$

Από τη συνέχεια της f στο x έπεται ότι

$$(3.3.3) \quad f(x_{k_n}) \rightarrow f(x) \quad \text{και} \quad f(y_{k_n}) \rightarrow f(x).$$

Δηλαδή,

$$(3.3.4) \quad f(x_{k_n}) - f(y_{k_n}) \rightarrow x - x = 0.$$

Αυτό είναι άτοπο, αφού $|f(x_{k_n}) - f(y_{k_n})| \geq \varepsilon$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Άρα, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, b]$. \square

Παρατήρηση. Το γεγονός ότι η f ήταν ορισμένη στο **κλειστό διάστημα** $[a, b]$ χρησιμοποιήθηκε με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορέσαμε να βρούμε συγκλίνουσες υπακολουθίες των (x_n) , (y_n) (θεώρημα Bolzano-Weierstrass). Δεύτερον, μπορούσαμε να πούμε ότι το κοινό όριο x αυτών των υπακολουθιών εξακολουθεί να βρίσκεται στο πεδίο ορισμού $[a, b]$ της f . Χρησιμοποιήσαμε δηλαδή το εξής:

$$(3.3.5) \quad \text{αν } a \leq z_n \leq b \text{ και } z_n \rightarrow z, \text{ τότε } a \leq z \leq b.$$

Το επόμενο θεώρημα αποδεικνύει ότι οι ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις έχουν την εξής «καλή ιδιότητα»: απεικονίζουν ακολουθίες Cauchy σε ακολουθίες Cauchy. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις συνεχείς συναρτήσεις: θεωρήστε την $f(x) = \frac{1}{x}$ στο $(0, 1]$. Η $x_n = \frac{1}{n}$ είναι ακολουθία Cauchy στο $(0, 1]$, όμως η $f(x_n) = n$ δεν είναι ακολουθία Cauchy.

Θεώρημα 3.3.2. Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση και έστω (x_n) ακολουθία Cauchy στο A . Τότε, η $(f(x_n))$ είναι ακολουθία Cauchy.

Απόδειξη. Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει $\delta > 0$ ώστε: αν $x, y \in A$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Η (x_n) είναι ακολουθία Cauchy, άρα υπάρχει $n_0(\delta)$ ώστε

$$(3.3.6) \quad \text{αν } m, n \geq n_0(\delta), \text{ τότε } |x_n - x_m| < \delta.$$

Όμως τότε,

$$(3.3.7) \quad |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Βρήκαμε $n_0 \in \mathbb{N}$ με την ιδιότητα

$$(3.3.8) \quad \text{αν } m, n \geq n_0(\delta) \text{ τότε } |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, η $(f(x_n))$ είναι ακολουθία Cauchy. \square

Είδαμε ότι κάθε συνεχής συνάρτηση f ορισμένη σε κλειστό διάστημα είναι ομοιόμορφα συνεχής. Θα εξετάσουμε το εξής ερώτημα: Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο (a, b) ;

Θεώρημα 3.3.3. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο (a, b) αν και μόνο αν υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$.

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$. Ορίζουμε μια «επέκταση» g της f στο $[a, b]$, θέτοντας: $g(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $g(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ και $g(x) = f(x)$ αν $x \in (a, b)$.

Η g είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, b]$ (εξηγήστε γιατί), άρα ομοιόμορφα συνεχής. Θα δείξουμε ότι η f είναι κι αυτή ομοιόμορφα συνεχής στο (a, b) . Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η g είναι ομοιόμορφα συνεχής, υπάρχει $\delta > 0$ ώστε: αν $x, y \in [a, b]$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$.

Θεωρούμε $x, y \in (a, b)$ με $|x - y| < \delta$. Τότε, από τον ορισμό της g έχουμε

$$(3.3.9) \quad |f(x) - f(y)| = |g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο (a, b) και δείχνουμε ότι υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (η ύπαρξη του άλλου πλευρικού ορίου αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο).

Θα δείξουμε ότι αν (x_n) είναι ακολουθία στο (a, b) με $x_n \rightarrow a$, τότε η $(f(x_n))$ συγκλίνει. Αυτό είναι άμεσο από το Θεώρημα 3.3.2: η (x_n) συγκλίνει, άρα η (x_n) είναι ακολουθία Cauchy, άρα η $(f(x_n))$ είναι ακολουθία Cauchy, άρα η $(f(x_n))$ συγκλίνει σε κάποιον πραγματικό αριθμό ℓ .

Επίσης, το όριο της $(f(x_n))$ είναι ανεξάρτητο από την επιλογή της (x_n) : έστω (y_n) μια άλλη ακολουθία στο (a, b) με $y_n \rightarrow a$. Τότε, $x_n - y_n \rightarrow 0$. Από το Θεώρημα 3.2.1,

$$(3.3.10) \quad f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0.$$

Ξέρουμε ήδη ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \ell$, άρα

$$(3.3.11) \quad f(y_n) = f(x_n) - (f(x_n) - f(y_n)) \rightarrow \ell + 0 = \ell.$$

Από την αρχή της μεταφοράς (για το όριο συνάρτησης) έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$. \square

Παραδείγματα

(α) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ στο $[0, 1]$. Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$, επομένως είναι ομοιόμορφα συνεχής. Όμως, η f δεν είναι Lipschitz συνεχής στο $[0, 1]$.

Αν ήταν, θα υπήρχε $M > 0$ ώστε

$$(3.3.12) \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

για κάθε $x, y \in [0, 1]$. Ειδικότερα, για κάθε $n \in \mathbb{N}$ θα είχαμε

$$(3.3.13) \quad \left| f\left(\frac{1}{n^2}\right) - f(0) \right| = \frac{1}{n} = n \cdot \left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| \leq M \cdot \left| \frac{1}{n^2} - 0 \right|.$$

Δηλαδή, $n \leq M$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Αυτό είναι άτοπο: το \mathbb{N} θα ήταν άνω φραγμένο.

(β) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι Lipschitz συνεχής στο $[1, +\infty)$, άρα ομοιόμορφα συνεχής. Πράγματι, αν $x \geq 1$ τότε

$$(3.3.14) \quad |f'(x)| = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2},$$

δηλαδή η f έχει φραγμένη παράγωγο στο $[1, +\infty)$. Από την Πρόταση 3.1.4 είναι Lipschitz συνεχής με σταθερά $1/2$.

(γ) Ας δούμε τώρα την ίδια συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ στο $[0, +\infty)$. Η f δεν είναι Lipschitz συνεχής στο $[0, +\infty)$ ούτε μπορούμε να εφαρμόσουμε το Θεώρημα 3.3.1. Είδαμε όμως ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, 1]$ και ομοιόμορφα συνεχής στο $[1, +\infty)$. Αυτό φτάνει για να δείξουμε ότι είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$:

Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει $\delta_1 > 0$ ώστε: αν $x, y \in [0, 1]$ και $|x - y| < \delta_1$ τότε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$ (από την ομοιόμορφη συνέχεια της f στο $[0, 1]$).

Επίσης, υπάρχει $\delta_2 > 0$ ώστε: αν $x, y \in [1, +\infty)$ και $|x - y| < \delta_2$ τότε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$ (από την ομοιόμορφη συνέχεια της f στο $[1, +\infty)$).

Θέτουμε $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Έστω $x < y \in [0, +\infty)$ με $|x - y| < \delta$. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

(i) Αν $0 \leq x < y \leq 1$ και $|x - y| < \delta$, τότε $|x - y| < \delta_1$ άρα $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$.

(ii) Αν $1 \leq x < y$ και $|x - y| < \delta$, τότε $|x - y| < \delta_2$ άρα $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$.

(iii) Αν $x < 1 < y$ και $|x - y| < \delta$, παρατηρούμε ότι $|x - 1| < \delta$ και $|1 - y| < \delta$. Όμως, $x, 1 \in [0, 1]$ και $1, y \in [1, +\infty)$. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(1)| + |f(1) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3.4 Σύστολες – θεώρημα σταθερού σημείου

Ορισμός 3.4.1. Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται συστολή αν υπάρχει $0 < M < 1$ ώστε: για κάθε $x, y \in A$

$$(3.4.1) \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Προφανώς, κάθε συστολή είναι Lipschitz συνεχής.

Θεώρημα 3.4.2 (θεώρημα σταθερού σημείου). Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συστολή. Υπάρχει μοναδικό $y \in \mathbb{R}$ με την ιδιότητα

$$(3.4.2) \quad f(y) = y.$$

Απόδειξη. Από την υπόθεση υπάρχει $0 < M < 1$ ώστε $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Η f είναι Lipschitz συνεχής, άρα ομοιόμορφα συνεχής. Επιλέγουμε τυχόν $x_1 \in \mathbb{R}$. Ορίζουμε μια ακολουθία (x_n) μέσω της

$$(3.4.3) \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Τότε,

$$(3.4.4) \quad |x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq M|x_n - x_{n-1}|$$

για κάθε $n \geq 2$. Επαγωγικά αποδεικνύουμε ότι

$$(3.4.5) \quad |x_{n+1} - x_n| \leq M^{n-1}|x_2 - x_1|$$

για κάθε $n \geq 2$. Έπεται ότι αν $n > m$ στο \mathbb{N} , τότε

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &\leq |x_n - x_{n-1}| + \cdots + |x_{m+1} - x_m| \\ &\leq (M^{n-2} + \cdots + M^{m-1})|x_2 - x_1| \\ &= \frac{1 - M^{n-m}}{1 - M} M^{m-1} |x_2 - x_1| \\ &\leq \frac{M^{m-1}}{1 - M} |x_2 - x_1|. \end{aligned}$$

Αφού $0 < M < 1$, έχουμε $M^m \rightarrow 0$. Άρα, για δοθέν $\varepsilon > 0$ μπορούμε να βρούμε $n_0(\varepsilon)$ ώστε: αν $n > m \geq n_0$ τότε $\frac{M^{m-1}}{1-M}|x_2 - x_1| < \varepsilon$, και συνεπώς, $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

Επομένως, η (x_n) είναι ακολουθία Cauchy και αυτό σημαίνει ότι συγκλίνει: υπάρχει $y \in \mathbb{R}$ ώστε $x_n \rightarrow y$. Θα δείξουμε ότι $f(y) = y$: από την $x_n \rightarrow y$ και τη συνέχεια της f στο y βλέπουμε ότι $f(x_n) \rightarrow f(y)$. Όμως $x_{n+1} = f(x_n)$ και $x_{n+1} \rightarrow y$, άρα $f(x_n) \rightarrow y$. Από τη μοναδικότητα του ορίου ακολουθίας προκύπτει η $f(y) = y$.

Το y είναι το μοναδικό σταθερό σημείο της f . Έστω $z \neq y$ με $f(z) = z$. Τότε,

$$(3.4.6) \quad 0 < |z - y| = |f(z) - f(y)| \leq M|z - y|,$$

δηλαδή $1 \leq M$, το οποίο είναι άτοπο. \square

3.5 Ασκήσεις

A. Βασικές ασκήσεις

1. Δείξτε το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής για μια συνεχή συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ χρησιμοποιώντας το θεώρημα Bolzano–Weierstrass:

(α) Δείξτε πρώτα ότι υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M$ για κάθε $x \in [a, b]$, με απαγωγή σε άτοπο. Αν αυτό δεν ισχύει, μπορούμε να βρούμε $x_n \in [a, b]$ ώστε $|f(x_n)| > n$, $n = 1, 2, \dots$. Η (x_n) έχει υπακολουθία (x_{k_n}) ώστε $x_{k_n} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. Χρησιμοποιήστε την αρχή της μεταφοράς (η f είναι συνεχής στο x_0) για να καταλήξετε σε άτοπο.

(β) Από το (α) έχουμε $M := \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} < \infty$. Τότε, μπορούμε να βρούμε $x_n \in [a, b]$ ώστε $f(x_n) \rightarrow M$ (εξηγήστε γιατί). Η (x_n) έχει υπακολουθία (x_{k_n}) ώστε $x_{k_n} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. Χρησιμοποιήστε την αρχή της μεταφοράς (η f είναι συνεχής στο x_0) για να συμπεράνετε ότι $f(x_0) = M$. Αυτό αποδεικνύει ότι η f παίρνει μέγιστη τιμή (στο x_0).

(γ) Εργαζόμενοι όμοια, δείξτε ότι η f παίρνει ελάχιστη τιμή.

2. Έστω $X \subseteq \mathbb{R}$. Λέμε ότι μια συνάρτηση $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz αν υπάρχει $M \geq 0$ ώστε: για κάθε $x, y \in X$,

$$|f(x) - f(y)| \leq M \cdot |x - y|.$$

Δείξτε ότι αν η $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz τότε είναι ομοιόμορφα συνεχής. Ισχύει το αντίστροφο;

3. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, παραγωγίσιμη στο (a, b) . Δείξτε ότι η f ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz αν και μόνο αν η f' είναι φραγμένη.

4. Έστω $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ και $f(x) = x^{1/n}$, $x \in [0, 1]$. Δείξτε ότι η συνάρτηση f δεν ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz. Είναι ομοιόμορφα συνεχής;

5. Εξετάστε αν οι παρακάτω συναρτήσεις ικανοποιούν συνθήκη Lipschitz:

(α) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ αν $x \neq 0$ και $f(0) = 0$.

(β) $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ αν $x \neq 0$ και $g(0) = 0$.

6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow [m, M]$ και $g : [m, M] \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις. Δείξτε ότι η $g \circ f$ είναι ομοιόμορφα συνεχής.
7. Έστω $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις. Δείξτε ότι
 (α) η $f + g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I .
 (β) η $f \cdot g$ δεν είναι αναγκαστικά ομοιόμορφα συνεχής στο I , αν όμως οι f, g υποτεθούν και φραγμένες τότε η $f \cdot g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I .
8. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $M = M(\varepsilon) > 0$ ώστε αν $|x| \geq M$ τότε $|f(x)| < \varepsilon$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.
9. Έστω $a \in \mathbb{R}$ και $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και είναι πραγματικός αριθμός. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.
10. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι υπάρχουν $A, B > 0$ ώστε $|f(x)| \leq A|x| + B$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
11. Έστω $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη Άσκηση δείξτε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^n$, $x \in \mathbb{R}$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής.
12. (α) Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι υπάρχει $a > 0$ ώστε η f να είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$.
 (β) Δείξτε ότι η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$.
13. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι υπάρχει συνεχής συνάρτηση $\hat{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ώστε $\hat{f}(x) = f(x)$ για κάθε $x \in (a, b)$.
14. Εξετάστε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι ομοιόμορφα συνεχείς.
 (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 3x + 1$.
 (ii) $f : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$.
 (iii) $f : (0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x} \sin^2 x$.
 (iv) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$.
 (v) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$.
 (vi) $f : [-2, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

- (vii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin x$.
- (viii) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\cos(x^2)}{x+1}$.

B. Ερωτήσεις κατανόησης

Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

1. Η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(0, 1)$.
2. Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x-1}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(0, 1)$.
3. Αν η συνάρτηση f δεν είναι φραγμένη στο $(0, 1)$, τότε η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(0, 1)$.
4. Αν η (x_n) είναι ακολουθία Cauchy και η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} , τότε η $(f(x_n))$ είναι ακολουθία Cauchy.
5. Αν η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(0, 1)$, τότε το $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{1}{n})$ υπάρχει.
6. Θεωρούμε τις $f(x) = x$ και $g(x) = \sin x$. Οι f και g είναι ομοιόμορφα συνεχείς στο \mathbb{R} , όμως η fg δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} .
7. Η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x$ αν $x > 0$ και $f(x) = 2x$ αν $x \leq 0$, είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} .
8. Κάθε φραγμένη και συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Γ. Ασκήσεις

1. Δείξτε ότι η συνάρτηση $f : (0, 1) \cup (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 0$ αν $x \in (0, 1)$ και $f(x) = 1$ αν $x \in (1, 2)$ είναι συνεχής αλλά δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής.
2. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και έστω $\varepsilon > 0$. Δείξτε ότι μπορούμε να χωρίσουμε το $[a, b]$ σε πεπερασμένα το πλήθος διαδοχικά υποδιαστήματα του ίδιου μήκους έτσι ώστε: αν τα x, y ανήκουν στο ίδιο υποδιάστημα, τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.
3. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, φραγμένη και μονότονη συνάρτηση. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

4. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και περιοδική συνάρτηση. Δηλαδή, υπάρχει $T > 0$ ώστε $f(x+T) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

5. Έστω $X \subset \mathbb{R}$ φραγμένο σύνολο και $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι η f είναι φραγμένη: υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M$ για κάθε $x \in X$.

6. Έστω A μη κενό υποσύνολο του \mathbb{R} . Ορίζουμε $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x) = \inf\{|x - a| : a \in A\}$$

($f(x)$ είναι η «απόσταση» του x από το A). Δείξτε ότι

(α) $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

(β) η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Κεφάλαιο 4

Ολοκλήρωμα Riemann

4.1 Ο ορισμός του Darboux

Σε αυτήν την παράγραφο δίνουμε τον ορισμό του ολοκληρώματος Riemann για φραγμένες συναρτήσεις που ορίζονται σε ένα κλειστό διάστημα. Για μια φραγμένη συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με μη αρνητικές τιμές, θα θέλαμε το ολοκλήρωμα να δίνει το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στο γράφημα της συνάρτησης, τον οριζόντιο άξονα $y = 0$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = a$ και $x = b$.

Ορισμός 4.1.1. (α) Έστω $[a, b]$ ένα κλειστό διάστημα. **Διαμέριση** του $[a, b]$ θα λέμε κάθε πεπερασμένο υποσύνολο

$$(4.1.1) \quad P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

του $[a, b]$ με $x_0 = a$ και $x_n = b$. Θα υποθέτουμε πάντα ότι τα $x_k \in P$ είναι διατεταγμένα ως εξής:

$$(4.1.2) \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n = b.$$

Θα γράφουμε

$$(4.1.3) \quad P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$$

για να τονίσουμε αυτήν ακριβώς τη διάταξη. Παρατηρήστε ότι από τον ορισμό, κάθε διαμέριση P του $[a, b]$ περιέχει τουλάχιστον δύο σημεία: το a και το b (τα άκρα του $[a, b]$).

(β) Κάθε διαμέριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ χωρίζει το $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα $[x_k, x_{k+1}]$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Ονομάζουμε **πλάτος** της

διαμέρισης P το μεγαλύτερο από τα μήκη αυτών των υποδιαστημάτων. Δηλαδή, το πλάτος της διαμέρισης ισούται με

$$(4.1.4) \quad \|P\| := \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}\}.$$

Παρατηρήστε ότι δεν απαιτούμε να ισαπέχουν τα x_k (τα n υποδιαστήματα δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο μήκος).

(γ) Η διαμέριση P_1 λέγεται **εκλέπτυνση** της P αν $P \subseteq P_1$, δηλαδή αν η P_1 προκύπτει από την P με την προσθήκη κάποιων (πεπερασμένων το πλήθος) σημείων. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε επίσης ότι η P_1 είναι *λεπτότερη* από την P .

(δ) Έστω P_1, P_2 δύο διαμερίσεις του $[a, b]$. Η **κοινή εκλέπτυνση** των P_1, P_2 είναι η διαμέριση $P = P_1 \cup P_2$. Εύκολα βλέπουμε ότι η P είναι διαμέριση του $[a, b]$ και ότι αν P' είναι μια διαμέριση λεπτότερη τόσο από την P_1 όσο και από την P_2 τότε $P' \supseteq P$ (δηλαδή, η $P = P_1 \cup P_2$ είναι η μικρότερη δυνατή διαμέριση του $[a, b]$ που εκλεπτύνει ταυτόχρονα την P_1 και την P_2).

Θεωρούμε τώρα μια **φραγμένη** συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ και μια διαμέριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ του $[a, b]$. Η P διαμερίζει το $[a, b]$ στα υποδιαστήματα $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_k, x_{k+1}], \dots, [x_{n-1}, x_n]$. Για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ ορίζουμε τους πραγματικούς αριθμούς

$$(4.1.5) \quad m_k(f, P) = m_k = \inf\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}$$

και

$$(4.1.6) \quad M_k(f, P) = M_k = \sup\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}.$$

Όλοι αυτοί οι αριθμοί ορίζονται καλά: η f είναι φραγμένη στο $[a, b]$, άρα είναι φραγμένη σε κάθε υποδιάστημα $[x_k, x_{k+1}]$. Για κάθε k , το σύνολο $\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}$ είναι μη κενό και φραγμένο υποσύνολο του \mathbb{R} , άρα έχει supremum και infimum.

Για κάθε διαμέριση P του $[a, b]$ ορίζουμε τώρα το άνω και το κάτω άθροισμα της f ως προς την P με τον εξής τρόπο:

$$(4.1.7) \quad U(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} M_k(x_{k+1} - x_k)$$

είναι το **άνω άθροισμα** της f ως προς P , και

$$(4.1.8) \quad L(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k(x_{k+1} - x_k)$$

είναι το **κάτω άθροισμα** της f ως προς P .

Από τις (4.1.7) και (4.1.8) βλέπουμε ότι για κάθε διαμέριση P ισχύει

$$(4.1.9) \quad L(f, P) \leq U(f, P)$$

αφού $m_k \leq M_k$ και $x_{k+1} - x_k > 0$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Σε σχέση με το «εμβασμόν» που προσπαθούμε να ορίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε το κάτω άθροισμα $L(f, P)$ σαν μια προσέγγιση από κάτω και το άνω άθροισμα $U(f, P)$ σαν μια προσέγγιση από πάνω.

Θα δείξουμε ότι ισχύει μια πολύ πιο ισχυρή ανισότητα από την (4.1.9):

Πρόταση 4.1.2. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση και έστω P_1, P_2 δύο διαμερίσεις του $[a, b]$. Τότε,

$$(4.1.10) \quad L(f, P_1) \leq U(f, P_2).$$

Παρατηρήστε ότι η (4.1.9) είναι ειδική περίπτωση της (4.1.10): αρκεί να πάρουμε $P = P_1 = P_2$ στην Πρόταση 4.1.2.

Η απόδειξη της Πρότασης 4.1.2 θα βασιστεί στο εξής Λήμμα.

Λήμμα 4.1.3. Έστω $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n = b\}$ και $x_k < y < x_{k+1}$ για κάποιο $k = 0, 1, \dots, n-1$. Αν $P_1 = P \cup \{y\} = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < y < x_{k+1} < \dots < x_n = b\}$, τότε

$$(4.1.11) \quad L(f, P) \leq L(f, P_1) \leq U(f, P_1) \leq U(f, P).$$

Δηλαδή, με την προσθήκη ενός σημείου y στην διαμέριση P , το άνω άθροισμα της f «μικραίνει» ενώ το κάτω άθροισμα της f «μεγαλώνει».

Απόδειξη του Λήμματος 4.1.3. Θέτουμε

$$(4.1.12) \quad m_k^{(1)} = \inf\{f(x) : x_k \leq x \leq y\}$$

και

$$(4.1.13) \quad m_k^{(2)} = \inf\{f(x) : y \leq x \leq x_{k+1}\}.$$

Τότε, $m_k \leq m_k^{(1)}$ και $m_k \leq m_k^{(2)}$ (άσκηση: αν $A \subseteq B$ τότε $\inf B \leq \inf A$). Γράφουμε

$$\begin{aligned} L(f, P_1) &= [m_0(x_1 - x_0) + \dots + m_k^{(1)}(y - x_k) + m_k^{(2)}(x_{k+1} - y) + \dots \\ &\quad + m_{n-1}(x_n - x_{n-1})] \\ &\geq [m_0(x_1 - x_0) + \dots + m_k(y - x_k) + m_k(x_{k+1} - y) + \dots \\ &\quad + m_{n-1}(x_n - x_{n-1})] \\ &= [m_0(x_1 - x_0) + \dots + m_k(x_{k+1} - x_k) + \dots + m_{n-1}(x_n - x_{n-1})] \\ &= L(f, P). \end{aligned}$$

Όμοια δείχνουμε ότι $U(f, P_1) \leq U(f, P)$. □

Απόδειξη της Πρότασης 4.1.2. Για να αποδείξουμε την (4.1.10) θεωρούμε την κοινή εκλέπτυνση $P = P_1 \cup P_2$ των P_1 και P_2 . Η P προκύπτει από την P_1 με διαδοχική προσθήκη πεπερασμένων το πλήθος σημείων. Αν εφαρμόσουμε το Λήμμα 4.1.3 πεπερασμένες το πλήθος φορές, παίρνουμε $L(f, P_1) \leq L(f, P)$.

Όμοια βλέπουμε ότι $U(f, P) \leq U(f, P_2)$. Από την άλλη πλευρά, $L(f, P) \leq U(f, P)$. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, έχουμε

(4.1.14)

$$L(f, P_1) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq U(f, P_2). \quad \square$$

Θεωρούμε τώρα τα υποσύνολα του \mathbb{R}

$$(4.1.15) \quad A(f) = \left\{ L(f, P) : P \text{ διαμέριση του } [a, b] \right\}$$

και

$$(4.1.16) \quad B(f) = \left\{ U(f, Q) : Q \text{ διαμέριση του } [a, b] \right\}.$$

Από την Πρόταση 4.1.2 έχουμε: για κάθε $a \in A(f)$ και κάθε $b \in B(f)$ ισχύει $a \leq b$ (εξηγήστε γιατί). Άρα, $\sup A(f) \leq \inf B(f)$ (άσκηση). Αν λοιπόν ορίσουμε σαν **κάτω ολοκλήρωμα** της f στο $[a, b]$ το

$$(4.1.17) \quad \int_a^b f(x) dx = \sup \left\{ L(f, P) : P \text{ διαμέριση του } [a, b] \right\}$$

και σαν **άνω ολοκλήρωμα** της f στο $[a, b]$ το

$$(4.1.18) \quad \overline{\int_a^b f(x) dx} = \inf \left\{ U(f, Q) : Q \text{ διαμέριση του } [a, b] \right\},$$

έχουμε

$$(4.1.19) \quad \int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}.$$

Ορισμός 4.1.4. Μια φραγμένη συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **Riemann ολοκληρώσιμη** αν

$$(4.1.20) \quad \int_a^b f(x) dx = I = \overline{\int_a^b f(x) dx}.$$

Ο αριθμός I (η κοινή τιμή του κάτω και του άνω ολοκληρώματος της f στο $[a, b]$) λέγεται **ολοκλήρωμα Riemann** της f στο $[a, b]$ και συμβολίζεται με

$$(4.1.21) \quad \int_a^b f(x) dx \quad \text{ή} \quad \int_a^b f.$$

4.2 Το κριτήριο ολοκληρωσιμότητας του Riemann

Ο ορισμός του ολοκληρώματος που δώσαμε στην προηγούμενη παράγραφο είναι δύσχρηστος: δεν είναι εύκολο να τον χρησιμοποιήσει κανείς για να δει αν μια φραγμένη συνάρτηση είναι ολοκληρώσιμη ή όχι. Συνήθως, χρησιμοποιούμε το ακόλουθο κριτήριο ολοκληρωσιμότητας.

Θεώρημα 4.2.1 (κριτήριο του Riemann). Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση. Η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη αν και μόνο αν για κάθε $\varepsilon > 0$ μπορούμε να βρούμε διαμέριση P_ε του $[a, b]$ ώστε

$$(4.2.1) \quad U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη. Δηλαδή,

$$(4.2.2) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx}.$$

Έστω $\varepsilon > 0$. Από τον ορισμό του κάτω ολοκληρώματος ως supremum του $A(f)$ και από τον ε -χαρακτηρισμό του supremum, υπάρχει διαμέριση $P_1 = P_1(\varepsilon)$ του $[a, b]$ ώστε

$$(4.2.3) \quad \int_a^b f(x) dx < L(f, P_1) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ομοίως, από τον ορισμό του άνω ολοκληρώματος, υπάρχει διαμέριση $P_2 = P_2(\varepsilon)$ του $[a, b]$ ώστε

$$(4.2.4) \quad \overline{\int_a^b f(x) dx} > U(f, P_2) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

Θεωρούμε την κοινή εκλέπτυνση $P_\varepsilon = P_1 \cup P_2$. Τότε, από την Πρόταση 4.1.2 έχουμε

$$\begin{aligned} U(f, P_\varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} &\leq U(f, P_2) - \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \overline{\int_a^b f(x) dx} = \int_a^b f(x) dx \\ &< L(f, P_1) + \frac{\varepsilon}{2} \leq L(f, P_\varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

απ' όπου έπεται ότι

$$(4.2.5) \quad 0 \leq U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Αντίστροφα: υποθέτουμε ότι για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει διαμέριση P_ε του $[a, b]$ ώστε

$$(4.2.6) \quad U(f, P_\varepsilon) < L(f, P_\varepsilon) + \varepsilon.$$

Τότε, για κάθε $\varepsilon > 0$ έχουμε

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} \leq U(f, P_\varepsilon) < L(f, P_\varepsilon) + \varepsilon \leq \underline{\int_a^b f(x) dx} + \varepsilon.$$

Επειδή το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, έπεται ότι

$$(4.2.7) \quad \overline{\int_a^b f(x) dx} \leq \underline{\int_a^b f(x) dx},$$

και αφού η αντίστροφη ανισότητα ισχύει πάντα, η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη. \square

Το κριτήριο του Riemann διατυπώνεται ισοδύναμα ως εξής (εξηγήστε γιατί).

Θεώρημα 4.2.2 (κριτήριο του Riemann). Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση. Η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη αν και μόνο αν υπάρχει ακολουθία $\{P_n : n \in \mathbb{N}\}$ διαμερίσεων του $[a, b]$ ώστε

$$(4.2.8) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (U(f, P_n) - L(f, P_n)) = 0.$$

Παραδείγματα. Θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο του Riemann για να εξετάσουμε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι Riemann ολοκληρώσιμες:

(α) Η συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^2$. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$ θεωρούμε τη διαμέριση P_n του $[0, 1]$ σε n ίσα υποδιαστήματα μήκους $1/n$:

$$(4.2.9) \quad P_n = \left\{ 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n} = 1 \right\}.$$

Η συνάρτηση $f(x) = x^2$ είναι αύξουσα στο $[0, 1]$, επομένως

$$\begin{aligned} L(f, P_n) &= f(0) \frac{1}{n} + f\left(\frac{1}{n}\right) \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \left(0 + \frac{1^2}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \dots + \frac{(n-1)^2}{n^2} \right) \\ &= \frac{1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2}{n^3} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} \\ &= \frac{2n^2 - 3n + 1}{6n^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}
 U(f, P_n) &= f\left(\frac{1}{n}\right)\frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right)\frac{1}{n} + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right)\frac{1}{n} \\
 &= \frac{1}{n}\left(\frac{1^2}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \cdots + \frac{n^2}{n^2}\right) \\
 &= \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \\
 &= \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.
 \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$(4.2.10) \quad U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Από το Θεώρημα 4.2.2 συμπεραίνουμε ότι η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη. Μπορούμε μάλιστα να βρούμε την τιμή του ολοκληρώματος. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} &= L(f, P_n) \\
 &\leq \int_0^1 x^2 dx = \int_0^1 x^2 dx = \overline{\int_0^1 x^2 dx} \\
 &\leq U(f, P_n) \\
 &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.
 \end{aligned}$$

Αφού

$$(4.2.11) \quad \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \rightarrow \frac{1}{3} \quad \text{και} \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \rightarrow \frac{1}{3},$$

έπεται ότι

$$(4.2.12) \quad \frac{1}{3} \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{3}.$$

Δηλαδή,

$$(4.2.13) \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

(β) Η συνάρτηση $u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $u(x) = \sqrt{x}$. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακολουθία διαμερίσεων του προηγούμενου παραδείγματος για να δείξετε ότι ικανοποιείται το κριτήριο του Riemann.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική ακολουθία διαμερίσεων. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$ θεωρούμε τη διαμέριση

$$(4.2.14) \quad P_n = \left\{ 0 < \frac{1}{n^2} < \frac{2^2}{n^2} < \cdots < \frac{(n-1)^2}{n^2} < \frac{n^2}{n^2} = 1 \right\}.$$

Η u είναι αύξουσα στο $[0, 1]$, επομένως

$$(4.2.15) \quad L(u, P_n) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} \left(\frac{(k+1)^2}{n^2} - \frac{k^2}{n^2} \right)$$

και

$$(4.2.16) \quad U(u, P_n) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k+1}{n} \left(\frac{(k+1)^2}{n^2} - \frac{k^2}{n^2} \right).$$

Έπεται ότι

$$\begin{aligned} U(u, P_n) - L(u, P_n) &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} \right) \left(\frac{(k+1)^2}{n^2} - \frac{k^2}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{(k+1)^2}{n^2} - \frac{k^2}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Από το Θεώρημα 4.2.2 συμπεραίνουμε ότι η u είναι Riemann ολοκληρώσιμη. Αφήνουμε σαν άσκηση να δείξετε ότι

$$(4.2.17) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} L(u, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(u, P_n) = \frac{2}{3}.$$

Η συγκεκριμένη επιλογή διαμερίσεων που κάναμε έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείτε εύκολα να γράψετε τα $L(u, P_n)$ και $U(u, P_n)$ σε κλειστή μορφή. Από την (4.2.17) έπεται ότι

$$(4.2.18) \quad \int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3}.$$

(γ) Η συνάρτηση του Dirichlet $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ 0 & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

δεν είναι Riemann ολοκληρώσιμη. Έστω $P = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n = 1\}$ τυχούσα διαμέριση του $[0, 1]$. Υπολογίζουμε το κάτω και το άνω άθροισμα της g ως προς την P . Για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ υπάρχουν ρητός q_k και άρρητος α_k στο (x_k, x_{k+1}) . Αφού $g(q_k) = 1$, $g(\alpha_k) = 0$ και $0 \leq g(x) \leq 1$ στο $[x_k, x_{k+1}]$, συμπεραίνουμε ότι $m_k = 0$ και $M_k = 1$. Συνεπώς,

$$(4.2.19) \quad L(g, P) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k (x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} 0 \cdot (x_{k+1} - x_k) = 0$$

και

$$(4.2.20) \quad U(g, P) = \sum_{k=0}^{n-1} M_k(x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} 1 \cdot (x_{k+1} - x_k) = 1.$$

Αφού η P ήταν τυχούσα διαμέριση του $[0, 1]$, παίρνουμε

$$(4.2.21) \quad \int_0^1 g(x) dx = 0 \quad \text{και} \quad \int_0^1 g(x) dx = 1.$$

Άρα, η g δεν είναι Riemann ολοκληρώσιμη.

(δ) Η συνάρτηση $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ 0 & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

δεν είναι Riemann ολοκληρώσιμη. Έστω $P = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n = 1\}$ τυχούσα διαμέριση του $[0, 1]$. Για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ υπάρχει άρρητος α_k στο (x_k, x_{k+1}) . Αφού $h(\alpha_k) = 0$ και $0 \leq h(x) \leq 1$ στο $[x_k, x_{k+1}]$, συμπεραίνουμε ότι $m_k = 0$. Συνεπώς,

$$(4.2.22) \quad L(h, P) = 0.$$

Επίσης, υπάρχει ρητός $q_k > (x_k + x_{k+1})/2$ στο (x_k, x_{k+1}) , άρα $M_k \geq h(q_k) > (x_k + x_{k+1})/2$. Έπεται ότι

$$\begin{aligned} U(h, P) &> \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_k + x_{k+1}}{2} (x_{k+1} - x_k) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1}^2 - x_k^2) \\ &= \frac{x_n^2 - x_0^2}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Αφού

$$(4.2.23) \quad U(h, P) - L(h, P) > \frac{1}{2}$$

για κάθε διαμέριση P του $[0, 1]$, το κριτήριο του Riemann δεν ικανοποιείται (πάρτε $\varepsilon = 1/3$). Άρα, η h δεν είναι Riemann ολοκληρώσιμη.

(ε) Η συνάρτηση $w : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$w(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν } x \notin \mathbb{Q} \text{ ή } x = 0 \\ \frac{1}{q} & \text{αν } x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}, \text{ MK}\Delta(p, q) = 1 \end{cases}$$

είναι Riemann ολοκληρώσιμη. Εύκολα ελέγχουμε ότι $L(w, P) = 0$ για κάθε διαμέριση P του $[0, 1]$.

Έστω $\varepsilon > 0$. Παρατηρούμε ότι το σύνολο $A = \{x \in [0, 1] : w(x) \geq \varepsilon\}$ είναι πεπερασμένο. [Πράγματι, αν $w(x) \geq \varepsilon$ τότε $x = p/q$ και $w(x) = 1/q \geq \varepsilon$ δηλαδή $q \leq 1/\varepsilon$. Οι ρητοί του $[0, 1]$ που γράφονται σαν ανάγωγα κλάσματα με παρονομαστή το πολύ ίσο με $[1/\varepsilon]$ είναι πεπερασμένοι το πλήθος (ένα άνω φράγμα για το πλήθος τους είναι ο αριθμός $1 + 2 + \dots + [1/\varepsilon]$ - εξηγήστε γιατί)].

Έστω $z_1 < z_2 < \dots < z_N$ μία αρίθμηση των στοιχείων του A . Μπορούμε να βρούμε ξένα υποδιαστήματα $[a_i, b_i]$ του $[0, 1]$ που έχουν μήκη $b_i - a_i < \varepsilon/N$ και ικανοποιούν τα εξής: $a_1 > 0$, $a_i < z_i < b_i$ αν $i < N$ και $a_N < z_N \leq b_N$ (παρατηρήστε ότι αν $\varepsilon \leq 1$ τότε $z_N = 1$ οπότε πρέπει να επιλέξουμε $b_N = 1$). Αν θεωρήσουμε τη διαμέριση

$$(4.2.24) \quad P_\varepsilon = \{0 < a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots < a_N < b_N \leq 1\},$$

έχουμε

$$\begin{aligned} U(w, P_\varepsilon) &\leq \varepsilon \cdot (a_1 - 0) + 1 \cdot (b_1 - a_1) + \varepsilon \cdot (a_2 - b_1) + \dots + 1 \cdot (b_{N-1} - a_{N-1}) \\ &\quad + \varepsilon \cdot (a_N - b_{N-1}) + 1 \cdot (b_N - a_N) + \varepsilon \cdot (1 - b_N) \\ &\leq \varepsilon \cdot \left(a_1 + (a_2 - b_1) + \dots + (a_N - b_{N-1}) + (1 - b_N) \right) \\ &\quad + \sum_{i=1}^N (b_i - a_i) \\ &< 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Για το τυχόν $\varepsilon > 0$ βρήκαμε διαμέριση P_ε του $[0, 1]$ με την ιδιότητα

$$(4.2.25) \quad U(w, P_\varepsilon) - L(w, P_\varepsilon) < 2\varepsilon.$$

Από το Θεώρημα 4.2.1, η w είναι Riemann ολοκληρώσιμη.

4.3 Δύο κλάσεις Riemann ολοκληρώσιμων συναρτήσεων

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Riemann (Θεώρημα 4.2.1) θα δείξουμε ότι οι μονότονες και οι συνεχείς συναρτήσεις $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι Riemann ολοκληρώσιμες.

Θεώρημα 4.3.1. *Κάθε μονότονη συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι Riemann ολοκληρώσιμη.*

Απόδειξη. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι η f είναι αύξουσα. Η f είναι προφανώς φραγμένη: για κάθε $x \in [a, b]$ έχουμε

$$(4.3.1) \quad f(a) \leq f(x) \leq f(b).$$

Άρα, έχει νόημα να εξετάσουμε την ύπαρξη ολοκληρώματος για την f .

Έστω $\varepsilon > 0$. Θα βρούμε $n \in \mathbb{N}$ αρκετά μεγάλο ώστε για τη διαμέριση

$$(4.3.2) \quad P_n = \left\{ a, a + \frac{b-a}{n}, a + \frac{2(b-a)}{n}, \dots, a + \frac{n(b-a)}{n} = b \right\}$$

του $[a, b]$ σε n ίσα υποδιαστήματα να ισχύει

$$(4.3.3) \quad U(f, P_n) - L(f, P_n) < \varepsilon.$$

Θέτουμε

$$(4.3.4) \quad x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Τότε, αφού η f είναι αύξουσα έχουμε

$$\begin{aligned} U(f, P_n) &= \sum_{k=0}^{n-1} M_k(x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1}) \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{b-a}{n} \cdot (f(x_1) + \dots + f(x_n)), \end{aligned}$$

ενώ

$$\begin{aligned} L(f, P_n) &= \sum_{k=0}^{n-1} m_k(x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{b-a}{n} \cdot (f(x_0) + \dots + f(x_{n-1})). \end{aligned}$$

Άρα,

$$(4.3.5) \quad U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{[f(x_n) - f(x_0)](b-a)}{n} = \frac{[f(b) - f(a)](b-a)}{n},$$

το οποίο γίνεται μικρότερο από το $\varepsilon > 0$ που μας δόθηκε, αρκεί το n να είναι αρκετά μεγάλο. Από το Θεώρημα 4.2.1, η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη. \square

Θεώρημα 4.3.2. Κάθε συνεχής συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι Riemann ολοκληρώσιμη.

Απόδειξη. Έστω $\varepsilon > 0$. Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, b]$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε $\delta > 0$ με την εξής ιδιότητα:

$$\text{Αν } x, y \in [a, b] \text{ και } |x - y| < \delta, \text{ τότε } |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Μπορούμε επίσης να βρούμε $n \in \mathbb{N}$ ώστε

$$(4.3.6) \quad \frac{b-a}{n} < \delta.$$

Χωρίζουμε το $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα του ίδιου μήκους $\frac{b-a}{n}$. Θεωρούμε δηλαδή τη διαμέριση

$$(4.3.7) \quad P_n = \left\{ a, a + \frac{b-a}{n}, a + \frac{2(b-a)}{n}, \dots, a + \frac{n(b-a)}{n} = b \right\}.$$

Ορίζουμε

$$(4.3.8) \quad x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Έστω $k = 0, 1, \dots, n-1$. Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[x_k, x_{k+1}]$, άρα παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή $y'_k, y''_k \in [x_k, x_{k+1}]$ ώστε

$$(4.3.9) \quad M_k = f(y'_k) \quad \text{και} \quad m_k = f(y''_k).$$

Επιπλέον, το μήκος του $[x_k, x_{k+1}]$ είναι ίσο με $\frac{b-a}{n} < \delta$, άρα

$$(4.3.10) \quad |y'_k - y''_k| < \delta.$$

Από την επιλογή του δ παίρνουμε

$$(4.3.11) \quad M_k - m_k = f(y'_k) - f(y''_k) = |f(y'_k) - f(y''_k)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Έπεται ότι

$$\begin{aligned} U(f, P_n) - L(f, P_n) &= \sum_{k=0}^{n-1} (M_k - m_k)(x_{k+1} - x_k) \\ &< \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\varepsilon}{b-a} (x_{k+1} - x_k) \\ &= \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Από το Θεώρημα 4.2.1, η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη. \square

4.4 Ιδιότητες του ολοκληρώματος Riemann

Σε αυτήν την παράγραφο αποδεικνύουμε αυστηρά μερικές από τις πιο βασικές ιδιότητες του ολοκληρώματος Riemann. Οι αποδείξεις των υπολοίπων είναι μια καλή άσκηση που θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις διαμερίσεις, τα άνω και κάτω αθροίσματα κλπ.

Θεώρημα 4.4.1. Αν $f(x) = c$ για κάθε $x \in [a, b]$, τότε

$$(4.4.1) \quad \int_a^b f(x)dx = c(b-a).$$

Απόδειξη: Έστω $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ μια διαμέριση του $[a, b]$. Για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ έχουμε $m_k = M_k = c$. Άρα,

$$(4.4.2) \quad L(f, P) = U(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} c(x_{k+1} - x_k) = c(b-a).$$

Έπεται ότι

$$(4.4.3) \quad \int_a^b f(x)dx = c(b-a) = \overline{\int_a^b f(x)dx}.$$

Άρα,

$$(4.4.4) \quad \int_a^b f(x)dx = c(b-a). \quad \square$$

Θεώρημα 4.4.2. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Τότε, η $f + g$ είναι ολοκληρώσιμη και

$$(4.4.5) \quad \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

Απόδειξη. Έστω $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ διαμέριση του $[a, b]$. Για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ ορίζουμε

$$\begin{aligned} m_k &= \inf\{(f+g)(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\} \\ M_k &= \sup\{(f+g)(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\} \\ m'_k &= \inf\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\} \\ M'_k &= \sup\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\} \\ m''_k &= \inf\{g(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\} \\ M''_k &= \sup\{g(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}. \end{aligned}$$

Για κάθε $x \in [x_k, x_{k+1}]$ έχουμε $m'_k + m''_k \leq f(x) + g(x)$. Άρα,

$$(4.4.6) \quad m'_k + m''_k \leq m_k.$$

Ομοίως, για κάθε $x \in [x_k, x_{k+1}]$ έχουμε $M'_k + M''_k \geq f(x) + g(x)$. Άρα,

$$(4.4.7) \quad M'_k + M''_k \geq M_k.$$

Έπεται ότι

$$(4.4.8) \quad L(f, P) + L(g, P) \leq L(f+g, P) \leq U(f+g, P) \leq U(f, P) + U(g, P).$$

Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχουν διαμερίσεις P_1, P_2 του $[a, b]$ ώστε

$$(4.4.9) \quad U(f, P_1) - \frac{\varepsilon}{2} < \int_a^b f(x)dx < L(f, P_1) + \frac{\varepsilon}{2}$$

και

$$(4.4.10) \quad U(g, P_2) - \frac{\varepsilon}{2} < \int_a^b g(x)dx < L(g, P_2) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Αν θεωρήσουμε την κοινή τους εκλέπτυνση $P = P_1 \cup P_2$ έχουμε

$$\begin{aligned} U(f, P) + U(g, P) - \varepsilon &\leq U(f, P_1) + U(g, P_2) - \varepsilon \\ &< \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \\ &< L(f, P_1) + L(g, P_2) + \varepsilon \\ &\leq L(f, P) + L(g, P) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Συνδυάζοντας με την (4.4.8) βλέπουμε ότι

$$\begin{aligned} \overline{\int_a^b (f+g)(x)dx} - \varepsilon &\leq U(f+g, P) - \varepsilon \leq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \\ &\leq L(f+g, P) + \varepsilon \leq \underline{\int_a^b (f+g)(x)dx} + \varepsilon. \end{aligned}$$

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν,

$$(4.4.11) \quad \overline{\int_a^b (f+g)(x)dx} \leq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \leq \underline{\int_a^b (f+g)(x)dx}.$$

Όμως,

$$(4.4.12) \quad \underline{\int_a^b (f+g)(x)dx} \leq \overline{\int_a^b (f+g)(x)dx}.$$

Άρα,

$$(4.4.13) \quad \overline{\int_a^b (f+g)(x)dx} = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \underline{\int_a^b (f+g)(x)dx}.$$

Έπεται το Θεώρημα. □

Θεώρημα 4.4.3. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη και έστω $t \in \mathbb{R}$. Τότε, η tf είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ και

$$(4.4.14) \quad \int_a^b (tf)(x)dx = t \int_a^b f(x)dx.$$

Απόδειξη. Ας υποθέσουμε πρώτα ότι $t > 0$. Έστω $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ διαμέριση του $[a, b]$. Αν για $k = 0, 1, \dots, n-1$ ορίσουμε

$$(4.4.15) \quad m_k = \inf\{(tf)(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}, \quad M_k = \sup\{(tf)(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}$$

και

$$(4.4.16) \quad m'_k = \inf\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\}, \quad M'_k = \sup\{f(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\},$$

είναι φανερό ότι

$$(4.4.17) \quad m_k = tm'_k \quad \text{και} \quad M_k = tM'_k.$$

Άρα,

$$(4.4.18) \quad L(tf, P) = tL(f, P) \quad \text{και} \quad U(tf, P) = tU(f, P).$$

Έπεται ότι

$$(4.4.19) \quad \int_a^b (tf)(x)dx = t \int_a^b f(x)dx \quad \text{και} \quad \overline{\int_a^b (tf)(x)dx} = t \overline{\int_a^b f(x)dx}.$$

Αφού η f είναι ολοκληρώσιμη, έχουμε

$$(4.4.20) \quad \int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx}.$$

Έπεται ότι η tf είναι Riemann ολοκληρώσιμη, και

$$(4.4.21) \quad \int_a^b (tf)(x)dx = t \int_a^b f(x)dx.$$

Αν $t < 0$, η μόνη αλλαγή στο προηγούμενο επιχειρήμα είναι ότι τώρα $m_k = tM'_k$ και $M_k = tm'_k$. Συμπληρώστε την απόδειξη μόνοι σας.

Τέλος, αν $t = 0$ έχουμε $tf \equiv 0$. Άρα,

$$(4.4.22) \quad \int_a^b tf = 0 = 0 \cdot \int_a^b f. \quad \square$$

Από τα Θεωρήματα 4.4.2 και 4.4.3 προκύπτει άμεσα η «γραμμικότητα του ολοκληρώματος».

Θεώρημα 4.4.4 (γραμμικότητα του ολοκληρώματος). Αν $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο ολοκληρώσιμες συναρτήσεις και $t, s \in \mathbb{R}$, τότε η $tf + sg$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ και

$$(4.4.23) \quad \int_a^b (tf + sg)(x)dx = t \int_a^b f(x)dx + s \int_a^b g(x)dx. \quad \square$$

Θεώρημα 4.4.5. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση και έστω $c \in (a, b)$. Η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ αν και μόνο αν είναι ολοκληρώσιμη στα $[a, c]$ και $[c, b]$. Τότε, ισχύει

$$(4.4.24) \quad \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στα $[a, c]$ και $[c, b]$. Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχουν διαμερίσεις P_1 του $[a, c]$ και P_2 του $[c, b]$ ώστε

$$(4.4.25) \quad L(f, P_1) \leq \int_a^c f(x)dx \leq U(f, P_1) \quad \text{και} \quad U(f, P_1) - L(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$

και

$$(4.4.26) \quad L(f, P_2) \leq \int_c^b f(x)dx \leq U(f, P_2) \quad \text{και} \quad U(f, P_2) - L(f, P_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Το σύνολο $P_\varepsilon = P_1 \cup P_2$ είναι διαμέριση του $[a, b]$ και ισχύουν οι

$$(4.4.27) \quad L(f, P_\varepsilon) = L(f, P_1) + L(f, P_2) \quad \text{και} \quad U(f, P_\varepsilon) = U(f, P_1) + U(f, P_2).$$

Από τις παραπάνω σχέσεις παίρνουμε

$$\begin{aligned} U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) &= (U(f, P_1) - L(f, P_1)) + (U(f, P_2) - L(f, P_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ (κριτήριο του Riemann). Επιπλέον, για την P_ε έχουμε

$$(4.4.28) \quad L(f, P_\varepsilon) \leq \int_a^b f(x)dx \leq U(f, P_\varepsilon)$$

και, από τις (4.4.25), (4.4.26) και (4.4.27),

$$(4.4.29) \quad L(f, P_\varepsilon) \leq \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \leq U(f, P_\varepsilon).$$

Επομένως,

$$(4.4.30) \quad \left| \int_a^b f(x)dx - \left(\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \right) \right| \leq U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon,$$

και αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν,

$$(4.4.31) \quad \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Αντίστροφα: υποθέτουμε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ και θεωρούμε $\varepsilon > 0$. Υπάρχει διαμέριση P του $[a, b]$ ώστε

$$(4.4.32) \quad U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Αν $c \notin P$ θέτουμε $P' = P \cup \{c\}$, οπότε πάλι έχουμε

$$(4.4.33) \quad U(f, P') - L(f, P') \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι $c \in P$. Ορίζουμε $P_1 = P \cap [a, c]$ και $P_2 = P \cap [c, b]$. Οι P_1, P_2 είναι διαμερίσεις των $[a, c]$ και $[c, b]$ αντίστοιχα, και

$$(4.4.34) \quad L(f, P) = L(f, P_1) + L(f, P_2), \quad U(f, P) = U(f, P_1) + U(f, P_2).$$

Αφού

$$(4.4.35) \quad (U(f, P_1) - L(f, P_1)) + (U(f, P_2) - L(f, P_2)) = U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,$$

έπεται ότι

$$(4.4.36) \quad U(f, P_1) - L(f, P_1) < \varepsilon \quad \text{και} \quad U(f, P_2) - L(f, P_2) < \varepsilon.$$

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, το κριτήριο του Riemann δείχνει ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στα $[a, c]$ και $[c, b]$. Τώρα, από το πρώτο μέρος της απόδειξης παίρνουμε την ισότητα

$$(4.4.37) \quad \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \quad \square$$

Θεώρημα 4.4.6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι $m \leq f(x) \leq M$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε,

$$(4.4.38) \quad m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

Σημείωση. Ο αριθμός

$$(4.4.39) \quad \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

είναι η μέση τιμή της f στο $[a, b]$.

Απόδειξη. Αρκεί να διαπιστώσετε ότι για κάθε διαμέριση P του $[a, b]$ ισχύει

$$(4.4.40) \quad m(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b-a)$$

(το οποίο είναι πολύ εύκολο). □

Πόρισμα 4.4.7. (α) Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε,

$$(4.4.41) \quad \int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

(β) Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Υποθέτουμε ότι $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε,

$$(4.4.42) \quad \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx.$$

Απόδειξη. (α) Εφαρμόζουμε το Θεώρημα 4.4.6: μπορούμε να πάρουμε $m = 0$.

(β) Η $f - g$ είναι ολοκληρώσιμη συνάρτηση και $(f - g)(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Εφαρμόζουμε το (α) για την $f - g$ και χρησιμοποιούμε τη γραμμικότητα του ολοκληρώματος. \square

Θεώρημα 4.4.8. Έστω $f : [a, b] \rightarrow [m, M]$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση και έστω $\phi : [m, M] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Τότε, η $\phi \circ f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ολοκληρώσιμη.

Απόδειξη. Έστω $\varepsilon > 0$. Θα βρούμε διαμέριση P του $[a, b]$ με την ιδιότητα $U(\phi \circ f, P) - L(\phi \circ f, P) < \varepsilon$. Το ζητούμενο έπεται από το κριτήριο του Riemann.

Η ϕ είναι συνεχής στο $[m, M]$, άρα είναι φραγμένη: υπάρχει $A > 0$ ώστε $|\phi(\xi)| \leq A$ για κάθε $\xi \in [m, M]$. Επίσης, η ϕ είναι ομοιόμορφα συνεχής: αν θέσουμε $\varepsilon_1 = \varepsilon / (2A + b - a) > 0$, υπάρχει $0 < \delta < \varepsilon_1$ ώστε, για κάθε $\xi, \eta \in [m, M]$ με $|\xi - \eta| < \delta$ ισχύει $|\phi(\xi) - \phi(\eta)| < \varepsilon_1$.

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του Riemann για την ολοκληρώσιμη συνάρτηση f , βρίσκουμε διαμεριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n = b\}$ ώστε

$$(4.4.43) \quad U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} (M_k(f) - m_k(f))(x_{k+1} - x_k) < \delta^2.$$

Ορίζουμε

$$\begin{aligned} I &= \{0 \leq k \leq n-1 : M_k(f) - m_k(f) < \delta\} \\ J &= \{0 \leq k \leq n-1 : M_k(f) - m_k(f) \geq \delta\}. \end{aligned}$$

Παρατηρούμε τα εξής:

(i) Αν $k \in I$, τότε για κάθε $x, x' \in [x_k, x_{k+1}]$ έχουμε $|f(x) - f(x')| \leq M_k(f) - m_k(f) < \delta$. Παίρνοντας $\xi = f(x)$ και $\eta = f(x')$, έχουμε $\xi, \eta \in [m, M]$ και $|\xi - \eta| < \delta$. Άρα,

$$|(\phi \circ f)(x) - (\phi \circ f)(x')| = |\phi(\xi) - \phi(\eta)| < \varepsilon_1.$$

Αφού τα x, x' ήταν τυχόντα στο $[x_k, x_{k+1}]$, συμπεραίνουμε ότι $M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f) \leq \varepsilon_1$ (εξηγήστε γιατί). Έπεται ότι

$$(4.4.44) \quad \sum_{k \in I} (M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f))(x_{k+1} - x_k) \leq \varepsilon \sum_{k \in I} (x_{k+1} - x_k) \leq (b-a)\varepsilon_1.$$

(ii) Για το J έχουμε, από την (4.4.43),

$$(4.4.45) \quad \delta \sum_{k \in J} (x_{k+1} - x_k) \leq \sum_{k \in J} (M_k(f) - m_k(f))(x_{k+1} - x_k) < \delta^2,$$

άρα

$$(4.4.46) \quad \sum_{k \in J} (x_{k+1} - x_k) < \delta < \varepsilon_1.$$

Επίσης,

$$(4.4.47) \quad |(\phi \circ f)(x) - (\phi \circ f)(x')| \leq |(\phi \circ f)(x)| + |(\phi \circ f)(x')| \leq 2A$$

για κάθε $x, x' \in [x_k, x_{k+1}]$, άρα $M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f) \leq 2A$ για κάθε $k \in J$. Έπεται ότι

$$(4.4.48) \quad \sum_{k \in J} (M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f))(x_{k+1} - x_k) \leq 2A \sum_{k \in J} (x_{k+1} - x_k) < 2A\varepsilon_1.$$

Από τις (4.4.44) και (4.4.48) συμπεραίνουμε ότι

$$\begin{aligned} U(\phi \circ f, P) - L(\phi \circ f, P) &= \sum_{k=0}^{n-1} (M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f))(x_{k+1} - x_k) \\ &= \sum_{k \in I} (M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f))(x_{k+1} - x_k) \\ &\quad + \sum_{k \in J} (M_k(\phi \circ f) - m_k(\phi \circ f))(x_{k+1} - x_k) \\ &< (b-a)\varepsilon_1 + 2A\varepsilon_1 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη. \square

Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα 4.4.8 μπορούμε να ελέγξουμε εύκολα την ολοκληρωσιμότητα διαφορών συναρτήσεων που προκύπτουν από την σύνθεση μιας ολοκληρώσιμης συνάρτησης f με κατάλληλες συνεχείς συναρτήσεις.

Θεώρημα 4.4.9. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Τότε,

(α) η $|f|$ είναι ολοκληρώσιμη και

$$(4.4.49) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

(β) η f^2 είναι ολοκληρώσιμη.

(γ) η fg είναι ολοκληρώσιμη.

Απόδειξη. Τα (α) και (β) είναι άμεσες συνέπειες του Θεωρήματος 4.4.8. Για το (γ) γράψτε

$$(4.4.50) \quad fg = \frac{(f+g)^2 - (f-g)^2}{4}$$

και χρησιμοποιήστε το (β) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι $f+g$, $f-g$ είναι ολοκληρώσιμες. \square

Μια σύμβαση. Ως τώρα ορίσαμε το $\int_a^b f(x)dx$ μόνο στην περίπτωση $a < b$ (δουλεύαμε στο κλειστό διάστημα $[a, b]$). Για πρακτικούς λόγους επεκτείνουμε τον ορισμό και στην περίπτωση $a \geq b$ ως εξής:

(α) αν $a = b$, θέτουμε $\int_a^a f = 0$ (για κάθε f).

(β) αν $a > b$ και η $f : [b, a] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ολοκληρώσιμη, ορίζουμε

$$(4.4.51) \quad \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$$

4.5 Ο ορισμός του Riemann*

Ο ορισμός που δώσαμε για την ολοκληρωσιμότητα μιας φραγμένης συνάρτησης $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ οφείλεται στον Darboux. Ο πρώτος αυστηρός ορισμός της ολοκληρωσιμότητας δόθηκε από τον Riemann και είναι ο εξής:

Ορισμός 4.5.1. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση. Λέμε ότι η f είναι **ολοκληρώσιμη** στο $[a, b]$ αν υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός $I(f)$ με την εξής ιδιότητα:

Για κάθε $\varepsilon > 0$ μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ ώστε: αν $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ είναι διαμέριση του $[a, b]$ με πλάτος $\|P\| < \delta$ και αν $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ είναι τυχούσα επιλογή σημείων από τα υποδιαστήματα που ορίζει η P , τότε

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x_{k+1} - x_k) - I(f) \right| < \varepsilon.$$

Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι ο $I(f)$ είναι το (R) -ολοκλήρωμα της f στο $[a, b]$.

Συμβολισμός. Συνήθως γράφουμε Ξ για την επιλογή σημείων $\{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}\}$ και $\sum(f, P, \Xi)$ για το άθροισμα

$$(4.5.1) \quad \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x_{k+1} - x_k).$$

Παρατηρήστε ότι τώρα το Ξ «υπεισέρχεται» στο συμβολισμό $\sum(f, P, \Xi)$ αφού για την ίδια διαμέριση P μπορούμε να έχουμε πολλές διαφορετικές επιλογές $\Xi = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}\}$ με $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$.

Η βασική ιδέα πίσω από τον ορισμό είναι ότι

$$(4.5.2) \quad \int_a^b f(x)dx = \lim \sum(f, P, \Xi)$$

όταν το πλάτος της P τείνει στο μηδέν και τα ξ_k επιλέγονται αυθαίρετα στα υποδιαστήματα που ορίζει η P . Επειδή δεν έχουμε συναντήσει τέτοιου είδους «όρια» ως τώρα, καταφεύγουμε στον «εψιλοντικό ορισμό».

Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι η απόδειξη της ισοδυναμίας των δύο ορισμών ολοκληρωσιμότητας:

Θεώρημα 4.5.2. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση. Η f είναι ολοκληρώσιμη κατά Darboux αν και μόνο αν είναι ολοκληρώσιμη κατά Riemann.

Απόδειξη. Υποθέτουμε πρώτα ότι η f είναι ολοκληρώσιμη κατά Riemann. Γράφουμε $I(f)$ για το ολοκλήρωμα της f με τον ορισμό του Riemann.

Έστω $\varepsilon > 0$. Μπορούμε να βρούμε μια διαμέριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ (με αρκετά μικρό πλάτος) ώστε για κάθε επιλογή σημείων $\Xi = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}\}$ με $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$ να ισχύει

$$(4.5.3) \quad \left| \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x_{k+1} - x_k) - I(f) \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ μπορούμε να βρούμε $\xi'_k, \xi''_k \in [x_k, x_{k+1}]$ ώστε

$$(4.5.4) \quad m_k > f(\xi'_k) - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \quad \text{και} \quad M_k < f(\xi''_k) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Άρα,

$$(4.5.5) \quad L(f, P) > \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi'_k)(x_{k+1} - x_k) - \frac{\varepsilon}{4} > I(f) - \frac{\varepsilon}{2}$$

και

$$(4.5.6) \quad U(f, P) < \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi''_k)(x_{k+1} - x_k) + \frac{\varepsilon}{4} < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Έπεται ότι

$$(4.5.7) \quad U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,$$

δηλαδή η f είναι ολοκληρώσιμη κατά Darboux. Επίσης,

$$(4.5.8) \quad I(f) - \frac{\varepsilon}{2} < \int_a^b f(x)dx \leq \overline{\int_a^b f(x)dx} < I(f) + \frac{\varepsilon}{2},$$

και αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν,

$$(4.5.9) \quad \int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx} = I(f).$$

Δηλαδή,

$$(4.5.10) \quad \int_a^b f(x)dx = I(f).$$

Αντίστροφα: υποθέτουμε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη με τον ορισμό του Darboux. Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει διαμέριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ του $[a, b]$ ώστε

$$(4.5.11) \quad U(f, P) - L(f, P) < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Η f είναι φραγμένη, δηλαδή υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M$ για κάθε $x \in [a, b]$. Επιλέγουμε

$$(4.5.12) \quad \delta = \frac{\varepsilon}{6nM} > 0.$$

Έστω P' διαμέριση του $[a, b]$ με πλάτος $\|P'\| < \delta$, η οποία είναι και εκλέπτυνση της P . Τότε, για κάθε επιλογή Ξ σημείων από τα υποδιαστήματα που ορίζει η P' έχουμε

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx - \frac{\varepsilon}{4} &< L(f, P) \leq L(f, P') \leq \sum(f, P', \Xi) \\ &\leq U(f, P') \leq U(f, P) < \int_a^b f(x)dx + \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

Δηλαδή,

$$(4.5.13) \quad \left| \sum(f, P', \Xi) - \int_a^b f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ζητάμε να δείξουμε το ίδιο πράγμα για τυχούσα διαμέριση P_1 με πλάτος μικρότερο από δ (η δυσκολία είναι ότι μια τέτοια διαμέριση δεν έχει κανένα λόγο να είναι εκλέπτυνση της P).

Έστω $P_1 = \{a = y_0 < y_1 < \dots < y_m = b\}$ μια τέτοια διαμέριση του $[a, b]$. Θα «προσθέσουμε» στην P_1 ένα-ένα όλα τα σημεία x_k της P τα οποία δεν ανήκουν στην P_1 (αυτά είναι το πολύ $n - 1$).

Ας πούμε ότι ένα τέτοιο x_k βρίσκεται ανάμεσα στα διαδοχικά σημεία $y_l < y_{l+1}$ της P_1 . Θεωρούμε την $P_2 = P_1 \cup \{x_k\}$ και τυχούσα επιλογή $\Xi^{(1)} = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{m-1}\}$ με $\xi_l \in [y_l, y_{l+1}]$, $l = 0, 1, \dots, m-1$. Επιλέγουμε δύο σημεία $\xi'_l \in [y_l, x_k]$ και $\xi''_l \in [x_k, y_{l+1}]$ και θεωρούμε την επιλογή σημείων $\Xi^{(2)} = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{l-1}, \xi'_l, \xi''_l, \dots, \xi_{m-1}\}$ που αντιστοιχεί στην P_2 . Έχουμε

$$\begin{aligned} \left| \sum(f, P_1, \Xi^{(1)}) - \sum(f, P_2, \Xi^{(2)}) \right| &= |f(\xi_l)(y_{l+1} - y_l) - f(\xi'_l)(x_k - y_l) \\ &\quad - f(\xi''_l)(y_{l+1} - x_k)| \\ &\leq 3M \max_l |y_{l+1} - y_l| < 3M\delta \\ &= \frac{\varepsilon}{2n}. \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τη δοσμένη $(P_1, \Xi^{(1)})$ με όλο και λεπτότερες διαμερίσεις $(P_k, \Xi^{(k)})$ που προκύπτουν με την προσθήκη σημείων της P , μετά από n το πολύ βήματα φτάνουμε σε μια διαμέριση P_0 και μια επιλογή σημείων $\Xi^{(0)}$ με τις εξής ιδιότητες:

(α) η P_0 είναι κοινή εκλέπτυνση των P και P_1 , και έχει πλάτος μικρότερο από δ .

(β) αφού η P_0 είναι εκλέπτυνση της P , όπως στην (4.5.13) έχουμε

$$(4.5.14) \quad \left| \sum(f, P_0, \Xi^{(0)}) - \int_a^b f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(γ) αφού κάναμε το πολύ n βήματα για να φτάσουμε στην P_0 και αφού σε κάθε βήμα τα αθροίσματα απείχαν το πολύ $\frac{\varepsilon}{2n}$, έχουμε

$$\left| \sum(f, P_1, \Xi^{(1)}) - \sum(f, P_0, \Xi^{(0)}) \right| < n \frac{\varepsilon}{2n} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Δηλαδή, για την τυχούσα διαμέριση P_1 πλάτους $< \delta$ και για την τυχούσα επιλογή $\Xi^{(1)}$ σημείων από τα υποδιαστήματα της P_1 , έχουμε

$$\begin{aligned} \left| \sum(f, P_1, \Xi^{(1)}) - \int_a^b f(x)dx \right| &< \left| \sum(f, P_1, \Xi^{(1)}) - \sum(f, P_0, \Xi^{(0)}) \right| \\ &\quad + \left| \sum(f, P_0, \Xi^{(0)}) - \int_a^b f(x)dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Έπεται ότι η f είναι ολοκληρώσιμη με τον ορισμό του Riemann, καθώς και ότι οι $I(f)$ και $\int_a^b f(x)dx$ είναι ίσοι. \square

4.6 Ασκήσεις

A. Ερωτήσεις κατανόησης

Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

1. Αν η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη, τότε η f είναι φραγμένη.
2. Αν η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη, τότε παίρνει μέγιστη τιμή.
3. Αν η f είναι φραγμένη, τότε είναι Riemann ολοκληρώσιμη.
4. Αν η $|f|$ είναι Riemann ολοκληρώσιμη, τότε η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη.
5. Αν η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη, τότε υπάρχει $c \in [a, b]$ ώστε $f(c)(b - a) = \int_a^b f(x) dx$.
6. Αν η f είναι φραγμένη και αν $L(f, P) = U(f, P)$ για κάθε διαμέριση P του $[a, b]$, τότε η f είναι σταθερή.
7. Αν η f είναι φραγμένη και αν υπάρχει διαμέριση P ώστε $L(f, P) = U(f, P)$, τότε η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη.
8. Αν η f είναι Riemann ολοκληρώσιμη και αν $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b] \cap \mathbb{Q}$, τότε

$$\int_a^b f(x) dx = 0.$$

B. Βασικές ασκήσεις

1. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση με την ιδιότητα: για κάθε $0 < b \leq 1$ η f είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα $[b, 1]$. Δείξτε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 1]$.
2. Αποδείξτε ότι η συνάρτηση $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ αν $x \neq 0$ και $f(0) = 2$ είναι ολοκληρώσιμη.
3. Έστω $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι η g είναι συνεχής παντού, εκτός από ένα σημείο $x_0 \in (a, b)$. Δείξτε ότι η g είναι ολοκληρώσιμη.
4. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Riemann αποδείξτε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι ολοκληρώσιμες:

(α) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x$.

(β) $f : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sin x$.

5. Εξετάστε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι ολοκληρώσιμες στο $[0, 2]$ και υπολογίστε το ολοκλήρωμα τους (αν υπάρχει):

(α) $f(x) = x + [x]$.

(β) $f(x) = 1$ αν $x = \frac{1}{k}$ για κάποιον $k \in \mathbb{N}$, και $f(x) = 0$ αλλιώς.

6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι

$$\int_a^b f(x)dx = 0$$

αν και μόνο αν $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

7. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις ώστε

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx.$$

Δείξτε ότι υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ ώστε $f(x_0) = g(x_0)$.

8. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την ιδιότητα: για κάθε συνεχή συνάρτηση $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0.$$

Δείξτε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

9. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την ιδιότητα: για κάθε συνεχή συνάρτηση $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιεί την $g(a) = g(b) = 0$, ισχύει

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0.$$

Δείξτε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

10. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Δείξτε την ανισότητα Cauchy-Schwarz:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \cdot \left(\int_a^b g^2(x)dx \right).$$

11. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx.$$

Ισχύει το ίδιο αν αντικαταστήσουμε το $[0, 1]$ με τυχόν διάστημα $[a, b]$;

12. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = f(0).$$

13. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι η ακολουθία

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

συγκλίνει στο $\int_0^1 f(x) dx$. [Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον ορισμό του Riemann.]

14. Δείξτε ότι

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} = \frac{2}{3}.$$

15. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Ορίζουμε μια ακολουθία (a_n) θέτοντας $a_n = \int_0^1 f(x^n) dx$. Δείξτε ότι $a_n \rightarrow f(0)$.

16. Δείξτε ότι η ακολουθία $\gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \int_1^n \frac{1}{x} dx$ συγκλίνει.

17. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz συνεχής συνάρτηση ώστε

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

για κάθε $x, y \in [0, 1]$. Δείξτε ότι

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Γ. Ασκήσεις

1. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως αύξουσα και συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι

$$\int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx.$$

2. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ γνησίως αύξουσα, συνεχής και επί συνάρτηση με $f(0) = 0$. Δείξτε ότι για κάθε $a, b > 0$

$$ab \leq \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx$$

με ισότητα αν και μόνο αν $f(a) = b$.

3. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: υπάρχει $M > 0$ ώστε

$$|f(x)| \leq M \int_a^x |f(t)|dt$$

για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

4. Έστω $a \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι δεν υπάρχει θετική συνεχής συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ώστε

$$\int_0^1 f(x)dx = 1, \quad \int_0^1 xf(x)dx = a \quad \text{και} \quad \int_0^1 x^2 f(x)dx = a^2.$$

5. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, μη αρνητική συνάρτηση. Θέτουμε $M = \max\{f(x) : x \in [a, b]\}$. Δείξτε ότι η ακολουθία

$$\gamma_n = \left(\int_a^b [f(x)]^n dx \right)^{1/n}$$

συγκλίνει, και $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = M$.

6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να δείξουμε ότι η f έχει πολλά σημεία συνέχειας.

(α) Υπάρχει διαμέριση P του $[a, b]$ ώστε $U(f, P) - L(f, P) < b - a$ (εξηγήστε γιατί). Δείξτε ότι υπάρχουν $a_1 < b_1$ στο $[a, b]$ ώστε $b_1 - a_1 < 1$ και

$$\sup\{f(x) : a_1 \leq x \leq b_1\} - \inf\{f(x) : a_1 \leq x \leq b_1\} < 1.$$

(β) Επαγωγικά ορίστε κιβωτισμένα διαστήματα $[a_n, b_n] \subseteq (a_{n-1}, b_{n-1})$ με μήκος μικρότερο από $1/n$ ώστε

$$\sup\{f(x) : a_n \leq x \leq b_n\} - \inf\{f(x) : a_n \leq x \leq b_n\} < \frac{1}{n}.$$

(γ) Η τομή αυτών των κιβωτισμένων διαστημάτων περιέχει ακριβώς ένα σημείο. Δείξτε ότι η f είναι συνεχής σε αυτό.

(δ) Τώρα δείξτε ότι η f έχει άπειρα σημεία συνέχειας στο $[a, b]$ (δεν χρειάζεται περισσότερη δουλειά!).

7. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη (όχι αναγκαστικά συνεχής) συνάρτηση με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι

$$\int_a^b f(x)dx > 0.$$

Δ. Συμπληρώματα της Θεωρίας

Αποδείξτε τις παρακάτω προτάσεις.

1. Έστω $f, g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ τρεις συναρτήσεις που ικανοποιούν την $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$. Υποθέτουμε ότι οι f, h είναι ολοκληρώσιμες και

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b h(x)dx = I.$$

Δείξτε ότι η g είναι ολοκληρώσιμη και

$$\int_a^b g(x)dx = I.$$

2. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι η $|f|$ είναι ολοκληρώσιμη. Ομοίως, ότι η f^2 είναι ολοκληρώσιμη.

3. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Δείξτε ότι η $f \cdot g$ είναι ολοκληρώσιμη.

4. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη. Δείξτε ότι

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

5. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση ολοκληρώσιμη σε κάθε κλειστό διάστημα της μορφής $[a, b]$. Δείξτε ότι:

(α) $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx.$

(β) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx.$

(γ) $\int_a^b f(x)dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c)dx.$

(δ) $\int_{ca}^{cb} f(t)dt = c \int_a^b f(ct)dt.$

(ε) $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ αν η f είναι περιττή.

(στ) $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ αν η f είναι άρτια.

6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ φραγμένη συνάρτηση.

(α) Δείξτε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη αν και μόνο αν για κάθε $\varepsilon > 0$ μπορούμε να βρούμε κλιμακωτές συναρτήσεις $g_\varepsilon, h_\varepsilon : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g_\varepsilon \leq f \leq h_\varepsilon$ και

$$\int_a^b h_\varepsilon(x)dx - \int_a^b g_\varepsilon(x)dx < \varepsilon.$$

(β) Δείξτε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη αν και μόνο αν για κάθε $\varepsilon > 0$ μπορούμε να βρούμε συνεχείς συναρτήσεις $g_\varepsilon, h_\varepsilon : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g_\varepsilon \leq f \leq h_\varepsilon$ και

$$\int_a^b h_\varepsilon(x)dx - \int_a^b g_\varepsilon(x)dx < \varepsilon.$$

Κεφάλαιο 5

Το θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα λέμε ότι μια συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ αν η παράγωγος $f'(x)$ υπάρχει για κάθε $x \in (a, b)$ και, επιπλέον, υπάρχουν οι πλευρικές παράγωγοι

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{και} \quad f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}.$$

Συμφωνούμε να γράφουμε $f'(a) = f'_+(a)$ και $f'(b) = f'_-(b)$.

5.1 Το θεώρημα μέσης του Ολοκληρωτικού Λογισμού

Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ μια Riemann ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Στο προηγούμενο Κεφάλαιο ορίσαμε τη μέση τιμή

$$(5.1.1) \quad \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

της f στο $[a, b]$. Αν η f υποτεθεί συνεχής, τότε υπάρχει $\xi \in [a, b]$ με την ιδιότητα

$$(5.1.2) \quad f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ο ισχυρισμός αυτός είναι άμεση συνέπεια του εξής γενικότερου θεωρήματος.

Θεώρημα 5.1.1 (θεώρημα μέσης τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού). Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και έστω $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση με μη αρνητικές τιμές. Υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.1.3) \quad \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Απόδειξη. Οι f και g είναι ολοκληρώσιμες, άρα η $f \cdot g$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$. Η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, άρα παίρνει ελάχιστη και μέγιστη τιμή. Έστω

$$(5.1.4) \quad m = \min\{f(x) : a \leq x \leq b\} \quad \text{και} \quad M = \max\{f(x) : a \leq x \leq b\}.$$

Αφού η g παίρνει μη αρνητικές τιμές, έχουμε

$$(5.1.5) \quad mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

για κάθε $x \in [a, b]$. Συνεπώς,

$$(5.1.6) \quad m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx.$$

Αφού $g \geq 0$ στο $[a, b]$, έχουμε $\int_a^b g(x)dx \geq 0$. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: αν $\int_a^b g(x)dx = 0$, τότε από την (5.1.6) βλέπουμε ότι $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. Άρα, η (5.1.3) ισχύει για κάθε $\xi \in [a, b]$.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι $\int_a^b g(x)dx > 0$. Τότε, από την (5.1.6) συμπεραίνουμε ότι

$$(5.1.7) \quad m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

Αφού η f είναι συνεχής, το Θεώρημα Ενδιάμεσης Τιμής δείχνει ότι υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.1.8) \quad f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}.$$

Έπεται το συμπέρασμα. □

Πόρισμα 5.1.2. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.1.9) \quad \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a).$$

Απόδειξη. Άμεση συνέπεια του Θεωρήματος 5.1.1, αν θεωρήσουμε την $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = 1$ για κάθε $x \in [a, b]$. □

Στην επόμενη παράγραφο θα δείξουμε (ξανά) το Πόρισμα 5.1.2, αυτή τη φορά σαν άμεση συνέπεια του πρώτου θεμελιώδους θεωρήματος του Απειροστικού Λογισμού.

5.2 Τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού

Ορισμός 5.2.1 (αόριστο ολοκλήρωμα). Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Είδαμε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, x]$ για κάθε $x \in [a, b]$. Το *αόριστο ολοκλήρωμα της f* είναι η συνάρτηση $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται από την

$$(5.2.1) \quad F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι κάθε Riemann ολοκληρώσιμη συνάρτηση είναι φραγμένη, θα δείξουμε ότι το αόριστο ολοκλήρωμα μιας ολοκληρώσιμης συνάρτησης είναι πάντοτε συνεχής συνάρτηση.

Θεώρημα 5.2.2. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Το αόριστο ολοκλήρωμα F της f είναι συνεχής συνάρτηση στο $[a, b]$.

Απόδειξη. Αφού η f είναι ολοκληρώσιμη, είναι εξ ορισμού φραγμένη. Δηλαδή, υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M$ για κάθε $x \in [a, b]$.

Έστω $x < y$ στο $[a, b]$. Τότε,

$$\begin{aligned} |F(x) - F(y)| &= \left| \int_a^y f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| = \left| \int_x^y f(t)dt \right| \\ &\leq \int_x^y |f(t)|dt \leq M|x - y|. \end{aligned}$$

Άρα, η F είναι Lipschitz συνεχής (με σταθερά M). □

Μπορούμε να δείξουμε κάτι ισχυρότερο: στα σημεία συνέχειας της f , η F είναι παραγωγίσιμη.

Θεώρημα 5.2.3. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Αν η f είναι συνεχής στο $x_0 \in [a, b]$, τότε η F είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και

$$(5.2.2) \quad F'(x_0) = f(x_0).$$

Απόδειξη. Υποθέτουμε ότι $a < x_0 < b$ (οι δύο περιπτώσεις $x_0 = a$ ή $x_0 = b$ ελέγχονται όμοια, με τη σύμβαση που κάναμε στην αρχή του Κεφαλαίου). Θέτουμε $\delta_1 = \min\{x_0 - a, b - x_0\}$. Αν $|h| < \delta_1$, τότε

$$\begin{aligned} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) &= \frac{1}{h} \left(\int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt \right) - f(x_0) \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt - \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0)dt \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} [f(t) - f(x_0)]dt. \end{aligned}$$

Έστω $\varepsilon > 0$. Η f είναι συνεχής στο x_0 , άρα υπάρχει $0 < \delta < \delta_1$ ώστε αν $|x - x_0| < \delta$ τότε $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Έστω $0 < |h| < \delta$.

(α) Αν $0 < h < \delta$, τότε

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} [f(t) - f(x_0)] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \\ &\leq \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon dt = \frac{1}{h} \cdot h\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

(β) Αν $-\delta < h < 0$, τότε

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{|h|} \int_{x_0+h}^{x_0} [f(t) - f(x_0)] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_{x_0+h}^{x_0} |f(t) - f(x_0)| dt \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_{x_0+h}^{x_0} \varepsilon dt = \frac{1}{|h|} \cdot (-h)\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0),$$

δηλαδή $F'(x_0) = f(x_0)$. □

Άμεση συνέπεια είναι το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού.

Θεώρημα 5.2.4 (πρώτο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού). Αν η $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής, τότε το αόριστο ολοκλήρωμα F της f είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση και

$$(5.2.3) \quad F'(x) = f(x)$$

για κάθε $x \in [a, b]$. □

Πόρισμα 5.2.5. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.2.4) \quad \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

Απόδειξη. Εφαρμόζουμε το θεώρημα μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού για τη συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ στο $[a, b]$. \square

Ας υποθέσουμε τώρα ότι $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια συνεχής συνάρτηση. Μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **παράγουσα** της f (ή **αντιπαράγωγος** της f) αν $G'(x) = f(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$. Σύμφωνα με το Θεώρημα 5.2.4, η συνάρτηση

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

είναι παράγουσα της f . Αν G είναι μια άλλη παράγουσα της f , τότε $G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, άρα η $G - F$ είναι σταθερή στο $[a, b]$ (απλή συνέπεια του θεωρήματος μέσης τιμής). Δηλαδή, υπάρχει $c \in \mathbb{R}$ ώστε

$$(5.2.5) \quad G(x) - F(x) = c$$

για κάθε $x \in [a, b]$. Αφού $F(a) = 0$, παίρνουμε $c = G(a)$. Δηλαδή,

$$(5.2.6) \quad \int_a^x f(t) dt = G(x) - G(a)$$

ή αλλιώς

$$(5.2.7) \quad G(x) = G(a) + \int_a^x f(t) dt$$

για κάθε $x \in [a, b]$. Έχουμε λοιπόν δείξει το εξής:

Θεώρημα 5.2.6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και έστω $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ το αόριστο ολοκλήρωμα της f . Αν $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια παράγουσα της f , τότε

$$(5.2.8) \quad G(x) = F(x) + c = \int_a^x f(t) dt + G(a)$$

για κάθε $x \in [a, b]$. Ειδικότερα,

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a). \quad \square$$

Σημείωση: Δεν είναι σωστό ότι για κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει η ισότητα

$$(5.2.9) \quad G(b) - G(a) = \int_a^b G'(x) dx.$$

Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση $G : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $G(0) = 0$ και $G(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ αν $0 < x \leq 1$, τότε η G είναι παραγωγίσιμη στο $[0, 1]$ αλλά η G' δεν είναι φραγμένη συνάρτηση (ελέγξτε το) οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για το ολοκλήρωμα $\int_a^b G'$.

Αν όμως η $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη και η G' είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$, τότε η (5.2.9) ισχύει. Αυτό είναι το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού.

Θεώρημα 5.2.7 (δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού). Έστω $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Αν η G' είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ τότε

$$(5.2.10) \quad \int_a^b G'(x)dx = G(b) - G(a).$$

Απόδειξη. Έστω $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ μια διαμέριση του $[a, b]$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[x_k, x_{k+1}]$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, βρίσκουμε $\xi_k \in (x_k, x_{k+1})$ με την ιδιότητα

$$(5.2.11) \quad G(x_{k+1}) - G(x_k) = G'(\xi_k)(x_{k+1} - x_k).$$

Αν, για κάθε $0 \leq k \leq n-1$, ορίσουμε

$$(5.2.12) \quad m_k = \inf\{G'(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\} \quad \text{και} \quad M_k = \sup\{G'(x) : x_k \leq x \leq x_{k+1}\},$$

τότε

$$(5.2.13) \quad m_k \leq G'(\xi_k) \leq M_k,$$

άρα

$$(5.2.14) \quad L(G', P) \leq \sum_{k=0}^{n-1} G'(\xi_k)(x_{k+1} - x_k) \leq U(G', P).$$

Δηλαδή,

$$(5.2.15) \quad L(G', P) \leq \sum_{k=0}^{n-1} (G(x_{k+1}) - G(x_k)) = G(b) - G(a) \leq U(G', P).$$

Αφού η P ήταν τυχούσα και η G' είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$, παίρνοντας supremum ως προς P στην αριστερή ανισότητα και infimum ως προς P στην δεξιά ανισότητα της (5.2.15), συμπεραίνουμε ότι

$$(5.2.16) \quad \int_a^b G'(x)dx \leq G(b) - G(a) \leq \int_a^b G'(x)dx,$$

που είναι το ζητούμενο. \square

5.3 Μέθοδοι ολοκλήρωσης

Τα θεωρήματα αυτής της παραγράφου «περιγράφουν» δύο χρήσιμες μεθόδους ολοκλήρωσης: την ολοκλήρωση κατά μέρη και την ολοκλήρωση με αντικατάσταση.

Συμβολισμός. Αν $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, τότε συμφωνούμε να γράφουμε

$$(5.3.1) \quad [F(x)]_a^b = F(x) \Big|_a^b := F(b) - F(a).$$

Θεώρημα 5.3.1 (ολοκλήρωση κατά μέρη). Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Αν οι f' και g' είναι ολοκληρώσιμες, τότε

$$(5.3.2) \quad \int_a^x fg' = (fg)(x) - (fg)(a) - \int_a^x f'g.$$

Ειδικότερα,

$$(5.3.3) \quad \int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx.$$

Απόδειξη. Η $f \cdot g$ είναι παραγωγίσιμη και

$$(5.3.4) \quad (f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$$

στο $[a, b]$. Από την υπόθεση, οι συναρτήσεις fg' , $f'g$ είναι ολοκληρώσιμες, άρα και η $(f \cdot g)'$ είναι ολοκληρώσιμη. Από το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού, για κάθε $x \in [a, b]$ έχουμε

$$(5.3.5) \quad \int_a^x fg' + \int_a^x f'g = \int_a^x (fg)' = (fg)(x) - (fg)(a).$$

Ο δεύτερος ισχυρισμός προκύπτει αν θέσουμε $x = b$. □

Μια εφαρμογή είναι το «δεύτερο θεώρημα μέσης τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού».

Πόρισμα 5.3.2. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Υποθέτουμε ότι η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ και η g είναι μονότονη και συνεχώς παραγωγίσιμη στο $[a, b]$. Τότε, υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.3.6) \quad \int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

Απόδειξη. Θεωρούμε το αόριστο ολοκλήρωμα $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ της f στο $[a, b]$. Τότε, το ζητούμενο παίρνει την εξής μορφή: υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.3.7) \quad \int_a^b F'(x)g(x)dx = g(a)F(\xi) + g(b)(F(b) - F(\xi)).$$

Η g είναι συνεχώς παραγωγίσιμη, άρα μπορούμε να εφαρμόσουμε ολοκλήρωση κατά μέρη στο αριστερό μέλος. Έχουμε

$$(5.3.8) \quad \int_a^b F'(x)g(x)dx = F(b)g(b) - F(a)g(a) - \int_a^b F(x)g'(x)dx \\ = F(b)g(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx,$$

αφού $F(a) = 0$. Εφαρμόζουμε το θεώρημα μέσης τιμής του Ολοκληρωτικού Λογισμού: η g είναι μονότονη, άρα η g' διατηρεί πρόσημο στο $[a, b]$. Η F είναι συνεχής και η g' ολοκληρώσιμη, άρα υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε

$$(5.3.9) \quad \int_a^b F(x)g'(x)dx = F(\xi) \int_a^b g'(x)dx = F(\xi)(g(b) - g(a)).$$

Αντικαθιστώντας στην (5.3.8) παίρνουμε

$$(5.3.10) \quad \int_a^b F'(x)g(x) = F(b)g(b) - F(\xi)(g(b) - g(a)) = g(a)F(\xi) + g(b)(F(b) - F(\xi)),$$

δηλαδή την (5.3.7). □

Θεώρημα 5.3.3 (πρώτο θεώρημα αντικατάστασης). Έστω $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι η ϕ' είναι ολοκληρώσιμη. Αν $I = \phi([a, b])$ και $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια συνεχής συνάρτηση, τότε

$$(5.3.11) \quad \int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(s) ds.$$

Απόδειξη. Η ϕ είναι συνεχής, άρα το $I = \phi([a, b])$ είναι κλειστό διάστημα. Η f είναι συνεχής στο I , άρα είναι ολοκληρώσιμη στο I . Ορίζουμε $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$(5.3.12) \quad F(x) = \int_{\phi(a)}^x f(s) ds$$

(παρατηρήστε ότι το $\phi(a)$ δεν είναι απαραίτητα άκρο του I , δηλαδή η F δεν είναι απαραίτητα το αόριστο ολοκλήρωμα της f στο I). Αφού η f είναι συνεχής στο I , το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού δείχνει ότι η F είναι παραγωγίσιμη στο I και $F' = f$. Έπεται ότι

$$(5.3.13) \quad \int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) dt = \int_a^b F'(\phi(t))\phi'(t) dt.$$

Παρατηρούμε ότι

$$(5.3.14) \quad (F' \circ \phi) \cdot \phi' = (F \circ \phi)'$$

Η $(F' \circ \phi) \cdot \phi'$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$, άρα η $(F \circ \phi)'$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$. Από το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού παίρνουμε

$$(5.3.15) \quad \int_a^b (f \circ \phi) \cdot \phi' = \int_a^b (F' \circ \phi) \cdot \phi' = \int_a^b (F \circ \phi)' = (F \circ \phi)(b) - (F \circ \phi)(a).$$

Αφού

$$(5.3.16) \quad (F \circ \phi)(b) - (F \circ \phi)(a) = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f - \int_{\phi(a)}^{\phi(a)} f = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f,$$

παίρνουμε την (5.3.11). □

Θεώρημα 5.3.4 (δεύτερο θεώρημα αντικατάστασης). Έστω $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση, με $\psi'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Αν $I = \psi([a, b])$ και $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια συνεχής συνάρτηση, τότε

$$(5.3.17) \quad \int_a^b f(\psi(t)) dt = \int_{\psi(a)}^{\psi(b)} f(s)(\psi^{-1})'(s) ds.$$

Απόδειξη. Η ψ' είναι συνεχής και δεν μηδενίζεται στο $[a, b]$, άρα είναι παντού θετική ή παντού αρνητική στο $[a, b]$. Συνεπώς, η ψ είναι γνησίως μονότονη στο $[a, b]$. Αν, χωρίς περιορισμό της γενικότητας, υποθέσουμε ότι η ψ είναι γνησίως αύξουσα τότε ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση $\psi^{-1} : I \rightarrow \mathbb{R}$ της ψ στο $I = \psi([a, b]) = [\psi(a), \psi(b)]$. Εφαρμόζουμε το πρώτο θεώρημα αντικατάστασης για την $f \cdot (\psi^{-1})'$ (παρατηρήστε ότι η $(\psi^{-1})'$ είναι συνεχής στο I). Έχουμε

$$\begin{aligned} \int_{\psi(a)}^{\psi(b)} f \cdot (\psi^{-1})' &= \int_a^b [(f \cdot (\psi^{-1})') \circ \psi] \psi' \\ &= \int_a^b (f \circ \psi) \cdot [(\psi^{-1})' \circ \psi] \psi' \\ &= \int_a^b (f \circ \psi) \cdot (\psi^{-1} \circ \psi)' \\ &= \int_a^b f \circ \psi. \end{aligned}$$

Αυτό αποδεικνύει την (5.3.17). □

5.4 Ασκήσεις

A. Βασικές ασκήσεις

1. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι υπάρχει $s \in [a, b]$ ώστε

$$\int_a^s f(t)dt = \int_s^b f(t)dt.$$

Μπορούμε πάντα να επιλέγουμε ένα τέτοιο s στο ανοικτό διάστημα (a, b) ;

2. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμη και θετική συνάρτηση ώστε $\int_0^1 f(x)dx = 1$. Δείξτε ότι για κάθε $n \in \mathbb{N}$ υπάρχει διαμέριση $\{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1\}$ ώστε $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x)dx = \frac{1}{n}$ για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$.

3. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι υπάρχει $s \in [0, 1]$ ώστε

$$\int_0^1 f(x)x^2 dx = \frac{f(s)}{3}.$$

4. Υποθέτουμε ότι η $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και ότι

$$\int_0^x f(t)dt = \int_x^1 f(t)dt$$

για κάθε $x \in [0, 1]$. Δείξτε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$.

5. Έστω $f, h : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$. Υποθέτουμε ότι η h είναι συνεχής και η f είναι παραγωγίσιμη. Ορίζουμε

$$F(x) = \int_0^{f(x)} h(t)dt.$$

Δείξτε ότι $F'(x) = h(f(x)) \cdot f'(x)$.

6. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και έστω $\delta > 0$. Ορίζουμε

$$g(x) = \int_{x-\delta}^{x+\delta} f(t)dt.$$

Δείξτε ότι η g είναι παραγωγίσιμη και βρείτε την g' .

7. Έστω $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Ορίζουμε

$$G(x) = \int_{h(x)}^{g(x)} t^2 dt.$$

Δείξτε ότι η G είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} και βρείτε την G' .

8. Έστω $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Ορίζουμε

$$F(x) = \int_1^x f\left(\frac{x}{t}\right) dt.$$

Βρείτε την F' .

9. Έστω $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής. Δείξτε ότι, για κάθε $x \in [0, a]$,

$$\int_0^x f(u)(x-u)du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t)dt \right) du.$$

10. Έστω $a, b \in \mathbb{R}$ με $a < b$ και $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση. Αν $\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ είναι διαμέριση του $[a, b]$, δείξτε ότι

$$\sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq \int_a^b |f'(x)| dx.$$

11. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ γνησίως αύξουσα, συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(0) = 0$. Δείξτε ότι, για κάθε $x > 0$,

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = xf(x).$$

B. Ασκήσεις

1. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(0) = 0$. Δείξτε ότι για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει

$$|f(x)| \leq \left(\int_0^1 |f'(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

2. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x > 0$, η οποία ικανοποιεί την

$$f(x)^2 = 2 \int_0^x f(t) dt$$

για κάθε $x \geq 0$. Δείξτε ότι $f(x) = x$ για κάθε $x \geq 0$.

3. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(nx) dx = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) dx = 0.$$

4. Εξετάστε ως προς τη σύγκλιση τις ακολουθίες

$$a_n = \int_0^\pi \sin(nx) dx \quad \text{και} \quad b_n = \int_0^\pi |\sin(nx)| dx.$$

5. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι υπάρχουν συνεχείς, αύξουσες και θετικές συναρτήσεις $g, h : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ώστε $f = g - h$.

Κεφάλαιο 7

Θεώρημα Taylor

7.1 Θεώρημα Taylor

Ορισμός 7.1.1. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $x_0 \in [a, b]$. Υποθέτουμε ότι η f είναι n φορές παραγωγίσιμη στο x_0 . Το **πολυώνυμο Taylor τάξης n της f στο x_0** είναι το πολυώνυμο $T_{n,f,x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως εξής:

$$(7.1.1) \quad T_{n,f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$

δηλαδή,

$$(7.1.2) \quad T_{n,f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Το **υπόλοιπο Taylor τάξης n της f στο x_0** είναι η συνάρτηση $R_{n,f,x_0} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως εξής:

$$(7.1.3) \quad R_{n,f,x_0}(x) = f(x) - T_{n,f,x_0}(x).$$

Όταν $x_0 = 0$, συνηθίζουμε να ονομάζουμε τα $T_{n,f,0}$ και $R_{n,f,0}$ πολυώνυμο MacLaurin και υπόλοιπο MacLaurin της f αντίστοιχα.

Παρατήρηση 7.1.2. Παραγωγίζοντας το T_{n,f,x_0} βλέπουμε ότι:

$$\begin{aligned} T_{n,f,x_0}(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k, \quad \text{άρα} \quad T_{n,f,x_0}(x_0) = f(x_0), \\ T'_{n,f,x_0}(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x-x_0)^{k-1}, \quad \text{άρα} \quad T'_{n,f,x_0}(x_0) = f'(x_0), \\ T''_{n,f,x_0}(x) &= \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-2)!} (x-x_0)^{k-2}, \quad \text{άρα} \quad T''_{n,f,x_0}(x_0) = f''(x_0), \\ &\dots \quad \dots \\ T^{(n)}_{n,f,x_0}(x) &= \sum_{k=n}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-n)!} (x-x_0)^{k-n}, \quad \text{άρα} \quad T^{(n)}_{n,f,x_0}(x_0) = f^{(n)}(x_0). \end{aligned}$$

Δηλαδή, το πολυώνυμο Taylor τάξης n της f στο x_0 ικανοποιεί τις

$$(7.1.3) \quad T_{n,f,x_0}^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

και είναι το μοναδικό πολυώνυμο βαθμού το πολύ ίσου με n που έχει αυτή την ιδιότητα (εξηγήστε γιατί).

Παρατήρηση 7.1.3. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $x_0 \in [a, b]$. Υποθέτουμε ότι η f είναι $n-1$ φορές παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και n φορές παραγωγίσιμη στο x_0 . Παρατηρήστε ότι

$$(7.1.4) \quad T'_{n,f,x_0}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x-x_0)^{k-1}$$

και

$$(7.1.5) \quad T_{n-1,f',x_0}(x) = \sum_{s=0}^{n-1} \frac{f^{(s+1)}(x_0)}{s!} (x-x_0)^s.$$

Θέτοντας $k = s+1$ στην (7.1.5) συμπεραίνουμε ότι

$$(7.1.6) \quad T'_{n,f,x_0} = T_{n-1,f',x_0}.$$

Έπεται ότι

$$(7.1.7) \quad R'_{n,f,x_0} = R_{n-1,f',x_0}.$$

Πρόταση 7.1.4. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $x_0 \in [a, b]$. Υποθέτουμε ότι η f είναι $n-1$ φορές παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και n φορές παραγωγίσιμη στο x_0 . Τότε,

$$(7.1.8) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_{n,f,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = 0.$$

Απόδειξη. Με επαγωγή ως προς n . Για $n = 1$ έχουμε

$$R_{1,f,x_0}(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0),$$

άρα

$$(7.1.9) \quad \frac{R_{1,f,x_0}(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \rightarrow 0$$

όταν $x \rightarrow x_0$, από τον ορισμό της παραγώγου στο σημείο x_0 .

Υποθέτουμε ότι η πρόταση ισχύει για $n = m$ και για κάθε συνάρτηση που ικανοποιεί τις υποθέσεις. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, m φορές παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και $m + 1$ φορές παραγωγίσιμη στο x_0 . Τότε,

$$(7.1.10) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} R_{m+1,f,x_0}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^{m+1} = 0$$

και

$$(7.1.11) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_{m+1,f,x_0}(x)}{[(x - x_0)^{m+1}]'} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_{m,f',x_0}(x)}{(m + 1)(x - x_0)^m} = 0$$

από την επαγωγική υπόθεση για την f' . Εφαρμόζοντας τον κανόνα l'Hospital ολοκληρώνουμε το επαγωγικό βήμα. \square

Λήμμα 7.1.5. Έστω p πολυώνυμο βαθμού το πολύ ίσου με n το οποίο ικανοποιεί την

$$(7.1.12) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Τότε, $p \equiv 0$.

Απόδειξη. Με επαγωγή ως προς n . Για το επαγωγικό βήμα παρατηρούμε πρώτα ότι

$$(7.1.13) \quad p(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x)}{(x - x_0)^n} (x - x_0)^n = 0,$$

Συνεπώς, $p(x_0) = 0$. Άρα,

$$(7.1.14) \quad p(x) = (x - x_0)p_1(x),$$

όπου p_1 πολυώνυμο βαθμού το πολύ ίσου με $n - 1$ το οποίο ικανοποιεί την

$$(7.1.15) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p_1(x)}{(x - x_0)^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Αν υποθέσουμε ότι η Πρόταση ισχύει για τον $n - 1$, τότε $p_1 \equiv 0$ άρα $p \equiv 0$. \square .

Η Πρόταση 7.1.4 και το Λήμμα 7.1.5 αποδεικνύουν τον εξής χαρακτηρισμό του πολυωνύμου Taylor T_{n,f,x_0} :

Θεώρημα 7.1.6. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $x_0 \in [a, b]$. Υποθέτουμε ότι η f είναι $n - 1$ φορές παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και n φορές παραγωγίσιμη στο x_0 . Τότε, το πολυώνυμο Taylor τάξης n της f στο x_0 είναι το μοναδικό πολυώνυμο T βαθμού το πολύ ίσου με n το οποίο ικανοποιεί την

$$(7.1.16) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Απόδειξη. Η Πρόταση 7.1.4 δείχνει ότι το T_{n,f,x_0} ικανοποιεί την (7.1.16). Για τη μοναδικότητα αρκεί να παρατηρήσετε ότι αν δύο πολυώνυμα T_1, T_2 βαθμού το πολύ ίσου με n ικανοποιούν την (7.1.16), τότε το πολυώνυμο $p := T_1 - T_2$ ικανοποιεί την (7.1.12). Από το Λήμμα 7.1.5 συμπεραίνουμε ότι $T_1 \equiv T_2$. \square

Παρατήρηση 7.1.7. Το Θεώρημα 7.1.6 μας δίνει έναν έμμεσο τρόπο για να βρίσκουμε το πολυώνυμο Taylor τάξης n μιας συνάρτησης f σε κάποιο σημείο x_0 . Αρκεί να βρούμε ένα πολυώνυμο βαθμού το πολύ ίσου με n το οποίο ικανοποιεί την (7.1.16).

(i) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{1-x}$ είναι άπειρες φορές παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$ και έχουμε δει ότι

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \text{ για κάθε } |x| < 1.$$

Θα δείξουμε ότι, για κάθε n ,

$$T_{n,f,0}(x) = T_n(x) := 1 + x + \cdots + x^n.$$

Παρατηρούμε ότι

$$f(x) - T_n(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - T_n(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1-x} = 0,$$

και το ζητούμενο προκύπτει από το Θεώρημα 7.1.6.

(ii) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ είναι άπειρες φορές παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} και έχουμε δει ότι

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots \text{ για κάθε } |x| < 1.$$

Θα δείξουμε ότι, για κάθε n ,

$$T_{2n,f,0}(x) = T_{2n+1,f,0}(x) = T_{2n}(x) := 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n}.$$

Παρατηρούμε ότι

$$f(x) - T_n(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1 - (-1)^{n+1}x^{2n+2}}{1+x^2} = \frac{(-1)^{n+1}x^{2n+2}}{1+x^2}.$$

Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - T_{2n}(x)}{x^{2n+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1)^{n+1}x}{1+x^2} = 0,$$

και (προφανώς)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - T_{2n}(x)}{x^{2n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1)^{n+1}x^2}{1+x^2} = 0,$$

οπότε το ζητούμενο προκύπτει από το Θεώρημα 7.1.6.

Το Θεώρημα Taylor δίνει εύχρηστες εκφράσεις για το υπόλοιπο Taylor R_{n,f,x_0} τάξης n μιας συνάρτησης f σε κάποιο σημείο x_0 .

Θεώρημα 7.1.8 (Θεώρημα Taylor). Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση $n + 1$ φορές παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και έστω $x_0 \in [a, b]$. Τότε, για κάθε $x \in [a, b]$,

(i) **Μορφή Cauchy του υπολοίπου Taylor:** Υπάρχει ξ μεταξύ των x_0 και x ώστε

$$(7.1.17) \quad R_{n,f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0).$$

(ii) **Μορφή Lagrange του υπολοίπου Taylor:** Υπάρχει ξ μεταξύ των x_0 και x ώστε

$$(7.1.18) \quad R_{n,f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

(iii) **Ολοκληρωτική μορφή του υπολοίπου Taylor:** Αν η $f^{(n+1)}$ είναι ολοκληρώσιμη συνάρτηση, τότε

$$(7.1.19) \quad R_{n,f,x_0}(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt.$$

Απόδειξη. Σταθεροποιούμε το $x \in [a, b]$ και ορίζουμε $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$(7.1.20) \quad \phi(t) = R_{n,f,t}(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k.$$

Παραγωγίζοντας ως προς t βλέπουμε ότι

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= -f'(t) - \sum_{k=1}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x - t)^{k-1} \right) \\ &= -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n, \end{aligned}$$

αφού το μεσαίο άθροισμα είναι τηλεσκοπικό. Παρατηρήστε επίσης ότι

$$(7.1.21) \quad \phi(x_0) = R_{n,f,x_0}(x) \text{ και } \phi(x) = R_{n,f,x}(x) = 0.$$

(i) Για την μορφή Cauchy του υπολοίπου εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την ϕ στο διάστημα με άκρα x και x_0 : Υπάρχει ξ μεταξύ των x_0 και x ώστε

$$R_{n,f,x_0}(x) = \phi(x_0) - \phi(x) = \phi'(\xi)(x_0 - x).$$

Από την

$$\phi'(\xi) = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n$$

έπεται ότι

$$R_{n,f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n(x - x_0).$$

(ii) Για την μορφή Lagrange του υπολοίπου εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Cauchy για την ϕ και για την $g(t) = (x - t)^{n+1}$ στο διάστημα με άκρα x και x_0 : Υπάρχει ξ μεταξύ των x_0 και x ώστε

$$\frac{R_{n,f,x_0}(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{\phi(x_0) - \phi(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{\phi'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Έπεται ότι

$$R_{n,f,x_0}(x) = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n}{-(n+1)(x - \xi)^n}(x - x_0)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

(iii) Για την ολοκληρωτική μορφή του υπολοίπου παρατηρούμε ότι (από την υπόθεσή μας) η ϕ' είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα με άκρα x και x_0 , οπότε εφαρμόζεται το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού:

$$\begin{aligned} R_{n,f,x_0}(x) &= \phi(x_0) - \phi(x) = \int_x^{x_0} \phi'(t) dt \\ &= -\int_x^{x_0} \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n dt \\ &= \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n dt. \end{aligned}$$

Έτσι, έχουμε τις τρεις μορφές για το υπόλοιπο $R_{n,f,x_0}(x)$. \square

Στην επόμενη Παράγραφο θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα Taylor για να βρούμε το ανάπτυγμα σε δυναμοσειρά των βασικών υπερβατικών συναρτήσεων.

7.2 Δυναμοσειρές και αναπτύγματα Taylor

7.2α' Η εκθετική συνάρτηση $f(x) = e^x$

Παρατηρούμε ότι $f^{(k)}(x) = e^x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $k = 0, 1, 2, \dots$. Ειδικότερα, $f^{(k)}(0) = 1$ για κάθε $k \geq 0$. Συνεπώς,

$$(7.2.1) \quad T_n(x) := T_{n,f,0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

Έστω $x \neq 0$. Χρησιμοποιώντας την μορφή Lagrange του υπολοίπου παίρνουμε

$$(7.2.2) \quad R_n(x) := R_{n,f,0}(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

για κάποιο ξ μεταξύ των 0 και x . Για να εκτιμήσουμε το υπόλοιπο διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

- Αν $x > 0$ τότε

$$|R_n(x)| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \leq \frac{e^x x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- Αν $x < 0$, τότε $\xi < 0$ και $e^\xi < 1$, άρα

$$|R_n(x)| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Σε κάθε περίπτωση,

$$(7.2.3) \quad |R_n(x)| \leq \frac{e^{|x|} |x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Έστω $x \neq 0$. Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου για την ακολουθία $a_n := \frac{e^{|x|} |x|^{n+1}}{(n+1)!}$ βλέπουμε ότι

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|}{n+2} \rightarrow 0,$$

άρα

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0.$$

Συνεπώς,

$$(7.2.4) \quad e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

7.2β' Η συνάρτηση $f(x) = \cos x$

Παρατηρούμε ότι $f^{(2k)}(x) = (-1)^k \cos x$ και $f^{(2k+1)}(x) = (-1)^k \sin x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $k = 0, 1, 2, \dots$. Ειδικότερα, $f^{(2k)}(0) = (-1)^k$ και $f^{(2k+1)}(0) = 0$. Συνεπώς,

$$(7.2.5) \quad T_{2n}(x) := T_{2n,f,0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

Έστω $x \neq 0$. Χρησιμοποιώντας την μορφή Lagrange του υπολοίπου παίρνουμε

$$(7.2.6) \quad R_{2n}(x) := R_{2n,f,0}(x) = \frac{f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

για κάποιο ξ μεταξύ των 0 και x . Για να εκτιμήσουμε το υπόλοιπο παρατηρούμε ότι $|f^{(2n+1)}(\xi)| \leq 1$ (είναι κάποιο ημίτονο ή συνημίτονο), άρα

$$(7.2.7) \quad |R_{2n}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου για την ακολουθία $a_n := \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}$ βλέπουμε ότι

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_{2n}(x)| = 0.$$

Συνεπώς,

$$(7.2.8) \quad \cos x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

7.2γ' Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$

Παρατηρούμε ότι $f^{(2k)}(x) = (-1)^k \sin x$ και $f^{(2k+1)}(x) = (-1)^k \cos x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $k = 0, 1, 2, \dots$. Ειδικότερα, $f^{(2k)}(0) = 0$ και $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$. Συνεπώς,

$$(7.2.9) \quad T_{2n+1}(x) := T_{2n+1,f,0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Έστω $x \neq 0$. Χρησιμοποιώντας την μορφή Lagrange του υπολοίπου παίρνουμε

$$(7.2.10) \quad R_{2n+1}(x) := R_{2n+1,f,0}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} x^{2n+2}$$

για κάποιο ξ μεταξύ των 0 και x . Για να εκτιμήσουμε το υπόλοιπο παρατηρούμε ότι $|f^{(2n+2)}(\xi)| \leq 1$ (είναι κάποιο ημίτονο ή συνημίτονο), άρα

$$(7.2.11) \quad |R_{2n+1}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου για την ακολουθία $a_n := \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}$ βλέπουμε ότι

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_{2n+1}(x)| = 0.$$

Συνεπώς,

$$(7.2.12) \quad \sin x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

7.2δ' Η συνάρτηση $f(x) = \ln(1+x)$, $x \in (-1, 1]$

Παρατηρούμε ότι $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$ για κάθε $x > -1$ και $k = 1, 2, \dots$

Ειδικότερα, $f(0) = 0$ και $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$ για κάθε $k \geq 1$. Συνεπώς,

$$(7.2.13) \quad T_n(x) := T_{n,f,0}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

Έστω $x > -1$. Χρησιμοποιώντας την ολοκληρωτική μορφή του υπολοίπου παίρνουμε

$$(7.2.14) \quad R_n(x) := R_{n,f,0}(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt.$$

Θέτουμε $u = \frac{x-t}{1+t}$. Τότε, το u μεταβάλλεται από x ως 0 και $\frac{dt}{1+t} = \frac{-du}{1+u}$ (ελέγξτε το). Συνεπώς,

$$(7.2.15) \quad R_n(x) = \int_x^0 \frac{-u^n}{1+u} du.$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

- Αν $-1 < x < 0$ τότε

$$|R_n(x)| \leq \int_x^0 \frac{|u|^n}{1+u} du \leq \frac{1}{1+x} \int_0^{|x|} u^n du = \frac{1}{1+x} \frac{|x|^{n+1}}{n+1}.$$

- Αν $0 < x \leq 1$ τότε

$$|R_n(x)| = \int_0^x \frac{u^n}{1+u} du \leq \int_0^x u^n du = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)}.$$

Σε κάθε περίπτωση,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0.$$

Συνεπώς,

$$(7.2.16) \quad \ln(1+x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$$

για κάθε $x \in (-1, 1]$ (**σειρά Mercator**).

Ειδικότερα, για $x = 1$ παίρνουμε τον **τύπο του Leibniz**

$$(7.2.17) \quad \ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \cdots.$$

Δεύτερος τρόπος: Από τη σχέση

$$(7.2.18) \quad \frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 + \cdots + (-1)^{n-1} t^{n-1} + (-1)^n \frac{t^n}{1+t} \quad (t \neq -1)$$

έχουμε, για κάθε $x > -1$,

$$(7.2.19) \quad \ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt.$$

Αν ονομάσουμε $F_n(x)$ τη διαφορά

$$(7.2.20) \quad \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \right)$$

έχουμε

$$(7.2.21) \quad F_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt.$$

Εκτιμώντας το ολοκλήρωμα όπως πριν, βλέπουμε ότι

$$(7.2.22) \quad |F_n(x)| \leq \max \left\{ 1, \frac{1}{x+1} \right\} \frac{|x|^{n+1}}{n+1}$$

για κάθε $-1 < x \leq 1$. Συνεπώς, $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 0$. Έπεται ότι

$$(7.2.23) \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

για $x \in (-1, 1]$. Παρατηρήστε επίσης ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F_n(x)}{x^n} = 0$, το οποίο αποδεικνύει ότι $F_n(x) = R_{n,f,0}(x)$.

Όταν $|x| > 1$ η σειρά αποκλίνει (αφού η ακολουθία $(\frac{x^n}{n})$ δεν τείνει στο 0) και για $x = -1$ επίσης αποκλίνει (αρμονική σειρά).

7.2ε' Η διωνυμική συνάρτηση $f(x) = (1+x)^a$, $x > -1$

Η f ορίζεται από την $f(x) = \exp(a \ln(1+x))$. Αν $a > 0$, το όριο $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ υπάρχει και είναι ίσο με 0, διότι $\ln(1+x) = y \rightarrow -\infty$ και $\exp(ay) \rightarrow 0$. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να επεκτείνουμε το πεδίο ορισμού της f στο $[-1, \infty)$ θέτοντας $f(-1) = 0$. Παραγωγίζοντας βλέπουμε ότι

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x) &= a(a-1) \cdots (a-k+1)(1+x)^{a-k} \\ f^{(k)}(0) &= a(a-1) \cdots (a-k+1). \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$(7.2.24) \quad T_n(x) := T_{n,f,0}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{a}{k} x^k$$

όπου

$$(7.2.25) \quad \binom{a}{k} = \frac{a(a-1) \cdots (a-k+1)}{k!}.$$

Παρατηρήστε ότι αν $a \in \mathbb{N}$ τότε $\binom{a}{k} = 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ με $k > a$, οπότε

$$(7.2.26) \quad (1+x)^a = \sum_{k=0}^a \binom{a}{k} x^k.$$

Υποθέτουμε λοιπόν ότι $a \notin \mathbb{N}$. Θα δείξουμε ότι, όταν $|x| < 1$, τότε $T_{n,f,0}(x) \rightarrow f(x)$. Χρησιμοποιούμε τη μορφή Cauchy του υπολοίπου: υπάρχει ξ ανάμεσα στο 0 και στο x ώστε

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n x = \frac{a(a-1) \cdots (a-n)}{n!} (1+\xi)^{a-(n+1)} (x-\xi)^n x \\ &= \frac{a(a-1) \cdots (a-n)}{n!} \left(\frac{x-\xi}{1+\xi} \right)^n (1+\xi)^{a-1} x \end{aligned}$$

Για να δείξουμε ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ όταν $|x| < 1$, παρατηρούμε πρώτα ότι

$$(7.2.27) \quad \left| \frac{x-\xi}{1+\xi} \right| \leq |x| \quad \text{όταν } |x| < 1.$$

Πράγματι, αν $0 \leq \xi \leq x$ έχουμε

$$(7.2.28) \quad \left| \frac{x-\xi}{1+\xi} \right| = \frac{x-\xi}{1+\xi} \leq \frac{x}{1+\xi} \leq x = |x|.$$

Αν $-1 < x \leq \xi \leq 0$ θεωρούμε την συνάρτηση $g_x : [x, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$(7.2.29) \quad g_x(\xi) = \frac{x-\xi}{1+\xi} = \frac{x+1}{\xi+1} - 1$$

η οποία είναι φθίνουσα (αφού $x + 1 > 0$) άρα έχει μέγιστη τιμή την $g_x(x) = 0$ και ελάχιστη την $g_x(0) = x$ οπότε για κάθε $t \in [x, 0]$ έχουμε $g_x(\xi) \leq 0$ άρα

$$(7.2.30) \quad \left| \frac{x - \xi}{1 + \xi} \right| = -g_x(\xi) \leq -g_x(0) = -x = |x|.$$

Έπεται ότι

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} \left(\frac{x-\xi}{1+\xi} \right)^n (1+\xi)^{a-1} x \right| \\ &\leq \left| \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} x^n \right| |(1+\xi)^{a-1} x| \\ &\leq \left| \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} x^n \right| M(x) \end{aligned}$$

όπου $M(x) = |x| \max(1, (1+x)^{a-1})$ (άσκηση), άρα αρκεί να δείξουμε ότι

$$y_n \equiv \left| \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} x^n \right| \rightarrow 0$$

καθώς $n \rightarrow \infty$. Έχουμε

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \left| \frac{a(a-1)\dots(a-n)(a-(n+1))}{a(a-1)\dots(a-n)} \frac{n!}{(n+1)!} \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = \left| \frac{a-n+1}{n+1} x \right|.$$

Για κάθε $n \geq a-1$ έχουμε $|a-(n+1)| = n+1-a$, άρα

$$(7.2.31) \quad \frac{y_{n+1}}{y_n} = \left| \frac{a-(n+1)}{n+1} x \right| = \frac{n+1-a}{n+1} |x| \rightarrow |x| < 1$$

όταν $n \rightarrow \infty$, άρα $y_n \rightarrow 0$. Δείξαμε ότι αν $|x| < 1$ τότε $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$. Άρα,

$$(7.2.32) \quad (1+x)^a = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{a}{k} x^k$$

για $-1 < x < 1$.

Για $|x| > 1$ η σειρά αποκλίνει (κριτήριο λόγου). Για $|x| = 1$ η συμπεριφορά εξαρτάται από την τιμή του a . Για παράδειγμα, όταν $a = -1$, η σειρά αποκλίνει και στα δύο άκρα (γεωμετρική σειρά με λόγο x). Αποδεικνύεται ότι όταν $a = -1/2$ η σειρά συγκλίνει για $x = 1$ και αποκλίνει για $x = -1$, και όταν $a = 1/2$ (και γενικότερα όταν $a > 0$), η σειρά συγκλίνει και στα δύο άκρα.

7.2ζ' Η συνάρτηση $f(x) = \arctan x$, $|x| \leq 1$

Ξεκινάμε από την

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt.$$

Αντί να παραγωγίσουμε n φορές την \arctan στο 0, είναι ευκολότερο να ολοκληρώσουμε την

$$(7.2.33) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

οπότε

$$(7.2.34) \quad \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + (-1)^{n+1} \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Αν ορίσουμε

$$(7.2.35) \quad p_n(x) = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

έχουμε

$$(7.2.36) \quad |f(x) - p_n(x)| = \left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt \leq \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

οπότε, όταν $|x| \leq 1$, βλέπουμε ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = f(x)$, δηλαδή

$$(7.2.37) \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$$

για $x \in [-1, 1]$.

7.3 Ασκήσεις

Πρώτη Ομάδα

1. Έστω $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ πολυώνυμο βαθμού n και έστω $a \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι υπάρχουν $b_0, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ ώστε

$$p(x) = b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Δείξτε ότι

$$b_k = \frac{p^{(k)}(a)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

2. Γράψτε καθένα από τα παρακάτω πολυώνυμα στη μορφή $b_0 + b_1(x-3) + \dots + b_n(x-3)^n$:

$$p_1(x) = x^2 - 4x - 9, \quad p_2(x) = x^4 - 12x^3 + 44x^2 + 2x + 1, \quad p_3(x) = x^5.$$

3. Για κάθε μία από τις παρακάτω συναρτήσεις, να βρεθεί το πολυώνυμο Taylor $T_{n,f,a}$ που υποδεικνύεται.

$$\begin{aligned}(T_{3,f,0}) & : f(x) = \exp(\sin x). \\(T_{2n+1,f,0}) & : f(x) = (1+x^2)^{-1}. \\(T_{n,f,0}) & : f(x) = (1+x)^{-1}. \\(T_{4,f,0}) & : f(x) = x^5 + x^3 + x. \\(T_{6,f,0}) & : f(x) = x^5 + x^3 + x. \\(T_{5,f,1}) & : f(x) = x^5 + x^3 + x.\end{aligned}$$

4. Έστω $n \geq 1$ και $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ συναρτήσεις n φορές παραγωγίσιμες στο $x_0 \in (a, b)$ ώστε $f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $g(x_0) = g'(x_0) = \dots = g^{(n-1)}(x_0) = 0$ και $g^{(n)}(x_0) \neq 0$. Δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{g^{(n)}(x_0)}.$$

5. Έστω $n \geq 2$ και $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση n φορές παραγωγίσιμη στο $x_0 \in (a, b)$ ώστε $f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ και $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Δείξτε ότι:

(α) Αν ο n είναι άρτιος και $f^{(n)}(x_0) > 0$, τότε η f έχει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

(β) Αν ο n είναι άρτιος και $f^{(n)}(x_0) < 0$, τότε η f έχει τοπικό μέγιστο στο x_0 .

(γ) Αν ο n είναι περιττός, τότε η f δεν έχει τοπικό μέγιστο ούτε τοπικό ελάχιστο στο x_0 , αλλά το x_0 είναι σημείο καμπής για την f .

6. Αν $f(x) = \ln x$, $x > 0$, βρείτε την πλησιέστερη ευθεία και την πλησιέστερη παραβολή στο γράφημα της f στο σημείο $(e, 1)$.

7. Βρείτε το πολυώνυμο Taylor $T_{n,f,0}$ για τη συνάρτηση

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad (x \in \mathbb{R}).$$

8. Βρείτε το πολυώνυμο Taylor $T_{n,f,0}$ για τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως εξής: $f(0) = 0$ και

$$f(x) = e^{-1/x^2}, \quad x \neq 0.$$

9. Χρησιμοποιώντας το ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης $\arctan x$ ($-1 \leq x \leq 1$) υπολογίστε το άθροισμα

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)}.$$

10. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ άπειρες φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι $f''' = f$ και $f(0) = 1$, $f'(0) = f''(0) = 0$.

(α) Έστω $R > 0$. Δείξτε ότι υπάρχει $M = M(R) > 0$ ώστε: για κάθε $x \in [-R, R]$ και για κάθε $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$|f^{(k)}(x)| \leq M.$$

(β) Βρείτε το πολυώνυμο Taylor $T_{3n, f, 0}$ και, χρησιμοποιώντας το (α) και οποιονδήποτε τύπο υπολοίπου, δείξτε ότι

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k}}{(3k)!}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

11. Βρείτε προσεγγιστική τιμή, με σφάλμα μικρότερο του 10^{-6} , για καθέναν από τους αριθμούς

$$\sin 1, \quad \sin 2, \quad \sin \frac{1}{2}, \quad e, \quad e^2.$$

12. (α) Δείξτε ότι

$$\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$$

και

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}.$$

(β) Δείξτε ότι $\pi = 3.14159 \dots$ (με άλλα λόγια, βρείτε προσεγγιστική τιμή για τον αριθμό π με σφάλμα μικρότερο του 10^{-6}).

Κεφάλαιο 8

Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις

8.1 Ορισμός

Σε αυτό το κεφάλαιο, με I συμβολίζουμε ένα (κλειστό, ανοικτό ή ημιανοικτό, πεπερασμένο ή άπειρο) διάστημα στο \mathbb{R} .

Έστω $a, b \in \mathbb{R}$ με $a < b$. Στο επόμενο Λήμμα περιγράφουμε τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος $[a, b]$.

Λήμμα 8.1.1. Αν $a < b$ στο \mathbb{R} τότε

$$(8.1.1) \quad [a, b] = \{(1-t)a + tb : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Ειδικότερα, για κάθε $x \in [a, b]$ έχουμε

$$(8.1.2) \quad x = \frac{b-x}{b-a}a + \frac{x-a}{b-a}b.$$

Απόδειξη. Εύκολα ελέγχουμε ότι, για κάθε $t \in [0, 1]$ ισχύει

$$(8.1.3) \quad a \leq (1-t)a + tb = a + t(b-a) \leq b,$$

δηλαδή

$$(8.1.4) \quad \{(1-t)a + tb : 0 \leq t \leq 1\} \subseteq [a, b].$$

Αντίστροφα, κάθε $x \in [a, b]$ γράφεται στη μορφή

$$(8.1.5) \quad x = \frac{b-x}{b-a}a + \frac{x-a}{b-a}b.$$

Παρατηρώντας ότι $t := (x-a)/(b-a) \in [0, 1]$ και $1-t = (b-x)/(b-a)$, βλέπουμε ότι

$$(8.1.6) \quad [a, b] \subseteq \{(1-t)a + tb : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Τα σημεία $(1-t)a + tb$ του $[a, b]$ λέγονται *κυρτοί συνδυασμοί* των a και b . \square

Ορισμός 8.1.2. Έστω $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση.

(α) Η f λέγεται *κυρτή* αν

$$(8.1.7) \quad f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$$

για κάθε $a, b \in I$ και για κάθε $t \in \mathbb{R}$ με $0 < t < 1$ (παρατηρήστε ότι, αφού το I είναι διάστημα, το Λήμμα 8.1.1 δείχνει ότι το σημείο $(1-t)a + tb \in [a, b] \subseteq I$, δηλαδή η f ορίζεται καλά σε αυτό). Η γεωμετρική σημασία του ορισμού είναι η εξής: η χορδή που έχει σαν άκρα τα σημεία $(a, f(a))$ και $(b, f(b))$ δεν είναι ποθενά κάτω από το γράφημα της f .

(β) Η f λέγεται *γνησίως κυρτή* αν είναι κυρτή και έχουμε γνήσια ανισότητα στην (8.1.7) για κάθε $a < b$ στο I και για κάθε $0 < t < 1$.

(γ) Η $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται *κοίλη* (αντίστοιχα, γνησίως κοίλη) αν η $-f$ είναι κυρτή (αντίστοιχα, γνησίως κυρτή).

Παρατήρηση 8.1.3. Ισοδύναμοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να περιγραφεί η κυρτότητα της $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ είναι οι εξής:

(α) Αν $a, b, x \in I$ και $a < x < b$, τότε

$$(8.1.8) \quad f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

Παρατηρήστε ότι το δεξιό μέλος αυτής της ανισότητας ισούται με

$$(8.1.9) \quad f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a).$$

(β) Αν $a, b \in I$ και αν $t, s > 0$ με $t + s = 1$, τότε

$$(8.1.10) \quad f(ta + sb) \leq tf(a) + sf(b).$$

8.2 Κυρτές συναρτήσεις ορισμένες σε ανοικτό διάστημα

Σε αυτή την Παράγραφο μελετάμε ως προς τη συνέχεια και την παραγωγισιμότητα μια κυρτή συνάρτηση που ορίζεται σε ανοικτό διάστημα. Όλα τα αποτελέσματα που θα αποδείξουμε είναι συνέπειες του ακόλουθου «λήμματος των τριών χορδών»:

Πρόταση 8.2.1 (το λήμμα των τριών χορδών). Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Αν $y < x < z$ στο (a, b) , τότε

$$(8.2.1) \quad \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

Απόδειξη. Αφού η f είναι κυρτή, έχουμε

$$(8.2.2) \quad f(x) \leq \frac{z-x}{z-y}f(y) + \frac{x-y}{z-y}f(z).$$

Από αυτή την ανισότητα βλέπουμε ότι

$$(8.2.3) \quad f(x) - f(y) \leq \frac{y-x}{z-y}f(y) + \frac{x-y}{z-y}f(z) = \frac{x-y}{z-y}[f(z) - f(y)],$$

το οποίο αποδεικνύει την αριστερή ανισότητα στην (8.2.1). Ξεκινώντας πάλι από την (8.2.2), γράφουμε

$$(8.2.4) \quad f(x) - f(z) \leq \frac{z-x}{z-y}f(y) + \frac{x-z}{z-y}f(z) = -\frac{z-x}{z-y}[f(z) - f(y)],$$

απ' όπου προκύπτει η δεξιά ανισότητα στην (8.2.1). \square

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης την εξής απλή συνέπεια του λήμματος των τριών χορδών.

Λήμμα 8.2.2. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Αν $y < x < z < w$ στο (a, b) , τότε

$$(8.2.5) \quad \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(w) - f(z)}{w - z}.$$

Απόδειξη. Εφαρμόζοντας την Πρόταση 8.2.1 για τα σημεία $y < x < z$, παίρνουμε

$$(8.2.6) \quad \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

Εφαρμόζοντας πάλι την Πρόταση 8.2.1 για τα σημεία $x < z < w$, παίρνουμε

$$(8.2.7) \quad \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(w) - f(z)}{w - z}.$$

Έπεται το συμπέρασμα. \square

Θεώρημα 8.2.3. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Αν $x \in (a, b)$, τότε υπάρχουν οι πλευρικές παράγωγοι

$$(8.2.8) \quad f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{και} \quad f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Απόδειξη. Θα δείξουμε ότι υπάρχει η δεξιά πλευρική παράγωγος $f'_+(x)$ (με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε για την αριστερή πλευρική παράγωγο $f'_-(x)$). Θεωρούμε τη συνάρτηση $g_x : (x, b) \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται από την

$$(8.2.9) \quad g_x(z) := \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

Η g_x είναι αύξουσα: αν $x < z_1 < z_2 < b$, το λήμμα των τριών χορδών δείχνει ότι

$$(8.2.10) \quad g_x(z_1) = \frac{f(z_1) - f(x)}{z_1 - x} \leq \frac{f(z_2) - f(x)}{z_2 - x} = g_x(z_2).$$

Επίσης, αν θεωρήσουμε τυχόν $y \in (a, x)$, το λήμμα των τριών χορδών (για τα $y < x < z$) δείχνει ότι

$$(8.2.11) \quad \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} = g_x(z)$$

για κάθε $z \in (x, b)$, δηλαδή η g_x είναι κάτω φραγμένη. Άρα, υπάρχει το

$$(8.2.12) \quad \lim_{z \rightarrow x^+} g_x(z) = \lim_{z \rightarrow x^+} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Δηλαδή, υπάρχει η δεξιά πλευρική παράγωγος $f'_+(x)$. \square

Θεώρημα 8.2.4. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Οι πλευρικές παράγωγοι f'_-, f'_+ είναι αύξουσες στο (a, b) και $f'_- \leq f'_+$ στο (a, b) .

Απόδειξη. Έστω $x < y$ στο (a, b) . Για αρκετά μικρό θετικό h έχουμε $x \pm h, y \pm h \in (a, b)$ και $x + h < y - h$. Από την Πρόταση 8.2.1 και από το Λήμμα 8.2.2 βλέπουμε ότι

$$(8.2.13) \quad \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq \frac{f(y) - f(y-h)}{h} \leq \frac{f(y+h) - f(y)}{h}.$$

Παίρνοντας όρια καθώς $h \rightarrow 0^+$, συμπεραίνουμε ότι

$$(8.2.14) \quad f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y).$$

Οι ανισότητες $f'_-(x) \leq f'_-(y)$ και $f'_+(x) \leq f'_+(y)$ δείχνουν ότι οι f'_-, f'_+ είναι αύξουσες στο (a, b) . Η αριστερή ανισότητα στην (8.2.14) δείχνει ότι $f'_- \leq f'_+$ στο (a, b) . \square

Η ύπαρξη των πλευρικών παραγώγων εξασφαλίζει ότι κάθε κυρτή συνάρτηση $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο εσωτερικό του I :

Θεώρημα 8.2.5. Κάθε κυρτή συνάρτηση $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής.

Απόδειξη. Έστω $x \in (a, b)$. Τότε, για μικρά $h > 0$ έχουμε $x+h, x-h \in (a, b)$ και

$$(8.2.15) \quad f(x+h) = f(x) + \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot h \rightarrow f(x) + f'_+(x) \cdot 0 = f(x)$$

όταν $h \rightarrow 0^+$, ενώ, τελειώς ανάλογα,

$$(8.2.16) \quad f(x-h) = f(x) + \frac{f(x-h) - f(x)}{-h} \cdot (-h) \rightarrow f(x) + f'_-(x) \cdot 0 = f(x)$$

όταν $h \rightarrow 0^+$. Άρα, η f είναι συνεχής στο x . \square

8.3 Παραγωγίσιμες κυρτές συναρτήσεις

Στον Απειροστικό Λογισμό I δόθηκε ένας διαφορετικός ορισμός της κυρτότητας για μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Για κάθε $x \in (a, b)$, θεωρήσαμε την εφαπτομένη

$$(8.3.1) \quad u = f(x) + f'(x)(u - x)$$

του γραφήματος της f στο $(x, f(x))$ και είπαμε ότι η f είναι κυρτή στο (a, b) αν για κάθε $x \in (a, b)$ και για κάθε $y \in (a, b)$ έχουμε

$$(8.3.2) \quad f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x).$$

Δηλαδή, αν το γράφημα $\{(y, f(y)) : a < y < b\}$ βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη.

Το επόμενο θεώρημα δείχνει ότι, αν περιοριστούμε στην κλάση των παραγωγίσιμων συναρτήσεων, οι «δύο ορισμοί» συμφωνούν.

Θεώρημα 8.3.1. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Τα εξής είναι ισοδύναμα:

- (α) Η f είναι κυρτή.
- (β) Η f' είναι αύξουσα.
- (γ) Για κάθε $x, y \in (a, b)$ ισχύει η

$$(8.3.3) \quad f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x).$$

Απόδειξη. Υποθέτουμε ότι η f είναι κυρτή. Αφού η f είναι παραγωγίσιμη, έχουμε $f' = f'_- = f'_+$ στο (a, b) . Από το Θεώρημα 8.2.4 οι f'_-, f'_+ είναι αύξουσες, άρα η f' είναι αύξουσα.

Υποθέτουμε τώρα ότι η f' είναι αύξουσα. Έστω $x, y \in (a, b)$. Αν $x < y$, εφαρμόζοντας το θεώρημα μέσης τιμής στο $[x, y]$, βρίσκουμε $\xi \in (x, y)$ ώστε $f(y) = f(x) + f'(\xi)(y - x)$. Αφού $\xi > x$ και η f' είναι αύξουσα, έχουμε $f'(\xi) \geq f'(x)$. Αφού $y - x > 0$, έπεται ότι

$$(8.3.4) \quad f(y) = f(x) + f'(\xi)(y - x) \geq f(x) + f'(x)(y - x).$$

Αν $x > y$, εφαρμόζοντας το θεώρημα μέσης τιμής στο $[y, x]$, βρίσκουμε $\xi \in (y, x)$ ώστε $f(y) = f(x) + f'(\xi)(y - x)$. Αφού $\xi < x$ και η f' είναι αύξουσα, έχουμε $f'(\xi) \leq f'(x)$. Αφού $y - x < 0$, έπεται πάλι ότι

$$(8.3.5) \quad f(y) = f(x) + f'(\xi)(y - x) \geq f(x) + f'(x)(y - x).$$

Τέλος, υποθέτουμε ότι η (8.3.3) ισχύει για κάθε $x, y \in (a, b)$ και θα δείξουμε ότι η f είναι κυρτή. Έστω $x < y$ στο (a, b) και έστω $0 < t < 1$. Θέτουμε

$z = (1-t)x + ty$. Εφαρμόζοντας την υπόθεση για τα ζευγάρια x, z και y, z , παίρνουμε

$$(8.3.6) \quad f(x) \geq f(z) + f'(z)(x-z) \quad \text{και} \quad f(y) \geq f(z) + f'(z)(y-z).$$

Άρα,

$$\begin{aligned} (1-t)f(x) + tf(y) &\geq (1-t)f(z) + tf(z) + f'(z)[(1-t)(x-z) + t(y-z)] \\ &= f(z) + f'(z)[(1-t)x + ty - z] \\ &= f(z). \end{aligned}$$

Δηλαδή, $(1-t)f(x) + tf(y) \geq f((1-t)x + ty)$. □

Στην περίπτωση που η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο (a, b) , η ισοδυναμία των (α) και (β) στο Θεώρημα 8.3.1 δίνει έναν απλό χαρακτηρισμό της κυρτότητας μέσω της δεύτερης παραγώγου.

Θεώρημα 8.3.2. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση. Η f είναι κυρτή αν και μόνο αν $f''(x) \geq 0$ για κάθε $x \in (a, b)$.

Απόδειξη. Η f' είναι αύξουσα αν και μόνο αν $f'' \geq 0$ στο (a, b) . Όμως, στο Θεώρημα 8.3.1 είδαμε ότι η f' είναι αύξουσα αν και μόνο αν η f είναι κυρτή. □

8.4 Ανισότητα του Jensen

Η ανισότητα του Jensen αποδεικνύεται με επαγωγή και «γενικεύει» την ανισότητα του ορισμού της κυρτής συνάρτησης.

Πρόταση 8.4.1 (ανισότητα του Jensen). Έστω $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Αν $x_1, \dots, x_m \in I$ και $t_1, \dots, t_m \geq 0$ με $t_1 + \dots + t_m = 1$, τότε $\sum_{i=1}^m t_i x_i \in I$ και

$$(8.4.1) \quad f(t_1 x_1 + \dots + t_m x_m) \leq t_1 f(x_1) + \dots + t_m f(x_m).$$

Απόδειξη. Έστω $a = \min\{x_1, \dots, x_m\}$ και $b = \max\{x_1, \dots, x_m\}$. Αφού το I είναι διάστημα και $a, b \in I$, συμπεραίνουμε ότι $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq [a, b] \subseteq I$. Αφού $t_i \geq 0$ και $t_1 + \dots + t_m = 1$, έχουμε

$$(8.4.2) \quad a = (t_1 + \dots + t_m)a \leq t_1 x_1 + \dots + t_m x_m \leq (t_1 + \dots + t_m)b = b,$$

δηλαδή, $t_1 x_1 + \dots + t_m x_m \in I$.

Θα δείξουμε την (8.4.1) με επαγωγή ως προς m . Για $m = 1$ δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε, ενώ για $m = 2$ η (8.4.1) ικανοποιείται από τον ορισμό της κυρτής συνάρτησης.

Για το επαγωγικό βήμα υποθέτουμε ότι $m \geq 2$, $x_1, \dots, x_m, x_{m+1} \in I$ και $t_1, \dots, t_m, t_{m+1} \geq 0$ με $t_1 + \dots + t_m + t_{m+1} = 1$. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιος $t_i < 1$ (αλλιώς, η ανισότητα ισχύει τετριμμένα). Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι $t_{m+1} < 1$. Θέτουμε $t = t_1 + \dots + t_m = 1 - t_{m+1} > 0$. Αφού $x_1, \dots, x_m \in I$ και $\frac{t_1}{t} + \dots + \frac{t_m}{t} = 1$, η επαγωγική υπόθεση μας δίνει

$$(8.4.3) \quad x = \frac{t_1}{t}x_1 + \dots + \frac{t_m}{t}x_m \in I$$

και

$$(8.4.4) \quad tf(x) = tf\left(\frac{t_1}{t}x_1 + \dots + \frac{t_m}{t}x_m\right) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_mf(x_m).$$

Εφαρμόζοντας τώρα τον ορισμό της κυρτής συνάρτησης, παίρνουμε

$$(8.4.5) \quad f(tx + t_{m+1}x_{m+1}) \leq tf(x) + t_{m+1}f(x_{m+1}).$$

Συνδυάζοντας τις δύο προηγούμενες ανισότητες, έχουμε

$$\begin{aligned} f(t_1x_1 + \dots + t_mx_m + t_{m+1}x_{m+1}) &= f(tx + t_{m+1}x_{m+1}) \\ &\leq t_1f(x_1) + \dots + t_mf(x_m) \\ &\quad + t_{m+1}f(x_{m+1}). \quad \square \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας την ανισότητα του Jensen θα δείξουμε κάποιες κλασικές ανισότητες. Η πρώτη από αυτές γενικεύει την ανισότητα αριθμητικού-γεωμετρικού μέσου.

Ανισότητα αριθμητικού-γεωμετρικού μέσου. Έστω x_1, \dots, x_n και r_1, \dots, r_n θετικοί πραγματικοί αριθμοί με $r_1 + \dots + r_n = 1$. Τότε,

$$(8.4.6) \quad \prod_{i=1}^n x_i^{r_i} \leq \sum_{i=1}^n r_i x_i.$$

Απόδειξη. Η συνάρτηση $x \mapsto \ln x$ είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$. Αφού $r_i > 0$ και $r_1 + \dots + r_n = 1$, η ανισότητα του Jensen (για την κυρτή συνάρτηση $-\ln$) δείχνει ότι

$$(8.4.7) \quad r_1 \ln x_1 + \dots + r_n \ln x_n \leq \ln(r_1 x_1 + \dots + r_n x_n).$$

Δηλαδή,

$$(8.4.8) \quad \ln(x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n}) \leq \ln(r_1 x_1 + \dots + r_n x_n).$$

Το ζητούμενο προκύπτει άμεσα από το γεγονός ότι η εκθετική συνάρτηση $x \mapsto e^x$ είναι αύξουσα. \square

Ειδικές περιπτώσεις της προηγούμενης ανισότητας είναι οι εξής:

(α) Η κλασική ανισότητα αριθμητικού-γεωμετρικού μέσου

$$(8.4.9) \quad (x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$$

όπου $x_1, \dots, x_n > 0$, η οποία προκύπτει από την (8.4.6) αν πάρουμε $r_1 = \cdots = r_n = \frac{1}{n}$.

(β) Η **ανισότητα του Young**: Αν $x, y > 0$ και $t, s > 0$ με $t + s = 1$, τότε

$$(8.4.10) \quad x^t y^s \leq tx + sy.$$

Η (8.4.10) εμφανίζεται πολύ συχνά στην εξής μορφή: αν $x, y > 0$ και $p, q > 1$ με $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, τότε

$$(8.4.11) \quad xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$

Πράγματι, αρκεί να πάρουμε τους x^p, y^q στη θέση των x, y και τους $\frac{1}{p}, \frac{1}{q}$ στη θέση των t, s . Οι p και q λέγονται **συζυγείς εκθέτες**. Χρησιμοποιώντας αυτή την ανισότητα μπορούμε να δείξουμε την κλασική **ανισότητα του Hölder**: Έστω p, q συζυγείς εκθέτες. Αν a_1, \dots, a_n και b_1, \dots, b_n είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, τότε

$$(8.4.12) \quad \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

Απόδειξη. Θέτουμε $A = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p}$, $B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}$ και $x_i = a_i/A$, $y_i = b_i/B$. Τότε, η ζητούμενη ανισότητα (8.4.12) παίρνει τη μορφή

$$(8.4.13) \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq 1.$$

Από την (8.4.11) έχουμε

$$(8.4.14) \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i^p}{p} + \frac{y_i^q}{q} \right) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n y_i^q.$$

Παρατηρούμε ότι

$$(8.4.15) \quad \sum_{i=1}^n x_i^p = \frac{1}{A^p} \sum_{i=1}^n a_i^p = 1 \quad \text{και} \quad \sum_{i=1}^n y_i^q = \frac{1}{B^q} \sum_{i=1}^n b_i^q = 1.$$

Άρα,

$$(8.4.16) \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = 1.$$

Έπεται η (8.4.12). □.

Επιλέγοντας $p = q = 2$ παίρνουμε την **ανισότητα Cauchy-Schwarz**: αν a_1, \dots, a_n και b_1, \dots, b_n είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, τότε

$$(8.4.17) \quad \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{1/2}.$$

8.5 Ασκήσεις

Πρώτη Ομάδα

1. Έστω $f, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$. Υποθέτουμε ότι κάθε f_n είναι κυρτή συνάρτηση και ότι $f_n(x) \rightarrow f(x)$ για κάθε $x \in I$. Δείξτε ότι η f είναι κυρτή.

2. Έστω $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ ακολουθία κυρτών συναρτήσεων $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$. Ορίζουμε $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sup\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$. Αν η f είναι πεπερασμένη παντού στο I , τότε η f είναι κυρτή.

3. Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτές συναρτήσεις. Υποθέτουμε ακόμα ότι η g είναι αύξουσα. Δείξτε ότι η $g \circ f$ είναι κυρτή.

4. Έστω $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Δείξτε ότι

$$f(x_1 + \delta) - f(x_1) \leq f(x_2 + \delta) - f(x_2)$$

για κάθε $x_1 < x_2 \in I$ και $\delta > 0$ για το οποίο $x_1 + \delta, x_2 + \delta \in I$.

5. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Δείξτε με ένα παράδειγμα ότι η f δεν είναι αναγκαστικά συνάρτηση Lipschitz σε ολόκληρο το $[a, b]$, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η f είναι φραγμένη. Επίσης, δείξτε ότι η f δεν είναι αναγκαστικά συνεχής στο $[a, b]$.

6. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση και $\xi \in (a, b)$. Δείξτε ότι:

(α) αν η f έχει ολικό μέγιστο στο ξ τότε η f είναι σταθερή.

(β) αν η f έχει ολικό ελάχιστο στο ξ τότε η f είναι φθίνουσα στο (a, ξ) και αύξουσα στο (ξ, b) .

(γ) αν η f έχει τοπικό ελάχιστο στο ξ τότε έχει ολικό ελάχιστο στο ξ .

(δ) αν η f είναι γνησίως κυρτή, τότε έχει το πολύ ένα σημείο ολικού ελαχίστου.

7. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Αν η f είναι άνω φραγμένη, τότε είναι σταθερή.

8. Δείξτε ότι κάθε κυρτή συνάρτηση ορισμένη σε φραγμένο διάστημα είναι κάτω φραγμένη.

9. Έστω $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ κοίλη, αύξουσα, άνω φραγμένη και παραγωγίσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f'(x) = 0.$$

Δεύτερη Ομάδα

10. Δείξτε ότι αν η $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι κυρτή και $x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_m > 0$, τότε

$$(x_1 + \dots + x_m) f\left(\frac{y_1 + \dots + y_m}{x_1 + \dots + x_m}\right) \leq \sum_{i=1}^m x_i f\left(\frac{y_i}{x_i}\right).$$

Δείξτε ότι η $f(x) = (1 + x^p)^{1/p}$ είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$ όταν $p \geq 1$, και συμπεράνατε ότι

$$((x_1 + \dots + x_m)^p + (y_1 + \dots + y_m)^p)^{1/p} \leq \sum_{i=1}^m (x_i^p + y_i^p)^{1/p}.$$

11. Δείξτε ότι η συνάρτηση $-\sin x$ είναι κυρτή στο $[0, \pi]$. Χρησιμοποιώντας το δείξτε ότι η μέγιστη περίμετρος n -γώνου που εγγράφεται στο μοναδιαίο κύκλο είναι $2n \sin(\pi/n)$.

12. Έστω $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ θετικοί αριθμοί. Δείξτε ότι

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_n) \geq \left(1 + (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)^{1/n}\right)^n.$$

[Υπόδειξη: Παρατηρήστε ότι η $x \mapsto \ln(1 + e^x)$ είναι κυρτή.]

Τρίτη Ομάδα

13. Έστω $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ θετική κοίλη συνάρτηση. Δείξτε ότι η $1/f$ είναι κυρτή.

14. Έστω $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Δείξτε ότι για κάθε $k \geq 1$,

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \geq 0.$$

15. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι η f είναι κυρτή αν και μόνο αν

$$f(x) \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x+t) dt$$

για κάθε διάστημα $[x-h, x+h] \subset (a, b)$.

16. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση και $c \in (a, b)$. Δείξτε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο c αν και μόνο αν

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) + f(c-h) - 2f(c)}{h} = 0.$$

17. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή, μη αρνητική συνάρτηση με $f(0) = 0$. Ορίζουμε $F : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $F(0) = 0$ και

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

Δείξτε ότι η F είναι κυρτή.

Κεφάλαιο 9

Υποδείξεις για τις Ασκήσεις

9.1 Υπακολουθίες και ακολουθίες Cauchy

A. Ερωτήσεις κατανόησης

Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

1. Λάθος. Θεωρήστε την ακολουθία (a_n) με $a_{2k} = k$ και $a_{2k-1} = 1$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Τότε, $a_n > 0$ και η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη, όμως $a_n \rightarrow +\infty$ (αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε όλοι τελικά οι όροι της (a_n) να είναι μεγαλύτεροι από 2, το οποίο δεν ισχύει αφού όλοι οι περιττοί όροι της είναι ίσοι με 1).

2. Λάθος. Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα της προηγούμενης ερώτησης για να δείξετε ότι μπορεί να ισχύει η πρόταση «για κάθε $M > 0$ υπάρχουν άπειροι όροι της (a_n) που είναι μεγαλύτεροι από M » χωρίς να ισχύει η πρόταση « $a_n \rightarrow +\infty$ ».

Η άλλη κατεύθυνση είναι σωστή: αν $a_n \rightarrow +\infty$ τότε (από τον ορισμό) για κάθε $M > 0$ όλοι τελικά οι όροι της (a_n) είναι μεγαλύτεροι από M . Άρα, για κάθε $M > 0$ υπάρχουν άπειροι όροι της (a_n) που είναι μεγαλύτεροι από M .

3. Σωστό. Υποθέτουμε πρώτα ότι υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε $a_{k_n} \rightarrow +\infty$. Έστω $M > 0$. Αφού $a_{k_n} \rightarrow +\infty$, όλοι τελικά οι όροι a_{k_n} είναι μεγαλύτεροι από M . Οπότε, υπάρχουν άπειροι όροι της (a_n) που είναι μεγαλύτεροι από M . Αφού ο $M > 0$ ήταν τυχών, η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη.

Άλλος τρόπος: αν η (a_n) ήταν άνω φραγμένη, τότε και κάθε υπακολουθία της (a_n) θα ήταν άνω φραγμένη. Τότε όμως, η (a_n) δεν θα μπορούσε να έχει υπακολουθία η οποία να τείνει στο $+\infty$.

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη. Θα βρούμε επαγωγικά $k_1 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$ ώστε $a_{k_n} > n$. Τότε, για την υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) θα έχουμε $a_{k_n} \rightarrow +\infty$:

Αφού η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη, μπορούμε να βρούμε $k_1 \in \mathbb{N}$ ώστε $a_{k_1} > 1$. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε βρεί $k_1 < \dots < k_m$ ώστε $a_{k_j} > j$ για κάθε $j = 1, \dots, m$. Θέτουμε $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_{k_m}, m+1\}$. Αφού η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη, μπορούμε να βρούμε $k_{m+1} \in \mathbb{N}$ ώστε $a_{k_{m+1}} > M$. Από τον ορισμό του M έχουμε $a_{k_{m+1}} > m+1$ και $a_{k_{m+1}} > a_n$ για κάθε $n = 1, 2, \dots, k_m$. Συνεπώς, $k_{m+1} > k_m$. Αυτό ολοκληρώνει το επαγωγικό βήμα.

4. Σωστό. Υποθέτουμε ότι $a_n \rightarrow a$. Έστω $(b_n) = (a_{k_n})$ μια υπακολουθία της (a_n) και έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n \geq n_0$ ισχύει $|a_n - a| < \varepsilon$. Παρατηρήστε ότι $k_{n_0} \geq n_0$ (διότι η (k_n) είναι γνησίως αύξουσα ακολουθία φυσικών αριθμών). Τότε, για κάθε $n \geq n_0$ έχουμε $k_n \geq n_0$, άρα $|b_n - a| = |a_{k_n} - a| < \varepsilon$. Έπεται ότι $b_n \rightarrow a$.

5. Σωστό. Θυμηθείτε τον ορισμό του σημείου κορυφής μιας ακολουθίας (a_n) : η (a_n) έχει σημείο κορυφής τον όρο a_k αν $a_k \geq a_m$ για κάθε $m \geq k$.

Αφού η (a_n) δεν έχει φθίνουσα υπακολουθία, δεν μπορεί να έχει άπειρα σημεία κορυφής: πράγματι, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ ώστε οι όροι $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}, \dots$ να είναι σημεία κορυφής της (a_n) . Τότε,

$$a_{k_1} \geq a_{k_2} \geq \dots \geq a_{k_n} \geq \dots,$$

δηλαδή η υπακολουθία (a_{k_n}) είναι φθίνουσα.

Άρα, η (a_n) έχει πεπερασμένα το πλήθος σημεία κορυφής: Υπάρχει δηλαδή $k_1 \in \mathbb{N}$ (το τελευταίο σημείο κορυφής ή ο $k_1 = 1$ αν δεν υπάρχουν σημεία κορυφής) με την ιδιότητα: αν $n \geq k_1$, υπάρχει $n' > n$ ώστε $a_{n'} > a_n$.

Βρίσκουμε $k_2 > k_1$ ώστε $a_{k_1} < a_{k_2}$, κατόπιν βρίσκουμε $k_3 > k_2$ ώστε $a_{k_2} > a_{k_3}$ και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ ώστε

$$a_{k_1} < a_{k_2} < \dots < a_{k_n} < \dots.$$

Άρα, η (a_n) έχει τουλάχιστον μία γνησίως αύξουσα υπακολουθία.

6. Σωστό. Στην Άσκηση 23 παρακάτω αποδεικνύεται ότι αν η ακολουθία (a_n) δεν συγκλίνει στον a τότε υπάρχουν $\varepsilon > 0$ και υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $|a_{k_n} - a| \geq \varepsilon$. Αφού η (a_n) είναι φραγμένη, η (a_{k_n}) είναι επίσης φραγμένη. Από το θεώρημα Bolzano–Weierstrass η (a_{k_n}) έχει υπακολουθία $(a_{k_{l_n}})$ η οποία συγκλίνει σε κάποιον $b \in \mathbb{R}$. Όμως, $|a_{k_{l_n}} - a| \geq \varepsilon$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, άρα $|b - a| = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{k_{l_n}} - a| \geq \varepsilon$. Δηλαδή, $b \neq a$.

7. Λάθος. Από το θεώρημα Bolzano–Weierstrass, κάθε φραγμένη ακολουθία έχει συγκλίνουσα υπακολουθία.

8. Λάθος. Θεωρήστε την ακολουθία (a_n) με $a_{2k} = k$ και $a_{2k-1} = 1$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Η (a_n) δεν είναι φραγμένη, όμως η υπακολουθία (a_{2k-1}) είναι σταθερή (άρα, φραγμένη).

9. Σωστό. Θεωρήστε μια υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) . Αν $n \in \mathbb{N}$ τότε $k_n < k_{n+1}$. Η (a_n) είναι αύξουσα, άρα: αν $s, t \in \mathbb{N}$ και $s < t$ τότε $a_s \leq a_t$ (εξηγήστε γιατί). Παίρνοντας $s = k_n$ και $t = k_{n+1}$ συμπεραίνουμε ότι $a_{k_n} \leq a_{k_{n+1}}$.

10. Σωστό. Υποθέτουμε ότι η (a_n) είναι αύξουσα και ότι υπάρχει υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) η οποία συγκλίνει στον $a \in \mathbb{R}$.

Αφού $a_{k_n} \rightarrow a$, η (a_{k_n}) είναι φραγμένη. Συνεπώς, υπάρχει $M \in \mathbb{R}$ τέτοιος ώστε: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $a_{k_n} \leq M$. Θα δείξουμε ότι: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $a_n \leq M$. Τότε, η (a_n) είναι αύξουσα και άνω φραγμένη, άρα συγκλίνει.

Θεωρήστε τυχόντα $n \in \mathbb{N}$. Αφού $n \leq k_n$ και η (a_n) είναι αύξουσα, έχουμε $a_n \leq a_{k_n} \leq M$.

11. Σωστό. Θα βρούμε επαγωγικά $k_1 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$ ώστε $|a_{k_n}| < \frac{1}{n^3}$. Τότε, για την υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) θα έχουμε $n^2 a_{k_n} \rightarrow 0$ (εξηγήστε γιατί).

Αφού η $a_n \rightarrow 0$, μπορούμε να βρούμε $k_1 \in \mathbb{N}$ ώστε $|a_{k_1}| < 1$. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε βρεί $k_1 < \dots < k_m$ ώστε $|a_{k_j}| < \frac{1}{j^3}$ για κάθε $j = 1, \dots, m$. Θέτουμε $\varepsilon = \frac{1}{(m+1)^3} > 0$. Αφού η $a_n \rightarrow 0$, μπορούμε να βρούμε $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε $|a_n| < \frac{1}{(m+1)^3}$ για κάθε $n \geq n_0$. Ειδικότερα, υπάρχει $k_{m+1} > k_m$ ώστε $|a_{k_{m+1}}| < \frac{1}{(m+1)^3}$. Αυτό ολοκληρώνει το επαγωγικό βήμα.

12. Σωστό. Θέτουμε $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Από τον βασικό χαρακτηρισμό του supremum, για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $x = x(\varepsilon) \in A$ ώστε $1 - \varepsilon < x \leq 1$. Αφού $1 \notin A$, έχουμε την ισχυρότερη ανισότητα $1 - \varepsilon < x < 1$.

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω, θα βρούμε επαγωγικά $k_1 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$ ώστε $a_{k_1} < \dots < a_{k_n} < a_{k_{n+1}} < \dots$ και $1 - \frac{1}{n} < a_{k_n} < 1$. Τότε, για την γνησίως αύξουσα υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) θα έχουμε $a_{k_n} \rightarrow 1$.

Εφαρμόζοντας τον χαρακτηρισμό του supremum με $\varepsilon = 1$, βρίσκουμε $a_{k_1} \in A$ που ικανοποιεί την $0 < a_{k_1} < 1$.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε βρεί $k_1 < \dots < k_m$ ώστε $a_{k_1} < \dots < a_{k_m}$ και $1 - \frac{1}{j} < a_{k_j} < 1$ για κάθε $j = 1, \dots, m$. Θέτουμε $s = \max\{1 - \frac{1}{m+1}, a_1, a_2, \dots, a_{k_m}\}$. Αφού $s < 1$, μπορούμε λοιπόν να βρούμε $a_{k_{m+1}} \in A$ που ικανοποιεί την $s < a_{k_{m+1}} < 1$. Τότε, $k_{m+1} > k_m$, $a_{k_m} < a_{k_{m+1}}$ και $1 - \frac{1}{m+1} < a_{k_{m+1}} < 1$. Αυτό ολοκληρώνει το επαγωγικό βήμα.

13. Σωστό. Αν $a_n \rightarrow a$ τότε οι υπακολουθίες (a_{2k}) και (a_{2k-1}) συγκλίνουν στον a . Από την υπόθεση ότι $a_{n+2} = a_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, βλέπουμε ότι οι (a_{2k}) και (a_{2k-1}) είναι σταθερές ακολουθίες: υπάρχουν $x, y \in \mathbb{R}$ ώστε

$$x = a_1 = a_3 = a_5 = \dots \quad \text{και} \quad y = a_2 = a_4 = a_6 = \dots.$$

Από τις $a_{2k-1} \rightarrow x$ και $a_{2k} \rightarrow y$ έπεται ότι $x = y = a$. Άρα, η (a_n) είναι σταθερή.

B. Βασικές ασκήσεις

1. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε βρεί φυσικούς $k_1 < \dots < k_m$ που ικανοποιούν τα εξής:

$$0 < a_{k_m} < a_{k_{m-1}} < \dots < a_{k_1} \quad \text{και} \quad 0 < a_{k_m} < \frac{1}{m}.$$

Θέτουμε $\varepsilon_{m+1} = \min \{a_1, \dots, a_{k_m}, \frac{1}{m+1}\} > 0$. Αφού $\inf(A) = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0$ και $\varepsilon_{m+1} > 0$, υπάρχει $k_{m+1} \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε $a_{k_{m+1}} < \varepsilon_{m+1}$. Από τον ορισμό του ε_{m+1} έπεται ότι (εξηγήστε γιατί):

$$(\alpha) \quad k_m < k_{m+1}, \quad (\beta) \quad a_{k_{m+1}} < a_{k_m}, \quad (\gamma) \quad a_{k_{m+1}} < \frac{1}{m+1}.$$

Έτσι ορίζεται επαγωγικά μια γνησίως φθίνουσα υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) η οποία συγκλίνει στο 0.

2. Υποθέτουμε ότι οι υπακολουθίες (a_{2k}) και (a_{2k-1}) συγκλίνουν στον a .

Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει $n_1 \in \mathbb{N}$ με την ιδιότητα: για κάθε $k \geq n_1$ ισχύει $|a_{2k} - a| < \varepsilon$. Επίσης, υπάρχει $n_2 \in \mathbb{N}$ με την ιδιότητα: για κάθε $k \geq n_2$ ισχύει $|a_{2k-1} - a| < \varepsilon$. Αν θέσουμε $n_0 = \max\{2n_1, 2n_2 - 1\}$ τότε για κάθε $n \geq n_0$ ισχύει $|a_n - a| < \varepsilon$.

[Πράγματι, παρατηρήστε ότι αν ο n είναι άρτιος τότε $n = 2k$ για κάποιον $k \geq n_1$ ενώ αν ο n είναι περιττός τότε $n = 2k - 1$ για κάποιον $k \geq n_2$.]

Αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, έπεται ότι $a_n \rightarrow a$.

Το αντίστροφο είναι απλό: έχουμε δει ότι αν μια ακολουθία (a_n) συγκλίνει στον $a \in \mathbb{R}$ τότε κάθε υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) συγκλίνει στον a .

3. Ας υποθέσουμε ότι $a_{2k} \rightarrow x$, $a_{2k-1} \rightarrow y$ και $a_{3k} \rightarrow z$. Παρατηρήστε ότι:

(i) Η (a_{6k}) είναι ταυτόχρονα υπακολουθία της (a_{2k}) και υπακολουθία της (a_{3k}) .

Άρα, η (a_{6k}) συγκλίνει και $x = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{6k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k} = z$.

(ii) Η (a_{6k-3}) είναι ταυτόχρονα υπακολουθία της (a_{2k-1}) και υπακολουθία της (a_{3k}) . Άρα, η (a_{6k-3}) συγκλίνει και $y = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{6k-3} =$

$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k} = z$.

Έπεται ότι $x = y = z$. Αφού οι (a_{2k}) και (a_{2k-1}) έχουν το ίδιο όριο, η Άσκηση 19 δείχνει ότι η (a_n) συγχλίνει.

4. Δείξτε διαδοχικά ότι:

- (α) Η (a_{2n}) είναι αύξουσα και άνω φραγμένη από τον a_1 ενώ η (a_{2n-1}) είναι φθίνουσα και κάτω φραγμένη από τον a_2 .
- (β) Υπάρχουν $a, b \in \mathbb{R}$ τέτοιοι ώστε $a_{2n} \rightarrow a$ και $a_{2n-1} \rightarrow b$.
- (γ) $a = b$.
- (δ) $a_n \rightarrow a = b$.
- (ε) $a_{2n} \leq a \leq a_{2n-1}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

5. Δείξτε τις ισοδυναμίες $(1) \iff (2) \iff (3) \iff (4)$:

- (1) Η ακολουθία (a_n) δεν συγχλίνει στον a .
- (2) Υπάρχει $\varepsilon > 0$ ώστε άπειροι όροι a_m της (a_n) να ικανοποιούν την $|a_m - a| \geq \varepsilon$.
- (3) Υπάρχουν $\varepsilon > 0$ και φυσικοί αριθμοί $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ ώστε: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $|a_{k_n} - a| \geq \varepsilon$.
- (4) Υπάρχουν $\varepsilon > 0$ και υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $|a_{k_n} - a| \geq \varepsilon$.

6. (\implies) Υποθέστε πρώτα ότι $a_n \rightarrow a$. Αν (a_{k_n}) είναι μια υπακολουθία της (a_n) τότε $a_{k_n} \rightarrow a$. Άρα, όλες οι υπακολουθίες της (a_{k_n}) συγχλίνουν κι αυτές στον a .

(\impliedby) Με απαγωγή σε άτοπο: υποθέστε ότι η (a_n) δεν συγχλίνει στον a . Από την Άσκηση 23, υπάρχουν $\varepsilon > 0$ και υπακολουθία (a_{k_n}) της (a_n) ώστε: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει $|a_{k_n} - a| \geq \varepsilon$. Τότε, αν πάρουμε οποιαδήποτε υπακολουθία της (a_{k_n}) , όλοι οι όροι της θα είναι ε -μακριά από τον a . Δηλαδή, η (a_{k_n}) δεν έχει υπακολουθία που να συγχλίνει στον a .

7. Παρατηρήστε ότι: για κάθε $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Ας υποθέσουμε ότι η ακολουθία $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ είναι ακολουθία Cauchy. Τότε, παίρνοντας $\varepsilon = \frac{1}{4} > 0$, μπορούμε να βρούμε $n_0 \in \mathbb{N}$ με την ιδιότητα: για κάθε $m, n \geq n_0$ ισχύει $|a_m - a_n| < \frac{1}{4}$.

Πάρτε $n \geq n_0$ και $m = 2n \geq n_0$. Τότε, $|a_{2n} - a_n| < \frac{1}{4}$. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει, διότι

$$\begin{aligned} |a_{2n} - a_n| &= \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Εξηγήστε τώρα τα εξής:

- (α) Αφού η (a_n) δεν είναι ακολουθία Cauchy, η (a_n) δεν συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό.
- (β) Αφού η (a_n) είναι αύξουσα και δεν συγκλίνει, η (a_n) δεν είναι άνω φραγμένη.
- (γ) Αφού η (a_n) είναι αύξουσα και δεν είναι άνω φραγμένη, αναγκαστικά $a_n \rightarrow +\infty$.

8. Από την $|a_{n+1} - a_n| \leq \mu|a_n - a_{n-1}|$ έπεται (εξηγήστε γιατί) ότι: για κάθε $n \geq 2$ ισχύει

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \mu^{n-1}|a_2 - a_1| = |b - a| \cdot \mu^{n-1}.$$

Αν λοιπόν $m, n \in \mathbb{N}$ και $m > n$, τότε

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &\leq |a_m - a_{m-1}| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq |b - a| (\mu^{n-1} + \dots + \mu^{m-2}) \\ &= |b - a| \cdot \mu^{n-1} \cdot \frac{1 - \mu^{m-n}}{1 - \mu} \\ &\leq \frac{|b - a| \mu^{n-1}}{1 - \mu} \\ &= \frac{|b - a|}{\mu(1 - \mu)} \cdot \mu^n. \end{aligned}$$

Θεωρήστε $\varepsilon > 0$ και βρείτε $n_0 \in \mathbb{N}$ που ικανοποιεί την $\frac{|b-a|}{\mu(1-\mu)} \mu^{n_0} < \varepsilon$. Τέτοιος n_0 υπάρχει γιατί $\mu^n \rightarrow 0$ όταν $n \rightarrow \infty$. Τότε, αν $m > n \geq n_0$,

$$|a_m - a_n| \leq \frac{|b - a|}{\mu(1 - \mu)} \cdot \mu^n \leq \frac{|b - a|}{\mu(1 - \mu)} \cdot \mu^{n_0} < \varepsilon.$$

Δηλαδή, η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy.

9. Παρατηρήστε ότι: για κάθε $n \geq 2$ ισχύει

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + a_{n-1}}{2} - a_n = -\frac{a_n - a_{n-1}}{2},$$

δηλαδή

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2}|a_n - a_{n-1}|.$$

Από την Άσκηση 26, η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy.

10. Έστω $\varepsilon > 0$ και έστω $n_0 \in \mathbb{N}$. Δείξτε ότι τα εξής είναι ισοδύναμα:

- (α) Για κάθε $m, n \geq n_0$ ισχύει $|a_m - a_n| \leq \varepsilon$.
- (β) Για κάθε $m > n \geq n_0$ ισχύει $|a_m - a_n| \leq \varepsilon$.
- (γ) Για κάθε $n \geq n_0$ και κάθε $k \in \mathbb{N}$ ισχύει $|a_{n+k} - a_n| \leq \varepsilon$.
- (δ) Για κάθε $n \geq n_0$ ισχύει $b_n := \sup\{|a_{n+k} - a_n| : k \in \mathbb{N}\} \leq \varepsilon$.

Χρησιμοποιώντας την ισοδυναμία των (α) και (δ) δείξτε ότι η (a_n) είναι ακολουθία Cauchy (ισοδύναμα, συγκλίνει) αν και μόνο αν $b_n \rightarrow 0$.

11. Δείξτε πρώτα ότι η (a_n) ορίζεται καλά και $a_n > 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Επίσης, δείξτε ότι αν $a_n \rightarrow x$ τότε $x = \sqrt{3}$.

(i) Υποθέστε ότι $0 < a_1 < \sqrt{3}$. Δείξτε διαδοχικά τα εξής:

- (α) $a_2 > \sqrt{3}$.
- (β) Για κάθε $n \in \mathbb{N}$ ισχύει η $a_{n+2} = \frac{3+2a_n}{2+a_n}$.
- (γ) Για κάθε $k \in \mathbb{N}$ ισχύουν οι $a_{2k-1} < \sqrt{3}$ και $a_{2k-1} < a_{2k+1}$.
- (δ) Για κάθε $k \in \mathbb{N}$ ισχύουν οι $a_{2k} > \sqrt{3}$ και $a_{2k+2} < a_{2k}$.

Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 21 δείξτε ότι οι (a_{2k-1}) και (a_{2k}) συγκλίνουν. Χρησιμοποιώντας την αναδρομική σχέση ανάμεσα στον a_{n+2} και τον a_n δείξτε ότι $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \sqrt{3}$. Από την Άσκηση 19 έπεται ότι $a_n \rightarrow \sqrt{3}$.

- (ii) Εξετάστε με τον ίδιο τρόπο την περίπτωση $a_1 > \sqrt{3}$.
- (iii) Τέλος, δείξτε ότι αν $a_1 = \sqrt{3}$ τότε έχουμε $a_n = \sqrt{3}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

9.2 Σειρές πραγματικών αριθμών

A. Ερωτήσεις κατανόησης

1. *Λάθος.* Η ακολουθία $a_k = \frac{1}{k} \rightarrow 0$, όμως η ακολουθία $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ δεν είναι φραγμένη (τείνει στο $+\infty$).

2. *Λάθος.* Αν θεωρήσουμε την ακολουθία $a_k = (-1)^{k-1}$, τότε έχουμε $s_n = 1$ αν ο n είναι περιττός και $s_n = 0$ αν ο n είναι άρτιος. Δηλαδή, η ακολουθία $s_n = a_1 + \dots + a_n$ είναι φραγμένη. Όμως, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}$ αποκλίνει, διότι $a_k \not\rightarrow 0$.

3. *Λάθος.* Θεωρήστε την $a_k = \frac{1}{k}$. Τότε, $|a_k| = \frac{1}{k} \rightarrow 0$ και η $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει στο $+\infty$, δηλαδή η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ δεν συγκλίνει απολύτως.

4. *Σωστό.* Αποδείξαμε (στη θεωρία) ότι αν μια σειρά συγκλίνει απολύτως τότε συγκλίνει.

5. *Λάθος.* Θεωρήστε την $a_k = \frac{1}{k}$. Τότε, $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k}{k+1} < 1$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Όμως, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει.

6. *Λάθος.* Θεωρήστε την $a_k = \frac{1}{k^2}$. Τότε, $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{(k+1)^2} = 1$. Όμως, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει.

7. *Σωστό.* Αν $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow +\infty$, υπάρχει $N \in \mathbb{N}$ ώστε $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1$ για κάθε $k \geq N$. Αφού η (a_k) έχει θετικούς όρους, συμπεραίνουμε ότι $0 < a_N \leq a_{N+1} \leq \dots \leq a_k \leq \dots$, δηλαδή $a_k \not\rightarrow 0$. Συνεπώς, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει.

8. *Λάθος.* Αν θεωρήσουμε την $a_k = \frac{(-1)^k}{k}$, τότε $a_k \rightarrow 0$. Όμως, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει.

9. *Λάθος.* Θεωρήστε την $a_k = \frac{1}{k^2}$. Τότε, $a_k > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει. Όμως, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{a_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει.

10. *Λάθος.* Από το κριτήριο του Dirichlet, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ συγκλίνει. Όμως, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει.

11. Σωστό. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει, έχουμε $a_k \rightarrow 0$. Άρα, υπάρχει $m \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $k \geq m$, $0 \leq a_k \leq 1$. Τότε, για κάθε $k \geq m$ έχουμε $0 \leq a_k^2 \leq a_k$. Από το κριτήριο σύγκρισης, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ συγχλίνει.

12. Λάθος. Θέτουμε $a_k = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2k)}{k!}$. Τότε, $a_k > 0$ και

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{[2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2k)(2k+2)]k!}{[2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2k)](k+1)!} = \frac{2k+2}{k+1} = 2 \rightarrow 2 > 1.$$

Από το κριτήριο του λόγου, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2k)}{k!}$ αποκλίνει.

13. Σωστό. Παρατηρούμε ότι $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k(1+k^2)^p}{k^{2p+1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^p = 1 > 0$. Από το οριακό κριτήριο σύγκρισης, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} k(1+k^2)^p$ συγχλίνει αν και μόνο αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{-(2p+1)}}$ συγχλίνει. Αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν $-(2p+1) > 1$, δηλαδή αν και μόνο αν $p < -1$.

B. Βασικές ασκήσεις

1. Το n -οστό μερικό άθροισμα της σειράς ισούται με

$$s_n = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \cdots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1}.$$

Αφού $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = b$, βλέπουμε ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = b_1 - b$. Συνεπώς, $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b$.

2. (α) Θέτουμε $b_k = \frac{1}{2k-1}$. Παρατηρούμε ότι

$$b_k - b_{k+1} = \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} = \frac{2}{(2k-1)(2k+1)}.$$

Έχουμε $b_1 = 1$ και $b_k \rightarrow 0$. Από την Άσκηση 1,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2}(b_1 - b) = \frac{1}{2}.$$

(β) Γνωρίζουμε ότι αν $0 < x < 1$, τότε

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k = x \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}.$$

Συνεπώς,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k + 3^k}{6^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1/3}{1 - (1/3)} + \frac{1/2}{1 - (1/2)} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

(γ) Γράφουμε

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k^2 + k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) = 1 - 0 = 1,$$

χρησιμοποιώντας την Άσκηση 1 για την $b_k = \frac{1}{\sqrt{k}} \rightarrow 0$.

3. Παρατηρούμε ότι

$$\frac{1}{2k(k+1)} - \frac{1}{2(k+1)(k+2)} = \frac{2(k+1)}{2k(k+2)(k+1)^2} = \frac{1}{k(k+1)(k+2)}.$$

Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 1 για την $b_k = \frac{1}{2k(k+1)} \rightarrow 0$, συμπεραίνουμε ότι

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = b_1 = \frac{1}{4}.$$

4. Παρατηρούμε ότι: αν $|x| < 1$ τότε $\frac{1}{1+x^k} \rightarrow 1 \neq 0$, άρα η σειρά αποκλίνει. Αν $x = 1$, τότε $\frac{1}{1+x^k} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$, άρα η σειρά αποκλίνει. Αν $x = -1$, ο k -οστός όρος δεν ορίζεται στην περίπτωση που ο k είναι περιττός, άρα δεν έχει νόημα να εξετάσουμε τη σύγκλιση της σειράς.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι $|x| > 1$. Τότε, συγκρίνοντας με την $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|x|^k}$ (η οποία συγκλίνει ως γεωμετρική σειρά με λόγο $\frac{1}{|x|} < 1$) βλέπουμε ότι

$$\frac{1}{|1+x^k|} \leq \frac{1}{|x|^k - 1} \leq \frac{|x|}{|x| - 1} \frac{1}{|x|^k}$$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$ (ελέγξτε το, χρησιμοποιώντας την $|x| > 1$). Από το κριτήριο σύγκρισης, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^k}$ συγκλίνει απολύτως.

5. Εξετάζουμε μερικές από αυτές:

(α) $\sum_{k=1}^{\infty} k^k x^k$: Με το κριτήριο του λόγου. Αν $x \neq 0$, έχουμε

$$\frac{(k+1)^{k+1} |x|^{k+1}}{k^k |x|^k} = (k+1) \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k |x| \rightarrow +\infty.$$

Συνεπώς, η σειρά αποκλίνει. Η σειρά συγκλίνει μόνο αν $x = 0$.

Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήγατε αν χρησιμοποιούσατε το κριτήριο της ρίζας: παρατηρήστε ότι $\sqrt[k]{k^k|x|^k} = k|x| \rightarrow +\infty$ αν $x \neq 0$.

(β) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$: Με το κριτήριο του λόγου. Αν $x \neq 0$, έχουμε

$$\frac{|x|^{k+1}/(k+1)!}{|x|^k/k!} = \frac{|x|}{k+1} \rightarrow 0 < 1.$$

Συνεπώς, η σειρά συγκλίνει απολύτως. Η σειρά συγκλίνει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

(στ) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k x^k}{k^2}$: Με το κριτήριο του λόγου. Αν $x \neq 0$, έχουμε

$$\frac{2^{k+1}|x|^{k+1}/(k+1)^2}{2^k|x|^k/k^2} = 2|x| \frac{k^2}{(k+1)^2} \rightarrow 2|x|.$$

Συνεπώς, η σειρά συγκλίνει απολύτως αν $|x| < 1/2$ και αποκλίνει αν $|x| > 1/2$. Εξετάζουμε τη σύγκλιση χωριστά στις περιπτώσεις $x = \pm 1/2$. Παρατηρώντας ότι οι σειρές $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2}$ και $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνουν, συμπεραίνουμε τελικά ότι η σειρά συγκλίνει αν και μόνο αν $|x| \leq 1/2$.

6. (α) Παρατηρήστε ότι το $(2n)$ -οστό μερικό άθροισμα της σειράς

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots$$

ισούται με

$$s_{2n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Αφού η σειρά έχει θετικούς όρους και $s_{2n} \leq \frac{3}{2}$ για κάθε n , έπεται ότι η σειρά συγκλίνει (εξηγήστε γιατί).

(β) Παρατηρήστε ότι το $(2n)$ -οστό μερικό άθροισμα της σειράς

$$\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{64} + \dots$$

ισούται με

$$s_{2n} = \sum_{k=0}^{2n-1} \frac{1}{2^k} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$

Αφού η σειρά έχει θετικούς όρους και $s_{2n} \leq 2$ για κάθε n , έπεται ότι η σειρά συγκλίνει.

7. (α) Αν $a_k = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, τότε $s_n = a_1 + \dots + a_n = \sqrt{n+1} - 1 \rightarrow +\infty$, άρα η σειρά αποκλίνει.

(β) Έχουμε $a_k = \sqrt{1+k^2} - k = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}+k}$. Παρατηρούμε ότι $\frac{a_k}{1/k} = \frac{k}{\sqrt{1+k^2}+k} \rightarrow \frac{1}{2} > 0$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει από το οριακό κριτήριο σύγκρισης.

(γ) Έχουμε $a_k = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{k} = \frac{1}{k(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})}$. Παρατηρούμε ότι $\frac{a_k}{1/k^{3/2}} \rightarrow \frac{1}{2} > 0$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3/2}}$ συγκλίνει, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει από το οριακό κριτήριο σύγκρισης.

(δ) Χρησιμοποιούμε το κριτήριο της ρίζας: έχουμε $\sqrt[k]{a_k} = \sqrt[k]{k} - 1 \rightarrow 0 < 1$, άρα η σειρά συγκλίνει.

8. (α) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+\sqrt{k}}{2k^3-1}$: παρατηρούμε ότι

$$\frac{a_k}{1/k^2} = \frac{k^3 + k^2\sqrt{k}}{2k^3 - 1} \rightarrow \frac{1}{2} > 0.$$

Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει από το οριακό κριτήριο σύγκρισης.

(β) $\sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt[k]{k} - 1)$: θέτουμε $\theta_k = \sqrt[k]{k} - 1 \geq 0$. Τότε, $k = (1 + \theta_k)^k$. Παρατηρούμε ότι, για κάθε $k \geq 3$,

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e < 3 \leq k = (1 + \theta_k)^k.$$

Άρα, $\theta_k > \frac{1}{k}$ για κάθε $k \geq 3$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \theta_k$ αποκλίνει κι αυτή.

(γ) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos^2 k}{k^2}$: παρατηρούμε ότι $|a_k| \leq \frac{1}{k^2}$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει από το κριτήριο σύγκρισης.

(δ) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k}$: χρησιμοποιούμε το κριτήριο λόγου. Έχουμε

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+1)!k^k}{k!(k+1)^{k+1}} = \frac{k^k}{(k+1)^k} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k} \rightarrow \frac{1}{e} < 1,$$

άρα η σειρά συγκλίνει.

9. (α) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-k^2}$: χρησιμοποιούμε το κριτήριο της ρίζας. Έχουμε $\sqrt[k]{a_k} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-k} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$, άρα η σειρά συγχλίνει.

(β) $\sum_{k=1}^{\infty} p^k k^p$: χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου. Έχουμε

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = p \frac{(k+1)^p}{k^p} \rightarrow p,$$

άρα η σειρά συγχλίνει αν $0 < p < 1$ και αποκλίνει αν $p > 1$. Για $p = 1$ παίρνουμε τη σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} k$, η οποία αποκλίνει ($k \neq 0$ όταν $k \rightarrow \infty!$).

(γ) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^p - k^q}$: θεωρούμε την $b_k = 1/k^p$. Αφού $q < p$, έχουμε $\frac{a_k}{b_k} = \frac{1}{1 - k^{-(p-q)}} \rightarrow 1 > 0$. Από το οριακό κριτήριο σύγκρισης, η σειρά μας συγχλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ συγχλίνει, δηλαδή αν και μόνο αν $p > 1$ (και $0 < q < p$).

(δ) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1+\frac{1}{k}}}$: θεωρούμε την $b_k = 1/k$. Έχουμε $\frac{a_k}{b_k} = \frac{k}{k^{\frac{1}{k}}} = \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \rightarrow 1 > 0$. Από το οριακό κριτήριο σύγκρισης, η σειρά αποκλίνει (διότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ αποκλίνει).

(ε) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p^k - q^k}$: θεωρούμε την $b_k = 1/p^k$. Αφού $0 < q < p$, έχουμε $\frac{a_k}{b_k} = \frac{1}{1 - (q/p)^k} \rightarrow 1 > 0$ (διότι $(p/q)^k \rightarrow 0$ αφού $0 < p/q < 1$). Από το οριακό κριτήριο σύγκρισης, η σειρά μας συγχλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p^k}$ συγχλίνει, δηλαδή αν και μόνο αν $p > 1$ (και $0 < q < p$).

(στ) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^k}{2^k}$: παρατηρούμε ότι $0 < a_k \leq \frac{3}{2^k}$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ συγχλίνει, η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει από το κριτήριο σύγκρισης.

(ζ) $\sum_{k=1}^{\infty} k^p \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)$: παρατηρούμε ότι

$$a_k = k^p \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}\sqrt{k+1}} = \frac{k^p}{\sqrt{k}\sqrt{k+1}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})}.$$

Θεωρούμε την $b_k = \frac{k^p}{k^{3/2}}$ και παρατηρούμε ότι $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow \frac{1}{2} > 0$. Από το οριακό κριτήριο σύγκρισης, η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγχλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{(3/2)-p}}$ συγχλίνει. Δηλαδή, αν $\frac{3}{2} - p > 1$, το οποίο ισχύει αν $p < \frac{1}{2}$.

(η) $\sum_{k=1}^{\infty} k^p (\sqrt{k+1} - 2\sqrt{k} + \sqrt{k-1})$: παρατηρούμε ότι, για $k \geq 2$,

$$\begin{aligned} a_k &= k^p (\sqrt{k+1} - \sqrt{k} + \sqrt{k-1} - \sqrt{k}) \\ &= k^p \left(\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{k-1}} \right) \\ &= -2k^{p-\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{k-1}\sqrt{k+1}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1})}. \end{aligned}$$

Δηλαδή, η $(a_k)_{k \geq 2}$ έχει αρνητικούς όρους. Άρα, συγκλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{k=2}^{\infty} (-a_k)$ συγκλίνει (εξηγήστε γιατί). Θεωρούμε την $b_k = \frac{k^p}{k^2}$ και παρατηρούμε ότι $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow 1 > 0$. Από το οριακό κριτήριο σύγκρισης, η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει αν και μόνο αν η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2-p}}$ συγκλίνει. Δηλαδή, αν $2-p > 1$, το οποίο ισχύει αν $p < 1$.

10. Παρατηρήστε ότι $0 \leq \frac{a_k}{1+k^2 a_k} \leq \frac{1}{k^2}$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Αυτό είναι φανερό αν $a_k = 0$, ενώ αν $a_k > 0$ μπορείτε να γράψετε

$$0 < \frac{a_k}{1+k^2 a_k} < \frac{a_k}{k^2 a_k} = \frac{1}{k^2}.$$

Αφού η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ συγκλίνει, το συμπέρασμα προκύπτει από το κριτήριο σύγκρισης.

11. Η σειρά έχει θετικούς όρους. Αρκεί να δείξετε ότι η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων είναι άνω φραγμένη. Παρατηρήστε ότι για κάθε $m \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\begin{aligned} s_{m^2} &= \sum_{k=1}^{m^2} a_k = \sum_{k=1}^m a_{k^2} + \sum_{\substack{k \leq m^2 \\ k \neq s^2}} a_k \\ &\leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} + \sum_{k=1}^{m^2} \frac{1}{k^2} \\ &\leq 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = M < +\infty. \end{aligned}$$

Αν $n \in \mathbb{N}$, τότε $s_n \leq s_{n^2} \leq M$. Δηλαδή, η (s_n) είναι άνω φραγμένη.

12. Αν $p > 0$, τότε η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^p}$ συγκλίνει από το κριτήριο του Dirichlet. Αν $p \leq 0$, τότε $(-1)^k \frac{1}{k^p} \not\rightarrow 0$, άρα η σειρά αποκλίνει.

13. Γράφουμε $(-1)^n(s - s_n) = (-1)^n \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{n+k-1} a_k$.

Παρατηρήστε ότι: για κάθε $m \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=n+1}^{n+2m} (-1)^{n+k-1} a_k = (a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + (a_{n+2m-1} - a_{n+2m}) \geq 0,$$

άρα

$$(-1)^n(s - s_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{n+2m} (-1)^{n+k-1} a_k \geq 0.$$

Επίσης,

$$\sum_{k=n+1}^{n+2m+1} (-1)^{n+k-1} a_k = a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - \cdots - (a_{n+2m} - a_{n+2m+1}) \leq a_{n+1},$$

άρα

$$(-1)^n(s - s_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{n+2m+1} (-1)^{n+k-1} a_k \leq a_{n+1}.$$

14. Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, η (s_n) είναι ακολουθία Cauchy.

Άρα, υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε: αν $n > m \geq n_0$ τότε

$$a_{m+1} + \cdots + a_n = |s_n - s_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ειδικότερα, αν $n \geq 2n_0$, παίρνοντας $m = n_0$ και χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι η (a_n) είναι φθίνουσα, έχουμε

$$\frac{\varepsilon}{2} > a_{n_0+1} + \cdots + a_n \geq (n - n_0)a_n \geq \frac{na_n}{2},$$

διότι $n - n_0 \geq \frac{n}{2}$. Δηλαδή, αν $n \geq 2n_0$ έχουμε $na_n < \varepsilon$. Έπεται ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} (na_n) = 0$.

15. (α) Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, έχουμε $a_k \rightarrow 0$. Άρα, υπάρχει $m \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $k \geq m$, $0 \leq a_k \leq 1$. Τότε, για κάθε $k \geq m$ έχουμε $0 \leq a_k^2 \leq a_k$. Από το κριτήριο σύγκρισης, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ συγκλίνει.

(β) Παρατηρήστε ότι $0 \leq \frac{a_k}{1+a_k} \leq a_k$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Από το κριτήριο σύγκρισης, η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{1+a_k}$ συγκλίνει.

(γ) Παρατηρήστε ότι $0 \leq \frac{a_k^2}{1+a_k^2} \leq a_k^2$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$.

16. Παρατηρήστε ότι $0 \leq \sqrt{a_k a_{k+1}} \leq \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και εφαρμόστε το κριτήριο σύγκρισης.

Με την υπόθεση ότι η (a_k) είναι φθίνουσα, παρατηρήστε ότι $0 \leq a_{k+1} \leq \sqrt{a_k a_{k+1}}$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και εφαρμόστε το κριτήριο σύγκρισης.

17. Από την ανισότητα Cauchy-Schwarz, για κάθε $n \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{a_k}}{k} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} \leq \sqrt{M_1 M_2},$$

όπου

$$M_1 = \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty \quad \text{και} \quad M_2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty.$$

18. Αν $b_0 = 1$ και

$$b_k = \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)}$$

για $k \in \mathbb{N}$, δείξτε ότι

$$\frac{a_k}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)} = b_{k-1} - b_k$$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$, άρα

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)} = b_0 - b_n = 1 - b_n.$$

Παρατηρώντας ότι

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) > a_1 + \cdots + a_n \rightarrow +\infty$$

δείξτε ότι

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)} = 1 - b_n \rightarrow 1.$$

Γ. Ασκήσεις*

1. Υποθέτουμε ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \min \left\{ a_k, \frac{1}{k} \right\}$ συγκλίνει. Αφού η (a_k) φθίνει προς το 0, το ίδιο ισχύει για την $(\min \{a_k, \frac{1}{k}\})$ (εξηγήστε γιατί). Από το κριτήριο συμπίκνωσης, η σειρά

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^k \min \left\{ a_{2^k}, \frac{1}{2^k} \right\} = \sum_{k=1}^{\infty} \min \left\{ 2^k a_{2^k}, 1 \right\}$$

συγκλίνει. Ειδικότερα, $\min \{2^k a_{2^k}, 1\} \rightarrow 0$, άρα τελικά έχουμε $\min \{2^k a_{2^k}, 1\} = 2^k a_{2^k}$ (εξηγήστε γιατί).

Έπεται ότι η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ συγκλίνει. Χρησιμοποιώντας ξανά το κριτήριο συμπίκνωσης, αυτή τη φορά για τη σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, βλέπουμε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει. Αυτό είναι άτοπο από την υπόθεση.

2. (α) Έστω ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{1+a_k}$ συγκλίνει. Τότε,

$$\frac{a_k}{1+a_k} \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{1+a_k} = 1 - \frac{a_k}{1+a_k} \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad 1+a_k \rightarrow 1.$$

Συνεπώς, υπάρχει $m \in \mathbb{N}$ ώστε: $1+a_k < \frac{3}{2}$ για κάθε $k \geq m$. Έπεται ότι $0 \leq a_k \leq \frac{3}{2} \frac{a_k}{1+a_k}$ για κάθε $k \geq m$. Από το κριτήριο σύγκρισης, η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, άτοπο.

(β) Παρατηρήστε ότι η (s_n) είναι αύξουσα. Άρα, αν $1 \leq m < n$ έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{a_{m+1}}{s_{m+1}} + \dots + \frac{a_n}{s_n} &\geq \frac{a_{m+1}}{s_n} + \dots + \frac{a_n}{s_n} = \frac{a_{m+1} + \dots + a_n}{s_n} \\ &= \frac{s_n - s_m}{s_n} = 1 - \frac{s_m}{s_n}. \end{aligned}$$

Ας υποθέσουμε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{s_k}$ συγκλίνει. Από το κριτήριο Cauchy, για $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$, μπορούμε να βρούμε $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε: αν $n > m \geq n_0$ τότε

$$\frac{a_{m+1}}{s_{m+1}} + \dots + \frac{a_n}{s_n} < \frac{1}{2},$$

δηλαδή

$$1 - \frac{s_m}{s_n} < \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{s_m}{s_n} > \frac{1}{2}.$$

Σταθεροποιήστε $m \geq n_0$ και αφήστε το $n \rightarrow \infty$. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ αποκλίνει, έχουμε $s_n \rightarrow \infty$. Άρα, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_m}{s_n} = 0$, το οποίο οδηγεί σε άτοπο.

(γ) Παρατηρήστε ότι

$$\frac{a_n}{s_n^2} = \frac{s_n - s_{n-1}}{s_n^2} \leq \frac{s_n - s_{n-1}}{s_n s_{n-1}} = \frac{1}{s_{n-1}} - \frac{1}{s_n}.$$

Αν t_n είναι το n -οστό μερικό άθροισμα της $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{s_k^2}$, τότε

$$t_n = \frac{a_1}{s_1^2} + \frac{a_2}{s_2^2} + \cdots + \frac{a_n}{s_n^2} \leq \frac{1}{s_1} + \left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{s_{n-1}} - \frac{1}{s_n} \right) \leq \frac{2}{s_1}.$$

Η (t_n) είναι άνω φραγμένη, άρα η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{s_k^2}$ συγκλίνει.

3. Αφού η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει, έχουμε $r_n \rightarrow 0$. Παρατηρήστε επίσης ότι η (r_n) είναι φθίνουσα.

(α) Αν $1 \leq m < n$,

$$\begin{aligned} \frac{a_m}{r_m} + \cdots + \frac{a_n}{r_n} &\geq \frac{a_m}{r_m} + \cdots + \frac{a_n}{r_m} \geq \frac{a_m + \cdots + a_n}{r_m} \\ &= \frac{r_m - r_{n+1}}{r_m} = 1 - \frac{r_{n+1}}{r_m} \geq 1 - \frac{r_n}{r_m}. \end{aligned}$$

Ας υποθέσουμε ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{r_k}$ συγκλίνει. Από το κριτήριο Cauchy υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n > m \geq n_0$,

$$1 - \frac{r_n}{r_m} \leq \frac{a_m}{r_m} + \cdots + \frac{a_n}{r_n} < \frac{1}{2}.$$

Σταθεροποιώντας $m \geq n_0$ και αφήνοντας το $n \rightarrow \infty$ καταλήζτε σε άτοπο.

(β) Παρατηρήστε ότι

$$\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}} = \frac{r_n - r_{n+1}}{\sqrt{r_n} + \sqrt{r_{n+1}}} = \frac{a_n}{\sqrt{r_n} + \sqrt{r_{n+1}}} \geq \frac{a_n}{2\sqrt{r_n}}.$$

Άρα, για κάθε $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{r_k}} \leq 2(\sqrt{r_1} - \sqrt{r_2} + \sqrt{r_2} - \sqrt{r_3} + \cdots + \sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}}) \leq 2\sqrt{r_1}.$$

Έπεται ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{r_k}$ συγκλίνει.

4. Θέτουμε $b_k = ka_k$. Τότε, θέλουμε να δείξουμε ότι: αν η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k}$ αποκλίνει τότε και η σειρά $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ αποκλίνει.

Παρατηρήστε ότι αν η $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει, τότε έχει φραγμένα μερικά αθροίσματα. Αφού η $\frac{1}{k}$ φθίνει προς το 0, το κριτήριο Dirichlet δείχνει ότι η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k}$ συγκλίνει, το οποίο είναι άτοπο.

5. Έστω s_n και t_n τα μερικά αθροίσματα των σειρών $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ και $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ αντίστοιχα. Θα συγκρίνουμε τα s_{2n} και t_n . Έχουμε

$$t_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = a_2 + \frac{1}{2}(a_3 + a_4) + \frac{1}{3}(a_4 + a_5 + a_6) + \cdots + \frac{1}{n}(a_{n+1} + \cdots + a_{2n}).$$

Δείξτε ότι στο t_n εμφανίζονται μόνο οι a_2, \dots, a_{2n} και ότι ο συντελεστής καθενός a_k στο t_n είναι μικρότερος ή ίσος του 1. Έπεται ότι $t_n \leq s_{2n}$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Συνεπώς, αν η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει τότε η $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει.

Από την άλλη πλευρά, θεωρήστε το μερικό άθροισμα t_{2n} , και δείξτε ότι κάθε a_k , $2 \leq k \leq n$, εμφανίζεται εκεί με συντελεστή $\sigma_k = \frac{1}{m} + \cdots + \frac{1}{2m-1}$ αν ο k είναι άρτιος, και συντελεστή $\sigma_k = \frac{1}{m+1} + \cdots + \frac{1}{2m}$ αν ο k είναι περιττός. Σε κάθε περίπτωση, $\sigma_k \geq \frac{1}{2}$. Άρα,

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + 2t_{2n}.$$

Έπεται ότι, αν η $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ συγκλίνει τότε η $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ συγκλίνει.

6. Αφού $a_k \rightarrow 0$, υπάρχει $m \in \mathbb{N}$ ώστε: αν $k \geq m$ τότε

$$a_k < \beta - \alpha.$$

Αφού $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$, υπάρχει ελάχιστος φυσικός $\ell \geq m$ ώστε

$$a_m + \cdots + a_{\ell} \geq \beta.$$

(α) Δείξτε ότι $\ell > m$.

(β) Αν $n = \ell - 1$, παρατηρήστε ότι $n \geq m$ και

$$a_m + \cdots + a_n < \beta,$$

ενώ

$$a_m + \cdots + a_n \geq \beta - a_{\ell} > \beta - (\beta - \alpha) = \alpha.$$

7. Εφαρμόστε την προηγούμενη άσκηση για την $a_k = \frac{1}{k}$.

9.3 Ομοιόμορφη συνέχεια

A. Βασικές ασκήσεις

2. (α) Έστω $\varepsilon > 0$. Επιλέγουμε $\delta = \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M} > 0$. Αν $x, y \in X$ και $|x - y| < \delta$, τότε

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y| < M\delta = \varepsilon.$$

Άρα, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(β) Η συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[0, 1]$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής. Όμως, η f δεν ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz στο $[0, 1]$. Θα υπήρχε $M > 0$ ώστε: για κάθε $0 < x < 1$ να ισχύει

$$|\sqrt{x} - 0| \leq M|x - 0|, \quad \text{δηλαδή} \quad 1 \leq M\sqrt{x}.$$

Αυτό οδηγεί σε άτοπο όταν $x \rightarrow 0^+$.

3. Έστω ότι η f ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz, δηλαδή υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ για κάθε $x, y \in [a, b]$. Θεωρούμε $x_0 \in (a, b)$. Τότε, $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. Όμως, αν $x \neq x_0$ στο (a, b) , έχουμε

$$\frac{|f(x) - f(x_0)|}{|x - x_0|} \leq M \quad \text{άρα} \quad |f'(x_0)| = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x) - f(x_0)|}{|x - x_0|} \leq M.$$

Δηλαδή, η f' είναι φραγμένη.

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f'(\xi)| \leq M$ για κάθε $\xi \in (a, b)$. Έστω $x < y$ στο $[a, b]$. Από το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει $\xi \in (x, y)$ ώστε

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| \leq M \cdot |x - y|.$$

Δηλαδή, η f είναι Lipschitz συνεχής.

4. Δείτε την Άσκηση 2(β).

5. Από την Άσκηση 3 αρκεί να εξετάσετε αν καθεμία από τις f και g έχει φραγμένη παράγωγο στο $(0, 1)$.

6. Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η g είναι ομοιόμορφα συνεχής, υπάρχει $\zeta = \zeta(\varepsilon) > 0$ ώστε αν $u, v \in [m, M]$ και $|u - v| < \zeta$ τότε $|g(u) - g(v)| < \varepsilon$.

Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής, άρα υπάρχει $\delta = \delta(\zeta) > 0$ ώστε αν $x, y \in [a, b]$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \zeta$. Παρατηρήστε ότι το δ εξαρτάται μόνο από το ε , αφού το ζ εξαρτάται μόνο από το ε .

Θεωρήστε $x, y \in [a, b]$ με $|x - y| < \delta$. Τότε, τα $u = f(x)$ και $v = f(y)$ ανήκουν στο $[m, M]$ και $|u - v| = |f(x) - f(y)| < \zeta$. Άρα,

$$|(g \circ f)(x) - (g \circ f)(y)| = |g(u) - g(v)| < \varepsilon.$$

Έπεται ότι η $g \circ f$ είναι ομοιόμορφα συνεχής.

7. (α) Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I , υπάρχει $\delta_1 > 0$ ώστε αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta_1$ τότε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ομοίως, αφού η g είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I , υπάρχει $\delta_2 > 0$ ώστε αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta_2$ τότε $|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Ορίζουμε $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Τότε, αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta$, έχουμε

$$\begin{aligned} |(f + g)(x) - (f + g)(y)| &= |(f(x) - f(y)) + (g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Έπεται ότι η $f + g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I .

(β) Αν οι f, g είναι ομοιόμορφα συνεχείς στο I τότε η $f \cdot g$ δεν είναι αναγκαστικά ομοιόμορφα συνεχής στο I : θεωρήστε τις $f, g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = g(x) = x$. Αυτές είναι ομοιόμορφα συνεχείς στο $[0, +\infty)$, όμως η $(f \cdot g)(x) = x^2$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$.

Αν όμως οι ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ υποτεθούν και φραγμένες, τότε η $f \cdot g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I . Υπάρχουν $M, N > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M$ και $|g(x)| \leq N$ για κάθε $x \in I$. Έστω $\varepsilon > 0$. Από την ομοιόμορφη συνέχεια των f και g μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ ώστε αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta$ τότε

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{M + N} \quad \text{και} \quad |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{M + N}.$$

Τότε, αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta$ έχουμε

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - g(y)| + |g(y)| \cdot |f(x) - f(y)| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{M + N} + N \cdot \frac{\varepsilon}{M + N} = \varepsilon. \end{aligned}$$

8. Έστω $\varepsilon > 0$. Από την υπόθεση, υπάρχει $M = M(\varepsilon) > 0$ ώστε αν $|x| \geq M$ τότε $|f(x)| < \varepsilon/3$. Επίσης, η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[-M, M]$, οπότε είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[-M, M]$. Άρα, υπάρχει $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ με $\delta < M$, ώστε αν $x, y \in [-M, M]$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/3$.

Θα δείξουμε ότι αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- (i) $x, y \in (-\infty, M]$: τότε, $|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.
- (ii) $x, y \in [M, +\infty)$: τότε, $|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.
- (iii) $x, y \in [-M, M]$: τότε, από την επιλογή του δ έχουμε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.
- (iv) $x < M < y$: τότε, $x \in [-M, M]$ (διότι $\delta < M$) και $|x - M| < |x - y| < \delta$, άρα $|f(x) - f(M)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Επίσης, $M, y \geq M$ άρα $|f(M)| < \frac{\varepsilon}{3}$ και $|f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Συνεπώς,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f(M)| + |f(M) - f(y)| \\ &\leq |f(x) - f(M)| + |f(M)| + |f(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

- (v) $x < -M < y$: όμοια με την προηγούμενη περίπτωση.

Το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, άρα η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

9. Έστω $\ell := \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - \ell$. Τότε, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. Άρα, για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $M = M(\varepsilon) > a$ ώστε αν $x \geq M$ τότε $|g(x)| < \varepsilon$. Το επιχείρημα της Άσκησης 8 δείχνει ότι η g είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$. Αφού η σταθερή συνάρτηση $h(x) = \ell$ είναι επίσης ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$, έπεται ότι η $f = g + h$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$.

10. Αφού η $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής, για $\varepsilon = 1$ μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ ώστε: αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < 1$.

Έστω $x > 0$. Θεωρούμε τον ελάχιστο φυσικό $n = n_x$ για τον οποίο $n_x \frac{\delta}{2} > x$ (αυτός υπάρχει, από την Αρχιμήδεια ιδιότητα και από την αρχή του ελαχίστου). Τότε,

$$(*) \quad (n_x - 1) \frac{\delta}{2} \leq x < n_x \frac{\delta}{2}.$$

Θεωρούμε τα σημεία: $x_0 = 0, x_1 = \frac{\delta}{2}, \dots, x_n = n \frac{\delta}{2}$. Έχουμε $|x_{k+1} - x_k| < \delta$ για κάθε $k = 0, 1, \dots, n - 1$ και $|x - x_n| < \delta$. Άρα,

$$|f(x) - f(0)| \leq |f(x) - f(x_n)| + \dots + |f(x_1) - f(x_0)| < n + 1 = n_x + 1 < \frac{2}{\delta}x + 2$$

από την (*). Δηλαδή, για κάθε $x > 0$.

$$|f(x)| \leq \frac{2}{\delta}x + 2 + |f(0)|.$$

Δουλεύοντας με τον ίδιο τρόπο για $x < 0$ δείξτε ότι

$$|f(x)| \leq \frac{2}{\delta}|x| + 2 + |f(0)|$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως, το ζητούμενο ισχύει με $A = \frac{2}{\delta}$ και $B = |f(0)| + 2$.

11. Έστω $n > 1$. Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^n$, $x \in \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής. Από την Άσκηση 10 υπάρχουν $A, B > 0$ ώστε $x^n \leq Ax + B$ για κάθε $x > 0$. Τότε,

$$x^{n-1} \leq A + \frac{B}{x}$$

για κάθε $x > 0$. Αφού $n > 1$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-1} = +\infty$. Όμως, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (A + \frac{B}{x}) = A$. Αυτό οδηγεί σε άτοπο.

12. (α) Έχουμε υποθέσει ότι υπάρχει $a > 0$ ώστε η f να είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$. Επίσης, η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[0, a]$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, a]$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$ χρησιμοποιώντας την τεχνική της Άσκησης 8 (διακρίνοντας περιπτώσεις).

(β) Η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$. Αν $x, y \in [1, +\infty)$, τότε

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{1}{2}|x - y|,$$

δηλαδή η f ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz στο $[1, +\infty)$. Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[1, +\infty)$. Τώρα, μπορείτε να εφαρμόσετε το (α).

13. Είδαμε (στη θεωρία) ότι αν η $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση, τότε υπάρχουν τα

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = m$$

και είναι πραγματικοί αριθμοί. Αν επεκτείνουμε την f στο $[a, b]$ ορίζοντας $\hat{f}(a) = \ell$, $\hat{f}(b) = m$ και $\hat{f}(x) = f(x)$ για $x \in (a, b)$, τότε η $\hat{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο $[a, b]$.

14. Όλες οι συναρτήσεις είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους.

(α) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 3x + 1$. Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής: είναι Lipschitz συνεχής με σταθερά 3.

(β) $f : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$. Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής: είναι Lipschitz συνεχής, αφού

$$|f'(x)| = \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{4}$$

στο $[2, +\infty)$.

(γ) $f : (0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x} \sin^2 x$. Η f ορίζεται στο ημιανοικτό διάστημα $(0, \pi]$ και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \sin x = 1 \cdot 0 = 0.$$

Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(δ) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x^2+4}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2+4} = 0$, η f ικανοποιεί την υπόθεση της Άσκησης 8. Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(ε) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$, από την Άσκηση 9. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(-\infty, 0]$, πάλι από την Άσκηση 9. Έπεται ότι είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} (χρησιμοποιήστε την τεχνική της Άσκησης 12(α)).

(στ) $f : [-2, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$. Κάθε συνεχής συνάρτηση ορισμένη σε κλειστό διάστημα είναι ομοιόμορφα συνεχής, άρα η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(ζ) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin x$. Η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Παρατηρούμε ότι η $f'(x) = x \cos x + \sin x$ δεν είναι φραγμένη και ότι παίρνει μεγάλες τιμές στα σημεία της μορφής $2n\pi$ όπου n μεγάλος φυσικός. Ορίζουμε $x_n = 2n\pi$ και $y_n = 2n\pi + \frac{1}{n}$. Τότε, $y_n - x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, αλλά

$$f(y_n) - f(x_n) = (2n\pi + (1/n)) \sin(1/n) = 2\pi \frac{\sin(1/n)}{1/n} + \frac{\sin(1/n)}{n} \rightarrow 2\pi \cdot 1 + 0 = 2\pi \neq 0$$

όταν $n \rightarrow \infty$. Από τον χαρακτηρισμό της ομοιόμορφης συνέχειας μέσω ακολουθιών έπεται ότι η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(η) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\cos(x^2)}{x+1}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$, από την Άσκηση 9.

B. Ερωτήσεις κατανόησης

1. Λάθος. Αν μια συνάρτηση $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής, τότε υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (και είναι πραγματικοί αριθμοί). Για την $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ έχουμε $f(x) \rightarrow +\infty$ όταν $x \rightarrow 0^+$.

2. Λάθος. Αν μια συνάρτηση $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής, τότε υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (και είναι πραγματικοί αριθμοί). Για την $f(x) = \frac{1}{x-1}$ έχουμε $f(x) \rightarrow -\infty$ όταν $x \rightarrow 1^-$.

3. Σωστό. Έστω ότι η συνάρτηση $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής. Τότε, υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (και είναι πραγματικοί αριθμοί).

Έπεται (δείτε την Άσκηση 13) ότι υπάρχει συνεχής συνάρτηση $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ώστε $\tilde{f}(x) = f(x)$ για κάθε $x \in (0, 1)$. Η \tilde{f} είναι φραγμένη (ως συνεχής συνάρτηση ορισμένη σε κλειστό διάστημα). Συνεπώς, η f είναι επίσης φραγμένη (ως περιορισμός φραγμένης συνάρτησης).

4. Σωστό. Αποδείχθηκε στη θεωρία.

5. Σωστό. Η ακολουθία $(\frac{1}{n})_{n \geq 2}$ είναι ακολουθία Cauchy στο $(0, 1)$. Αφού η f είναι ομοιόμορφα συνεχής, η ακολουθία $(f(\frac{1}{n}))$ είναι ακολουθία Cauchy (από το προηγούμενο ερώτημα). Συνεπώς, η $(f(\frac{1}{n}))$ συγκλίνει.

6. Σωστό. Οι f και g έχουν φραγμένη παράγωγο, άρα είναι Lipschitz συνεχείς (με σταθερά 1, εξηγήστε γιατί). Συνεπώς, είναι ομοιόμορφα συνεχείς στο \mathbb{R} . Όμως, η $(fg)(x) = x \sin x$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} : δείτε την Άσκηση 14(ζ).

7. Σωστό. Η f έχει φραγμένη παράγωγο (ίση με 1) στο $(0, +\infty)$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$. Ομοίως, η f έχει φραγμένη παράγωγο (ίση με 2) στο $(-\infty, 0)$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(-\infty, 0]$. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Άσκησης 8, μπορείτε να δείξετε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} .

8. Λάθος. Η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \cos(x^2)$ είναι φραγμένη και συνεχής, όμως δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Για τις ακολουθίες $x_n = \sqrt{\pi n + \pi}$ και $y_n = \sqrt{\pi n}$ έχουμε $x_n - y_n \rightarrow 0$, αλλά $|f(x_n) - f(y_n)| = 2 \rightarrow 2 \neq 0$ όταν $n \rightarrow \infty$.

Γ. Ασκήσεις

1. Η συνάρτηση $f : (0, 1) \cup (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 0$ αν $x \in (0, 1)$ και $f(x) = 1$ αν $x \in (1, 2)$ είναι συνεχής: έστω $x_0 \in (0, 1)$ και έστω $\varepsilon > 0$. Επιλέγουμε $\delta = \delta(x_0) > 0$ (δεν εξαρτάται από το $\varepsilon > 0$) ώστε $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (0, 1)$. Αν $x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ και $|x - x_0| < \delta$, τότε $x \in (0, 1)$. Άρα, $|f(x) - f(x_0)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon$. Δηλαδή, η f είναι συνεχής στο x_0 .

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δείξετε ότι η f είναι συνεχής σε κάθε $x_0 \in (1, 2)$. Άρα, η f είναι συνεχής στο $(0, 1) \cup (1, 2)$.

Όμως, η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Θεωρήστε τις ακολουθίες $x_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ και $y_n = 1 + \frac{1}{n+1}$. Έχουμε $x_n \in (0, 1)$, $y_n \in (1, 2)$ και $y_n - x_n = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0$. Όμως, $f(y_n) - f(x_n) = 1 - 0 = 1 \not\rightarrow 0$. Από τον χαρακτηρισμό της ομοιόμορφης συνέχειας μέσω ακολουθιών έπεται το συμπέρασμα.

2. Έστω $\varepsilon > 0$. Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, b]$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής. Υπάρχει $\delta > 0$ ώστε αν $x, y \in [a, b]$ και $|x - y| < \delta$ τότε

$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Επιλέγουμε φυσικό αριθμό n ώστε $\frac{b-a}{n} < \delta$ και χωρίζουμε το $[a, b]$ στα διαδοχικά υποδιαστήματα

$$[x_k, x_{k+1}] = \left[a + k \frac{(b-a)}{n}, a + (k+1) \frac{(b-a)}{n} \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Αν τα x, y ανήκουν στο ίδιο υποδιάστημα $[x_k, x_{k+1}]$, τότε $|x-y| \leq x_{k+1} - x_k = \frac{b-a}{n} < \delta$. Άρα, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

3. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι η f είναι αύξουσα. Αφού η $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι φραγμένη και αύξουσα συνάρτηση, υπάρχουν τα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell = \sup\{f(x) : x \in \mathbb{R}\}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m = \inf\{f(x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

Αφού η f είναι συνεχής και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, η Άσκηση 8 δείχνει ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$. Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα δείχνει ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(-\infty, 0]$. Τέλος, μπορείτε να δείξετε την ομοιόμορφη συνέχεια στο \mathbb{R} με την τεχνική της Άσκησης 12(α) (διακρίνοντας περιπτώσεις).

4. Η f είναι συνεχής στο $[0, 2T]$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, 2T]$. Έστω $\varepsilon > 0$. Υπάρχει $0 < \delta = \delta(\varepsilon) < T$ ώστε αν $x, y \in [0, 2T]$ και $|x-y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Δείξτε ότι αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|x-y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$: μπορείτε να υποθέσετε ότι $x < y$. Υπάρχει $m \in \mathbb{Z}$ ώστε $mT \leq x \leq (m+1)T$. Τότε, $y < x + \delta < (m+1)T + T = mT + 2T$. Παρατηρήστε ότι $x - mT, y - mT \in [0, 2T]$ και ότι

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - mT) - f(y - mT)|$$

από την περιοδικότητα της f .

5. Υπάρχει κλειστό διάστημα $[a, b]$ ώστε $X \subseteq [a, b]$. Για $\varepsilon = 1$ υπάρχει $\delta > 0$ ώστε αν $x, y \in X$ και $|x-y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < 1$. Επιλέγουμε διαμέριση

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\}$$

του $[a, b]$ ώστε $t_{k+1} - t_k < \delta$ για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$. Θέτουμε

$$X_k = [t_k, t_{k+1}] \cap X \quad \text{για κάθε } k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Αν ορίσουμε $F = \{k : X_k \neq \emptyset\}$, έχουμε

$$X = \bigcup_{k \in F} X_k.$$

Για κάθε $k \in F$ επιλέγουμε τυχόν $x_k \in X_k$ και θέτουμε

$$\alpha = \max\{|f(x_k)| : k \in F\}.$$

Παρατηρήστε ότι αν $x \in X$ τότε υπάρχει $k \in F$ ώστε $x \in X_k$. Τότε, $|x - x_k| \leq t_{k+1} - t_k < \delta$, άρα

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k)| < 1 + \alpha.$$

Δηλαδή, $|f(x)| \leq M := 1 + \alpha$ για κάθε $x \in X$.

6. (α) Έστω $x, y \in \mathbb{R}$. Για κάθε $a \in A$ έχουμε $f(x) \leq |x - a|$ και $|x - a| \leq |x - y| + |y - a|$ από την τριγωνική ανισότητα. Άρα,

$$f(x) \leq |x - y| + |y - a|.$$

Αφού

$$f(x) - |x - y| \leq |y - a| \quad \text{για κάθε } a \in A,$$

συμπεραίνουμε ότι

$$f(x) - |x - y| \leq \inf\{|y - a| : a \in A\} = f(y).$$

Δηλαδή,

$$f(x) - f(y) \leq |x - y|.$$

Με τον ίδιο τρόπο δείχνουμε ότι $f(y) - f(x) \leq |y - x| = |x - y|$. Έπεται ότι $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$.

(β) Από το (α) η f είναι Lipschitz συνεχής με σταθερά 1, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής.

9.4 Ολοκλήρωμα Riemann

A. Ερωτήσεις κατανόησης

Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

1. Σωστό. Από τον ορισμό του ολοκληρώματος Riemann: εξετάζουμε αν η $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ολοκληρώσιμη μόνο αν η f είναι φραγμένη.

2. Λάθος. Η συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ και $f(x) = 1 - x$ αν $0 < x \leq 1$ δεν παίρνει μέγιστη τιμή, είναι όμως ολοκληρώσιμη: για κάθε $0 < b < 1$, η f είναι συνεχής στο $[b, 1]$, άρα είναι ολοκληρώσιμη στο $[b, 1]$. Από την Άσκηση B1, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 1]$.

3. Λάθος. Η $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 1$ αν $x \in \mathbb{Q}$ και $f(x) = -1$ αν $x \notin \mathbb{Q}$ είναι φραγμένη, αλλά δεν είναι ολοκληρώσιμη: για κάθε διαμέριση P του $[0, 1]$ έχουμε $U(f, P) = 1$ και $L(f, P) = -1$, άρα

$$\int_a^b f(x) dx = -1 < 1 = \int_0^1 f(x) dx.$$

4. Λάθος. Για τη συνάρτηση f του προηγούμενου ερωτήματος έχουμε $|f(x)| = 1$ για κάθε $x \in [0, 1]$. Άρα, η $|f|$ είναι ολοκληρώσιμη, ενώ η f δεν είναι ολοκληρώσιμη.

5. Λάθος. Η $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 1$ αν $x \in [0, 1]$ και $f(x) = -1$ αν $x \in (1, 2]$ είναι ολοκληρώσιμη και $\int_0^2 f(x) dx = 0$ (εξηγήστε γιατί). Όμως, δεν υπάρχει $c \in [0, 2]$ ώστε $2f(c) = \int_0^2 f(x) dx$. Θα είχαμε $f(c) = 0$, ενώ η f δεν μηδενίζεται πουθενά στο $[0, 2]$.

6. Σωστό. Έστω ότι η f δεν είναι σταθερή. Τότε, υπάρχουν $y, z \in [a, b]$ ώστε $f(y) < f(z)$. Θεωρήστε τη διαμέριση $Q = \{a, b\}$ του $[a, b]$ (που περιέχει μόνο τα άκρα a και b του διαστήματος $[a, b]$). Τότε,

$$U(f, Q) - L(f, Q) = (M_0 - m_0)(b - a)$$

όπου

$$m_0 = \inf\{f(x) : x \in [a, b]\} \leq f(y) < f(z) \leq \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} = M_0.$$

Άρα, $M_0 - m_0 > 0$ οπότε $U(f, Q) - L(f, Q) > 0$. Αυτό είναι άτοπο: από την υπόθεση έχουμε $L(f, P) = U(f, P)$ για κάθε διαμέριση P του $[a, b]$.

Άρα, η f είναι σταθερή: υπάρχει $c \in \mathbb{R}$ ώστε $f(x) = c$ για κάθε $x \in [a, b]$, και το ολοκλήρωμα της f στο $[a, b]$ ισούται με $c(b - a)$.

7. Σωστό. Μπορούμε μάλιστα να δείξουμε ότι η f είναι σταθερή. Έστω $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ διαμέριση του $[a, b]$ ώστε $U(f, P) = L(f, P)$. Αυτό σημαίνει ότι

$$\sum_{k=0}^{n-1} (M_k - m_k)(x_{k+1} - x_k) = U(f, P) - L(f, P) = 0,$$

και, αφού $m_k \leq M_k$ για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$, συμπεραίνουμε ότι

$$m_k = \inf\{f(x) : x \in [x_k, x_{k+1}]\} = \sup\{f(x) : x \in [x_k, x_{k+1}]\} = M_k$$

για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$. Δηλαδή, η $f(x) = m_k = M_k$ για κάθε $x \in [x_k, x_{k+1}]$.

Παρατηρήστε τώρα ότι: $x_0, x_1 \in [x_0, x_1]$, άρα $f(x_0) = f(x_1) = m_0 = M_0$. Όμως, $x_1 \in [x_1, x_2]$, άρα $f(x_1) = m_1 = M_1$. Δηλαδή, $m_0 = M_0 = m_1 = M_1$.

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο (για τα επόμενα υποδιαστήματα), συμπεραίνουμε ότι υπάρχει $\alpha \in \mathbb{R}$ ώστε

$$\alpha = m_0 = M_0 = m_1 = M_1 = \dots = m_k = M_k = \dots = m_{n-1} = M_{n-1}.$$

Έπεται ότι $f(x) = \alpha$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δηλαδή, η f είναι σταθερή.

8. Σωστό. Θεωρήστε τυχούσα διαμέριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ του $[a, b]$. Σε κάθε υποδιάστημα $[x_k, x_{k+1}]$ υπάρχει ρητός αριθμός q_k . Από την υπόθεση έχουμε $f(q_k) = 0$, άρα $m_k \leq 0 \leq M_k$. Έπεται ότι

$$L(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k(x_{k+1} - x_k) \leq 0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} M_k(x_{k+1} - x_k) = U(f, P).$$

Άρα, $\sup_P L(f, P) \leq 0$ και $\inf_P U(f, P) \geq 0$. Η f είναι ολοκληρώσιμη, άρα

$$\int_a^b f(x)dx = \sup_P L(f, P) \leq 0 \quad \text{και} \quad \int_a^b f(x)dx = \inf_P U(f, P) \geq 0.$$

Δηλαδή,

$$\int_a^b f(x)dx = 0.$$

B. Βασικές ασκήσεις

1. Η f είναι φραγμένη, άρα υπάρχει $A > 0$ ώστε $|f(x)| \leq A$ για κάθε $x \in [0, 1]$. Θα δείξουμε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Riemann. Έστω $\varepsilon > 0$. Επιλέγουμε $0 < b < 1$ αρκετά μικρό ώστε να ικανοποιείται η

$$2Ab < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Από την υπόθεση, η f είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα $[b, 1]$, άρα υπάρχει διαμέριση Q του $[b, 1]$ με την ιδιότητα

$$U(f, Q) - L(f, Q) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Θεωρούμε τη διαμέριση $P = \{0\} \cup Q$ του $[0, 1]$. Τότε,

$$U(f, P) - L(f, P) = b(M_0 - m_0) + U(f, Q) - L(f, Q) < b(M_0 - m_0) + \frac{\varepsilon}{2},$$

όπου

$$M_0 = \sup\{f(x) : 0 \leq x \leq b\} \leq A \quad \text{και} \quad m_0 = \inf\{f(x) : 0 \leq x \leq b\} \geq -A.$$

Από τις τελευταίες ανισότητες παίρνουμε $M_0 - m_0 \leq 2A$, άρα

$$U(f, P) - L(f, P) < 2Ab + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Από το κριτήριο του Riemann, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 1]$.

2. Δείχνουμε πρώτα ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 1]$. Παρατηρήστε ότι η f είναι φραγμένη στο $[0, 1]$ και, για κάθε $0 < b < 1$, η $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ είναι συνεχής στο $[b, 1]$, άρα ολοκληρώσιμη στο $[b, 1]$. Από την Άσκηση 1, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 1]$.

Ομοίως δείχνουμε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[-1, 0]$. Άρα, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[-1, 1]$.

3. Ακριβώς όπως στην προηγούμενη Άσκηση, δείξτε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, x_0]$ και στο $[x_0, b]$.

Σημείωση. Το ίδιο ακριβώς επιχειρήμα δείχνει ότι αν μια φραγμένη συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ έχει πεπερασμένα το πλήθος σημεία ασυνέχειας στο $[a, b]$, τότε η f είναι ολοκληρώσιμη.

4. (α) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x$. Η f είναι αύξουσα. Θεωρήστε τη διαμέριση P_n του $[0, 1]$ σε n ίσα υποδιαστήματα μήκους $1/n$. Δείξτε ότι

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{f(1) - f(0)}{n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Από το κριτήριο του Riemann, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 1]$.

(β) $f : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sin x$. Η f είναι αύξουσα. Θεωρήστε τη διαμέριση P_n του $[0, \pi/2]$ σε n ίσα υποδιαστήματα μήκους $\pi/(2n)$. Δείξτε ότι

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{\pi(f(\pi/2) - f(0))}{2n} = \frac{\pi}{2n} \rightarrow 0.$$

Από το κριτήριο του Riemann, η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, \pi/2]$.

5. (α) $f(x) = x + [x]$. Η f είναι αύξουσα στο $[0, 2]$, άρα είναι ολοκληρώσιμη. Μπορείτε να γράψετε

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 x dx + \int_0^2 [x] dx.$$

Το πρώτο ολοκλήρωμα είναι ίσο με 2 και το δεύτερο ίσο με 1 (εξηγήστε γιατί).

(β) $f(x) = 1$ αν $x = \frac{1}{k}$ για κάποιον $k \in \mathbb{N}$, και $f(x) = 0$ αλλιώς. Η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 2]$. Δείξτε διαδοχικά τα εξής:

(i) Η f είναι φραγμένη.

(ii) Αν $0 < b < 2$, τότε η f έχει πεπερασμένα το πλήθος σημεία ασυνέχειας στο $[b, 2]$.

(iii) Αν $0 < b < 2$, τότε η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[b, 2]$ (από την σημείωση μετά την Άσκηση 3).

(iv) Η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, 2]$ (από την Άσκηση 1).

6. Έστω ότι $\int_a^b f(x)dx = 0$. Υποθέτουμε ότι η f δεν είναι ταυτοτικά μηδενική. Τότε, υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ ώστε $f(x_0) > 0$. Λόγω συνέχειας, η f παίρνει θετικές τιμές σε μια (αρκετά μικρή) περιοχή του x_0 , μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι $a < x_0 < b$ (ότι $x_0 \neq a$ και $x_0 \neq b$).

Επιλέγουμε $\varepsilon = f(x_0)/2 > 0$ και εφαρμόζουμε τον ορισμό της συνέχειας: μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ (και αν χρειάζεται να το μικρύνουμε) ώστε $a < x_0 - \delta < x_0 + \delta < b$ και, για κάθε $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2} \implies f(x) > \frac{f(x_0)}{2}.$$

Αφού η f είναι μη αρνητική παντού στο $[a, b]$, έχουμε

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^{x_0-\delta} f(x)dx + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx + \int_{x_0+\delta}^b f(x)dx \\ &\geq 0 + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx + 0 \geq 2\delta \cdot \frac{f(x_0)}{2} = \delta f(x_0) > 0. \end{aligned}$$

Καταλήξαμε σε άτοπο, άρα $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Ο αντίστροφος ισχυρισμός ισχύει προφανώς.

7. Θεωρώντας την $h = f - g$ βλέπουμε ότι αρκεί να δείξουμε το εξής: αν $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και $\int_a^b h(x)dx = 0$, τότε υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ ώστε $h(x_0) = 0$.

Ας υποθέσουμε ότι $h(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε, είτε $h(x) > 0$ παντού στο $[a, b]$ ή $h(x) < 0$ παντού στο $[a, b]$ (αν η h έπαιρνε και αρνητικές και θετικές τιμές στο $[a, b]$ τότε, από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, θα υπήρχε σημείο στο οποίο θα μηδενιζόταν).

Έστω λοιπόν ότι $h(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Η h παίρνει ελάχιστη θετική τιμή στο $[a, b]$: υπάρχει $y \in [a, b]$ ώστε $h(x) \geq h(y) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε,

$$\int_a^b h(x)dx \geq h(y)(b-a) > 0,$$

το οποίο είναι άτοπο. Ομοίως καταλήγουμε σε άτοπο αν υποθέσουμε ότι $h(x) < 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

8. Από την υπόθεση, για κάθε συνεχή συνάρτηση $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. Η f είναι συνεχής, μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε την υπόθεση για την $g = f$. Τότε, $\int_a^b f^2(x)dx = 0$. Η f^2 είναι συνεχής και μη αρνητική. Από την Άσκηση 6 συμπεραίνουμε ότι $f^2(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, άρα $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

9. Υποθέτουμε ότι η f δεν είναι ταυτοτικά μηδενική. Τότε, χωρίς περιορισμό της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει $x_0 \in (a, b)$ ώστε $f(x_0) > 0$. Όπως στην Άσκηση 6, μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ ώστε $a < x_0 - \delta < x_0 + \delta < b$ και $f(x) > f(x_0)/2 > 0$ για κάθε $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

Ορίζουμε μια συνεχή συνάρτηση $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ως εξής: θέτουμε $g(x) = 0$ στα $[a, x_0 - \delta]$ και $[x_0 + \delta, b]$, ορίζουμε $g(x_0) = f(x_0)$, και επεκτείνουμε γραμμικά στα $[x_0 - \delta, x_0]$ και $[x_0, x_0 + \delta]$. Αφού $g(a) = g(b) = 0$, από την υπόθεση πρέπει να ισχύει $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. Όμως,

$$0 = \int_a^b f(x)g(x)dx = \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} f(x)g(x)dx$$

και η fg είναι μη αρνητική στο $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$. Από την Άσκηση 6, έχουμε $f(x)g(x) = 0$ για κάθε $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$. Ειδικότερα, $0 = f(x_0)g(x_0) = f^2(x_0)$, το οποίο είναι άτοπο.

10. Θεωρήστε τη συνάρτηση $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται από την

$$P(t) = \int_a^b (tf(x) + g(x))^2 dx.$$

Η P ορίζεται καλά: αφού οι f, g είναι ολοκληρώσιμες, η $tf + g$ (άρα και η $(tf + g)^2$) είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ για κάθε $t \in \mathbb{R}$. Παρατηρήστε ότι η P είναι πολυώνυμο δευτέρου βαθμού:

$$P(t) = t^2 \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) + 2t \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right) + \left(\int_a^b g^2(x)dx \right).$$

Αφού $P(t) \geq 0$ για κάθε $t \in \mathbb{R}$, η διακρίνουσα είναι μη αρνητική:

$$4 \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 - 4 \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \cdot \left(\int_a^b g^2(x)dx \right) \leq 0.$$

11. Εφαρμόστε την ανισότητα Cauchy-Schwarz για την f και τη σταθερή συνάρτηση $g \equiv 1$:

$$\left(\int_0^1 f(x) \cdot 1 dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f^2(x)dx \right) \left(\int_0^1 1^2 dx \right) = \int_0^1 f^2(x)dx.$$

Η ίδια ανισότητα ισχύει αν αντικαταστήσουμε το $[0, 1]$ με οποιοδήποτε διάστημα $[a, b]$ που έχει μήκος μικρότερο ή ίσο του 1 (αν όμως πάρετε σαν $[a, b]$ το $[0, 2]$ και σαν f τη σταθερή συνάρτηση $f(x) = 1$, τότε η ανισότητα παίρνει τη μορφή $4 \leq 2$, άτοπο).

12. Έστω $\varepsilon > 0$. Η f είναι συνεχής στο 0, άρα υπάρχει $\delta > 0$ ώστε: αν $0 \leq t < \delta$ τότε $|f(t) - f(0)| < \varepsilon$. Έστω $x \in (0, \delta)$. Τότε,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt - f(0) \right| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt - \frac{1}{x} \int_0^x f(0)dt \right| \\ &= \frac{1}{x} \left| \int_0^x (f(t) - f(0))dt \right| \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^x |f(t) - f(0)| dt \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^x \varepsilon dt = \frac{\varepsilon x}{x} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = f(0).$$

13. Θεωρούμε την ακολουθία διαμερίσεων $P^{(n)} = \{0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < 1\}$ και την επιλογή σημείων $\Xi^{(n)} = \{\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1\}$. Αφού το πλάτος της διαμέρισης $P^{(n)}$ είναι $\|P^{(n)}\| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, από τον ορισμό του Riemann έχουμε

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum\left(f, P^{(n)}, \Xi^{(n)}\right) \rightarrow \int_a^b f(x) dx.$$

14. Εφαρμόζοντας το συμπέρασμα της προηγούμενης Άσκησης για την ολοκληρώσιμη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}.$$

15. Η f είναι συνεχής, άρα υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f(y)| \leq M$ για κάθε $y \in [0, 1]$. Έστω $0 < \varepsilon < 1$. Από τη συνέχεια της f στο 0, υπάρχει $0 < \delta < 1$ ώστε: αν $0 \leq y \leq \delta$ τότε

$$|f(y) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Επιλέγουμε $n_0 \in \mathbb{N}$ με την ιδιότητα: για κάθε $n \geq n_0$ ισχύει

$$\left(1 - \frac{\varepsilon}{4M+1}\right)^n < \delta.$$

Τότε, για κάθε $n \geq n_0$ μπορούμε να γράψουμε (παρατηρήστε ότι αν $0 < x < 1 - \frac{\varepsilon}{4M+1}$ τότε $|f(x^n) - f(0)| < \varepsilon/2$)

$$\begin{aligned} |a_n - f(0)| &= \left| \int_0^{1-\frac{\varepsilon}{4M+1}} (f(x^n) - f(0)) dx + \int_{1-\frac{\varepsilon}{4M+1}}^1 (f(x^n) - f(0)) dx \right| \\ &\leq \int_0^{1-\frac{\varepsilon}{4M+1}} |f(x^n) - f(0)| dx + \int_{1-\frac{\varepsilon}{4M+1}}^1 (|f(x^n)| + |f(0)|) dx \\ &\leq \left(1 - \frac{\varepsilon}{4M+1}\right) \cdot \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4M+1} \cdot 2M \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Άρα, $a_n \rightarrow f(0)$.

16. Η $f(x) = \frac{1}{x}$ είναι φθίνουσα στο $[1, +\infty)$, άρα

$$\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$$

για κάθε $k \in \mathbb{N}$. Έπεται ότι

$$\gamma_{n+1} - \gamma_n = \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 0,$$

δηλαδή η (γ_n) είναι φθίνουσα. Επίσης,

$$\int_1^n \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \cdots + \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1},$$

άρα

$$\gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} - \int_1^n \frac{1}{x} dx \geq \frac{1}{n} > 0$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Αφού η (γ_n) είναι φθίνουσα και κάτω φραγμένη από το 0, συγκλίνει.

17. Παρατηρήστε ότι

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)/n}^{k/n} |f(x) - f(k/n)| dx.$$

Στο διάστημα $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ έχουμε

$$|f(x) - f(k/n)| \leq M \left(\frac{k}{n} - x \right),$$

άρα

$$\int_{(k-1)/n}^{k/n} |f(x) - f(k/n)| \leq M \int_{(k-1)/n}^{k/n} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx = M \int_0^{1/n} y dy = \frac{M}{2n^2}.$$

Άρα,

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}.$$

Γ. Ασκήσεις

1. Κάθε διαμέριση $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n = b\}$ του $[a, b]$ ορίζει με φυσιολογικό τρόπο μια διαμέριση του $[f(a), f(b)]$: την

$$Q = \{f(a) = f(x_0) < f(x_1) < \dots < f(x_k) < f(x_{k+1}) < \dots < f(x_n) = f(b)\}.$$

Η f είναι αύξουσα, άρα

$$L(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)(x_{k+1} - x_k).$$

Η f^{-1} είναι επίσης αύξουσα, άρα

$$U(f^{-1}, Q) = \sum_{k=0}^{n-1} f^{-1}(f(x_{k+1}))(f(x_{k+1}) - f(x_k)) = \sum_{k=0}^{n-1} x_{k+1}(f(x_{k+1}) - f(x_k)).$$

Προσθέτοντας, παίρνουμε

$$(*) \quad L(f, P) + U(f^{-1}, Q) = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1}f(x_{k+1}) - x_k f(x_k)) = bf(b) - af(a).$$

Οι f και f^{-1} είναι συνεχείς, άρα ολοκληρώσιμες. Από την (*) παίρνουμε

$$bf(b) - af(a) = L(f, P) + U(f^{-1}, Q) \geq L(f, P) + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx$$

και, αφού η P ήταν τυχούσα, παίρνοντας supremum ως προς P έχουμε

$$bf(b) - af(a) \geq \int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx.$$

Με ανάλογο τρόπο δείξτε ότι για τις διαμερίσεις P και Q ισχύει

$$(**) \quad U(f, P) + L(f^{-1}, Q) = bf(b) - af(a).$$

Τότε,

$$U(f, P) + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx \geq U(f, P) + L(f^{-1}, Q) = bf(b) - af(a),$$

και παίρνοντας infimum ως προς P έχουμε

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx \geq bf(b) - af(a).$$

Άρα,

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx = bf(b) - af(a).$$

2. Υποθέτουμε πρώτα ότι $f(a) \geq b$. Αν $b = f(y)$ τότε $y \leq a$ (διότι η f είναι αύξουσα) και από την προηγούμενη Άσκηση (θα χρειαστείτε την υπόθεση ότι $f(0) = 0$) έχουμε

$$yb = yf(y) = \int_0^y f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx.$$

Για να δείξουμε ότι

$$ab \leq \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx$$

αρκεί να ελέγξουμε (εξηγήστε γιατί) ότι

$$b(a - y) \leq \int_y^a f(x)dx.$$

Όμως, η f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο $[y, a]$, άρα

$$\int_y^a f(x)dx \geq f(y)(a - y) = b(a - y)$$

με ισότητα μόνο αν $a = y$, δηλαδή αν $f(a) = b$.

Εξετάστε την περίπτωση $f(a) \leq b$ με τον ίδιο τρόπο.

3. Η f είναι συνεχής, άρα υπάρχει $A > 0$ ώστε $|f(t)| \leq A$ για κάθε $t \in [a, b]$. Αυτό δείχνει ότι

$$|f(x)| \leq M \int_a^x |f(t)| dt \leq M \int_a^x A dt = MA(x-a)$$

για κάθε $x \in [a, b]$. Εισάγοντας αυτή την εκτίμηση πάλι στην υπόθεση, παίρνουμε

$$|f(x)| \leq M \int_a^x |f(t)| dt \leq M^2 A \int_a^x (t-a) dt = \frac{M^2 A}{2} (x-a)^2$$

για κάθε $x \in [a, b]$, και επαγωγικά,

$$|f(x)| \leq \frac{M^n A}{n!} (x-a)^n$$

για κάθε $x \in [a, b]$ και για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Όμως,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M^n A}{n!} (x-a)^n = 0,$$

άρα $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

4. Έστω ότι υπάρχει θετική συνεχής συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιεί τις

$$\int_0^1 f(x) dx = 1, \quad \int_0^1 x f(x) dx = a \quad \text{και} \quad \int_0^1 x^2 f(x) dx = a^2.$$

Τότε,

$$\int_0^1 (x-a)^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx - 2a \int_0^1 x f(x) dx + a^2 \int_0^1 f(x) dx = a^2 - 2a \cdot a + a^2 \cdot 1 = 0.$$

Αφού η $(x-a)^2 f(x)$ είναι μη αρνητική και συνεχής, η Άσκηση Β6 δείχνει ότι $(x-a)^2 f(x) = 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$. Όμως η f είναι παντού θετική, άρα $x = a$ για κάθε $x \in [0, 1]$. Αυτό είναι άτοπο.

5. Έστω $\varepsilon > 0$. Παρατηρήστε ότι

$$\gamma_n = \left(\int_a^b [f(x)]^n dx \right)^{1/n} \leq \left(\int_a^b M^n dx \right)^{1/n} = M(b-a)^{1/n}$$

και $M(b-a)^{1/n} \rightarrow M$ όταν $n \rightarrow \infty$, άρα υπάρχει $n_1 \in \mathbb{N}$ ώστε

$$\gamma_n < M + \varepsilon \quad \text{για κάθε} \quad n \geq n_1.$$

Αφού η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, παίρνει τη μέγιστη τιμή της: υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ ώστε $f(x_0) = M$. Αφού η f είναι συνεχής στο x_0 , υπάρχει κάποιος

διάστημα $J \subset [a, b]$ με μήκος $\delta > 0$ και $x_0 \in J$, ώστε $f(x) > M - \frac{\varepsilon}{2}$ για κάθε $x \in J$. Επίσης, αφού $\delta^{1/n} \rightarrow 1$, υπάρχει $n_2 \in \mathbb{N}$ ώστε: για κάθε $n \geq n_2$,

$$\left(\int_a^b [f(x)]^n dx \right)^{1/n} \geq \left(\int_J [f(x)]^n dx \right)^{1/n} \geq \left(M - \frac{\varepsilon}{2} \right) \delta^{1/n} > M - \varepsilon.$$

Τότε, για κάθε $n \geq n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ έχουμε

$$|\gamma_n - M| = \left| \left(\int_a^b [f(x)]^n dx \right)^{1/n} - M \right| < \varepsilon.$$

Δηλαδή, $\gamma_n \rightarrow M$.

Σημείωση. Χρησιμοποιώντας τα $\limsup \gamma_n$ και $\liminf \gamma_n$ μπορούμε να απλουστεύσουμε (κάπως) το επιχείρημα. Από την ανισότητα $\gamma_n \leq M(b-a)^{1/n} - \varepsilon$ που δείξαμε παραπάνω – και από την $M(b-a)^{1/n} \rightarrow M$ συμπεραίνουμε ότι $\limsup \gamma_n \leq M$. Από την ανισότητα $\gamma_n \geq (M - \frac{\varepsilon}{2}) \delta^{1/n} - \varepsilon$ που δείξαμε παραπάνω – και από την $\delta^{1/n} \rightarrow 1$ συμπεραίνουμε ότι $\liminf \gamma_n \geq M - \frac{\varepsilon}{2}$ για τυχόν $\varepsilon > 0$, συνεπώς, $\liminf \gamma_n \geq M$. Έπεται ότι $\limsup \gamma_n = \liminf \gamma_n = M$, άρα $\gamma_n \rightarrow M$.

6. (α) Αφού η f είναι ολοκληρώσιμη, μπορούμε να βρούμε διαμέριση $P_1 = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ του $[a, b]$ ώστε $U(f, P_1) - L(f, P_1) < b - a$. Περνώντας αν χρειαστεί σε εκλέπτυνση της P_1 μπορούμε να υποθέσουμε ότι το πλάτος της P_1 είναι μικρότερο από 1. Αφού

$$\sum_{k=0}^{n-1} (M_k - m_k)(x_{k+1} - x_k) < b - a = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k),$$

υπάρχει $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ώστε $M_k - m_k < 1$. Αν θέσουμε $a_1 = x_k$ και $b_1 = x_{k+1}$, βλέπουμε ότι $a_1 < b_1$, $a_1, b_1 \in [a, b]$, $b_1 - a_1 < 1$ και

$$\sup\{f(x) : a_1 \leq x \leq b_1\} - \inf\{f(x) : a_1 \leq x \leq b_1\} = M_k - m_k < 1.$$

(β) Με τον ίδιο τρόπο δείξτε ότι υπάρχει $[a_2, b_2] \subseteq (a_1, b_1)$ με μήκος μικρότερο από $1/2$ ώστε

$$\sup\{f(x) : a_2 \leq x \leq b_2\} - \inf\{f(x) : a_2 \leq x \leq b_2\} < \frac{1}{2}.$$

Για να πετύχετε τον εγκλεισμό $[a_2, b_2] \subset (a_1, b_1)$ ξεκινήστε από ένα υποδιάστημα $[c, d]$ του $[a_1, b_1]$ με $a_1 < c < d < b_1$ (η f είναι ολοκληρώσιμη και στο $[c, d]$). Βρείτε διαμέριση P_2 του $[c, d]$ με $U(f, P_2) - L(f, P_2) < \frac{d-c}{2}$ και πλάτος μικρότερο από $1/2$ και συνεχίστε όπως πριν.

Επαγωγικά μπορείτε να βρείτε $[a_n, b_n] \subset (a_{n-1}, b_{n-1})$ ώστε $b_n - a_n < 1/n$ και

$$\sup\{f(x) : a_n \leq x \leq b_n\} - \inf\{f(x) : a_n \leq x \leq b_n\} < \frac{1}{n}.$$

(γ) Η τομή των κιβωτισμένων διαστημάτων $[a_n, b_n]$ περιέχει ακριβώς ένα σημείο x_0 . Θα δείξουμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 : έστω $\varepsilon > 0$. Επιλέγουμε $n \in \mathbb{N}$ με $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Αφού $x_0 \in [a_{n+1}, b_{n+1}]$, έχουμε $x_0 \in (a_n, b_n)$. Υπάρχει $\delta > 0$ ώστε $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a_n, b_n)$. Τότε, για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ έχουμε

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \sup\{f(x) : a_n \leq x \leq b_n\} - \inf\{f(x) : a_n \leq x \leq b_n\} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Αυτό δείχνει τη συνέχεια της f στο x_0 .

(δ) Ας υποθέσουμε ότι η f έχει πεπερασμένα το πλήθος σημεία συνέχειας στο $[a, b]$. Τότε, υπάρχει διάστημα $[c, d] \subset [a, b]$ στο οποίο η f δεν έχει κανένα σημείο συνέχειας (εξηγήστε γιατί). Αυτό είναι άτοπο από το προηγούμενο βήμα: η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[c, d]$, άρα έχει τουλάχιστον ένα σημείο συνέχειας σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το επιχείρημα που χρησιμοποιήσαμε δείχνει κάτι ισχυρότερο: αν η f είναι ολοκληρώσιμη τότε έχει τουλάχιστον ένα σημείο συνέχειας σε κάθε υποδιάστημα του $[a, b]$. Με άλλα λόγια, το σύνολο των σημείων συνέχειας της f είναι πυκνό στο $[a, b]$.

7. Από την προηγούμενη Άσκηση, αφού η f είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$, υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ στο οποίο η f είναι συνεχής. Αφού $f(x_0) > 0$, υπάρχει διάστημα $J \subseteq [a, b]$ με μήκος $\delta > 0$ ώστε: για κάθε $x \in J$ ισχύει $f(x) > f(x_0)/2$. Συνεχίστε όπως στην Άσκηση Β6.

9.5 Παράγωγος και Ολοκλήρωμα

A. Βασικές Ασκήσεις

1. Θεωρήστε τη συνάρτηση $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$\begin{aligned} g(s) &= \int_a^s f(t)dt - \int_s^b f(t)dt = \int_a^s f(t)dt - \left(\int_a^b f(t)dt - \int_a^s f(t)dt \right) \\ &= 2 \int_a^s f(t)dt - \int_a^b f(t)dt. \end{aligned}$$

Αφού η f είναι ολοκληρώσιμη, η g είναι συνεχής. Παρατηρήστε ότι

$$g(a) = - \int_a^b f(t)dt \quad \text{και} \quad g(b) = \int_a^b f(t)dt.$$

Αφού $g(a)g(b) = -\left(\int_a^b f(t)dt\right)^2 \leq 0$, υπάρχει $s \in [a, b]$ ώστε $g(s) = 0$. Για κάθε τέτοιο s ισχύει η

$$\int_a^s f(t)dt = \int_s^b f(t)dt.$$

Μπορούμε να επιλέξουμε ένα τέτοιο s στο ανοικτό διάστημα (a, b) αν $\int_a^b f(t)dt \neq 0$ (εξηγήστε γιατί). Αν όμως πάρουμε την $f(x) = x$ στο $[-1, 1]$, τότε τα μόνον σημεία $s \in [-1, 1]$ για τα οποία $g(s) = 0$ είναι τα $s = \pm 1$ (σε αυτό το παράδειγμα, το ολοκλήρωμα της f στο $[-1, 1]$ ισούται με μηδέν).

2. Θεωρήστε τη συνάρτηση $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $F(t) = \int_0^t f(x)dx$. Αφού η f είναι ολοκληρώσιμη και θετική, η F είναι συνεχής και αύξουσα στο $[0, 1]$. Αφού $\int_0^1 f(x)dx = 1$, έχουμε $F(0) = 0$ και $F(1) = 1$.

Έστω $n \in \mathbb{N}$. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, για κάθε $k = 1, \dots, n-1$ υπάρχει $t_k \in [0, 1]$ ώστε $F(t_k) = \frac{k}{n}$. Θέτουμε $t_0 = 0$ και $t_n = 1$: τότε $F(t_0) = 0 = \frac{0}{n}$ και $F(t_n) = 1 = \frac{n}{n}$. Παρατηρήστε ότι $t_k < t_{k+1}$ για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$. Αν για κάποιο k είχαμε $t_k \geq t_{k+1}$, τότε θα παίρναμε

$$\frac{k}{n} = \int_0^{t_k} f(x)dx = \int_0^{t_{k+1}} f(x)dx + \int_{t_{k+1}}^{t_k} f(x)dx \geq \int_0^{t_{k+1}} f(x)dx = \frac{k+1}{n},$$

το οποίο είναι άτοπο. Άρα, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$ και

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x)dx = \int_0^{t_{k+1}} f(x)dx - \int_0^{t_k} f(x)dx = \frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} = \frac{1}{n}$$

για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$.

3. Σύμφωνα με το θεώρημα μέσης τιμής του Ολοκληρωτικού Λογισμού, αν η $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και η μη αρνητική συνάρτηση $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ολοκληρώσιμη, υπάρχει $s \in [0, 1]$ ώστε

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = f(s) \int_0^1 g(x)dx.$$

Εφαρμόστε το παραπάνω για την $g(x) = x^2$.

4. Από την υπόθεση έπεται ότι

$$2 \int_0^x f(t)dt = \int_0^1 f(t)dt$$

για κάθε $x \in [0, 1]$. Δηλαδή, η συνάρτηση $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ είναι σταθερή. Αφού η f είναι συνεχής, η F είναι παραγωγίσιμη και $F'(x) =$

$f(x)$ για κάθε $x \in [0, 1]$. Αφού η F είναι σταθερή, έχουμε $F' \equiv 0$. Άρα, $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$.

5. Αφού η h είναι συνεχής, η συνάρτηση $G(y) = \int_0^y h(t)dt$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ και $G'(y) = h(y)$. Παρατηρήστε ότι $F(x) = G(f(x)) = (G \circ f)(x)$. Αφού η f είναι παραγωγίσιμη, εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας παίρνουμε

$$F'(x) = G'(f(x)) \cdot f'(x) = h(f(x)) \cdot f'(x).$$

6. Γράφουμε

$$g(x) = \int_{x-\delta}^{x+\delta} f(t)dt = \int_0^{x+\delta} f(t)dt - \int_0^{x-\delta} f(t)dt = H_1(x) - H_2(x),$$

όπου

$$H_1(x) = \int_0^{x+\delta} f(t)dt \quad \text{και} \quad H_2(x) = \int_0^{x-\delta} f(t)dt.$$

Το επιχείρημα της προηγούμενης Άσκησης δείχνει ότι οι H_1, H_2 είναι παραγωγίσιμες, $H_1'(x) = f(x + \delta)$ και $H_2'(x) = f(x - \delta)$ (αν $0 > x + \delta$ ή $0 > x - \delta$, το συμπέρασμα εξακολουθεί να ισχύει: θυμηθείτε τη σύμβαση $\int_b^a f = -\int_a^b f$). Έπεται ότι $g'(x) = f(x + \delta) - f(x - \delta)$.

7. Γράφουμε

$$G(x) = \int_{h(x)}^{g(x)} t^2 dt = \int_0^{g(x)} t^2 dt - \int_0^{h(x)} t^2 dt.$$

Αφού οι g, h είναι παραγωγίσιμες και η $f(t) = t^2$ είναι συνεχής, η G είναι παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} (δείτε τις προηγούμενες δύο Ασκήσεις) και $G'(x) = g^2(x)g'(x) - h^2(x)h'(x)$.

8. Θέτουμε $u = \frac{x}{t}$. Τότε, $dt = -\frac{x}{u^2} du$ και

$$F(x) = \int_x^1 -x \frac{\varphi(u)}{u^2} du = \int_1^x x \frac{\varphi(u)}{u^2} du = x \int_1^x \frac{\varphi(u)}{u^2} du.$$

Άρα,

$$F'(x) = \int_1^x \frac{\varphi(u)}{u^2} du + x \frac{\varphi(x)}{x^2} = \int_1^x \frac{\varphi(u)}{u^2} du + \frac{\varphi(x)}{x}.$$

9. Θεωρήστε τις συναρτήσεις

$$F(x) = \int_0^x f(u)(x-u)du = x \int_0^x f(u)du - \int_0^x f(u)u du$$

και

$$G(x) = \int_0^x \left(\int_0^u f(t) dt \right) du = \int_0^x R(u) du,$$

όπου

$$R(u) = \int_0^u f(t) dt.$$

Αφού η f είναι συνεχής στο $[0, a]$, το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού δείχνει ότι οι F, G και R είναι παραγωγίσιμες. Επίσης,

$$F'(x) = \int_0^x f(u) du + xf(x) - f(x)x = \int_0^x f(u) du$$

και

$$G'(x) = R(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x f(u) du.$$

Άρα,

$$(G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = \int_0^x f(u) du - \int_0^x f(u) du = 0.$$

Έπεται ότι η $G - F$ είναι σταθερή στο $[0, a]$. Παρατηρώντας ότι $F(0) = G(0) = 0$, συμπεραίνουμε ότι $G \equiv F$ στο $[0, a]$. Δηλαδή,

$$\int_0^x f(u)(x - u) du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t) dt \right) du$$

για κάθε $x \in [0, a]$.

10. Για κάθε $k = 0, \dots, n-1$, η f είναι συνεχώς παραγωγίσιμη στο $[x_k, x_{k+1}]$. Από το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού (για τη συνεχή συνάρτηση f') έχουμε

$$|f(x_{k+1}) - f(x_k)| = \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f'(x) dx \right| \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f'(x)| dx.$$

Άρα,

$$\sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f'(x)| dx = \int_a^b |f'(x)| dx.$$

11. Θεωρούμε τις συναρτήσεις $L, R : [0, +\infty) \rightarrow [0, \infty)$ με

$$L(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt \quad \text{και} \quad R(x) = xf(x).$$

Οι L, R είναι παραγωγίσιμες (εξηγήστε γιατί) και $L(0) = 0 = R(0)$. Παρατηρήστε ότι

$$L'(x) = f(x) + f^{-1}(f(x)) \cdot f'(x) = f(x) + xf'(x) = R'(x)$$

για κάθε $x \geq 0$. Έπεται ότι $L(x) = R(x)$ για κάθε $x \geq 0$.

B. Ασκήσεις

1. Η f' είναι συνεχής, άρα είναι ολοκληρώσιμη. Χρησιμοποιώντας την $f(0) = 0$, το δεύτερο θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού και την ανισότητα Cauchy-Schwarz, για κάθε $x \in [0, 1]$ γράφουμε

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f(0)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| \cdot 1 dt \\ &\leq \left(\int_0^x |f'(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^x 1^2 dt \right)^{1/2} = \left(\int_0^x |f'(t)|^2 dt \right)^{1/2} \sqrt{x} \\ &\leq \left(\int_0^1 |f'(t)|^2 dt \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

2. Αν υποθέσουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη, τότε παραγωγίζοντας τα δύο μέλη της

$$(*) \quad f(x)^2 = 2 \int_0^x f(t) dt$$

παίρνουμε

$$2f(x)f'(x) = 2f(x)$$

για κάθε $x > 0$, και χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x > 0$ συμπεραίνουμε ότι $f'(x) = 1$ για κάθε $x > 0$. Από την (*) βλέπουμε (θέτοντας $x = 0$) ότι $f(0) = 0$, άρα

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x 1 dt = x$$

για κάθε $x \geq 0$. Μένει να δείξουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη. Από την (*) και την $f(x) \neq 0$ έχουμε: για κάθε $x > 0$ ισχύει $\int_0^x f(t) dt > 0$ και

$$f(x) = g(x) := \sqrt{2} \sqrt{\int_0^x f(t) dt} \quad \text{ή} \quad f(x) = h(x) := -\sqrt{2} \sqrt{\int_0^x f(t) dt}.$$

Αφού η f είναι συνεχής και δεν μηδενίζεται στο $(0, +\infty)$, το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής δείχνει ότι είτε $f \equiv g$ στο $[0, +\infty)$ ή $f \equiv h$ στο $[0, +\infty)$. Η δεύτερη

περίπτωση αποκλείεται, αφού η h παίρνει αρνητικές τιμές στο $(0, +\infty)$ και $\int_0^x f(t)dt > 0$ για κάθε $x > 0$. Άρα,

$$f(x) = g(x) := \sqrt{2} \sqrt{\int_0^x f(t)dt}$$

για κάθε $x \geq 0$. Αφού η f είναι συνεχής, έπεται ότι η g (δηλαδή, η f) είναι παραγωγίσιμη.

3. Αφού η f' είναι συνεχής, μπορούμε να εφαρμόσουμε ολοκλήρωση κατά μέρη:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \cos(nx) dx &= \int_a^b f(x) \left(\frac{\sin(nx)}{n} \right)' dx \\ &= \frac{f(b) \sin(nb) - f(a) \sin(na)}{n} - \frac{1}{n} \int_a^b f'(x) \sin(nx) dx. \end{aligned}$$

Η f' είναι συνεχής στο $[a, b]$, άρα υπάρχει $M > 0$ ώστε $|f'(x)| \leq M$ για κάθε $x \in [a, b]$. Έπεται ότι

$$\left| \frac{f(b) \sin(nb) - f(a) \sin(na)}{n} \right| \leq \frac{|f(a)| + |f(b)|}{n} \rightarrow 0$$

και

$$\left| \frac{1}{n} \int_a^b f'(x) \sin(nx) dx \right| \leq \frac{1}{n} \int_a^b |f'(x)| dx \leq \frac{M(b-a)}{n} \rightarrow 0$$

καθώς το $n \rightarrow \infty$. Συνεπώς,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(nx) dx = 0, \quad \text{και όμοια,} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) dx = 0.$$

4. Γράφουμε

$$a_n = \int_0^\pi \sin(nx) dx = \int_0^\pi \left(\frac{-\cos(nx)}{n} \right)' dx = \frac{\cos 0 - \cos(n\pi)}{n}.$$

Άρα, $|a_n| \leq 2/n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Έπεται ότι $a_n \rightarrow 0$ καθώς το $n \rightarrow \infty$. Για την (b_n) κάνουμε την αντικατάσταση $y = nx$:

$$b_n = \int_0^\pi |\sin(nx)| dx = \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} |\sin y| dy.$$

Παρατηρήστε ότι

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin y| dy = \int_0^\pi |\sin y| dy$$

για κάθε $k \in \mathbb{Z}$ (κάντε την αντικατάσταση $y = k\pi + u$). Άρα,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} |\sin y| dy = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin y| dy \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{\pi} |\sin y| dy = \int_0^{\pi} |\sin y| dy \\ &= \int_0^{\pi} \sin y dy = \cos(0) - \cos(\pi) = 2 \end{aligned}$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Έπεται ότι $b_n \rightarrow 2$.

5. Θα χρησιμοποιήσουμε το εξής: αν $g, h : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχείς συναρτήσεις τότε οι $\max\{g, h\}$ και $\min\{g, h\}$ είναι συνεχείς. Αυτό έπεται από τις

$$\max\{g, h\} = \frac{g + h + |g - h|}{2} \quad \text{και} \quad \min\{g, h\} = \frac{g + h - |g - h|}{2}.$$

Η $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχώς παραγωγίσιμη, άρα οι συναρτήσεις

$$g := \max\{f', 0\} \quad \text{και} \quad h := -\min\{f', 0\}$$

είναι συνεχείς και μη αρνητικές στο $[0, +\infty)$. Επίσης,

$$g - h = \max\{f', 0\} + \min\{f', 0\} = f'.$$

Ορίζουμε

$$G_1(x) = \int_0^x g(t) dt \quad \text{και} \quad H_1(x) = \int_0^x h(t) dt.$$

Αφού οι g, h είναι συνεχείς και μη αρνητικές, οι G_1, H_1 είναι παραγωγίσιμες, αύξουσες και $G_1(0) = H_1(0) = 0$. Από τον τρόπο ορισμού τους και από το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού βλέπουμε ότι

$$G_1(x) - H_1(x) = \int_0^x (g(t) - h(t)) dt = \int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0)$$

για κάθε $x \geq 0$. Ορίζουμε

$$G(x) = 1 + |f(0)| + G_1(x) \quad \text{και} \quad H(x) = 1 + |f(0)| - f(0) + H_1(x).$$

Τότε, οι G, H είναι παραγωγίσιμες, αύξουσες, θετικές και

$$G(x) - H(x) = G_1(x) - H_1(x) + f(0) = f(x)$$

για κάθε $x \geq 0$. Δηλαδή, η f γράφεται σαν διαφορά δύο συνεχών, αυξουσών και θετικών συναρτήσεων στο $[0, +\infty)$.

9.6 Τεχνικές Ολοκλήρωσης

A. Βασικές Ασκήσεις

1. (α) Γράφουμε

$$\int \frac{2x}{x^2 + 2x + 2} dx = \int \frac{2x}{(x+1)^2 + 1} dx$$

και χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $y = x + 1$.

(β) Ανάλυση σε απλά κλάσματα. Ζητάμε $a, b, c \in \mathbb{R}$ ώστε

$$\frac{2x^2 + x + 1}{(x+3)(x-1)^2} = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}.$$

Ελέγξτε ότι $a = 1$, $b = 1$ και $c = 1$.

(γ) Παρατηρούμε ότι $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x+1)(x^2 + x + 1)$ και κάνουμε ανάλυση σε απλά κλάσματα.

2. (α) Παρατηρούμε ότι $x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ και κάνουμε ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(β) Με την αντικατάσταση $u = \sqrt[6]{x}$ προκύπτει το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{6u^5}{u^3 + u^2} du = \int \frac{6u^3}{u+1} du$$

το οποίο υπολογίζεται εύκολα (μπορείτε να κάνετε τη νέα αντικατάσταση $y = u + 1$).

(γ) Με την αντικατάσταση $u = \sqrt{x^2 - 1}$ έχουμε $\frac{dx}{x} = \frac{u du}{u^2 + 1}$, οπότε προκύπτει το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{du}{u^2 + 1} = \arctan(\sqrt{x^2 - 1}) + c.$$

(δ) Με την αντικατάσταση $u = \sqrt{1 + e^x}$ έχουμε $du = \frac{e^x}{2\sqrt{1+e^x}} dx = \frac{u^2 - 1}{2u} dx$, οπότε προκύπτει το ολοκλήρωμα $\int \frac{2du}{u^2 - 1}$, το οποίο υπολογίζεται εύκολα με ανάλυση σε απλά κλάσματα.

3. (α) Γράφουμε

$$\int \cos^3 x dx = \int \cos^2 x \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)(\sin x)' dx$$

και θέτουμε $u = \sin x$.

(β) Γράφουμε

$$\int \cos^2 x \sin^3 x dx = \int \cos^2 x (1 - \cos^2 x)(-1)(\cos x)' dx$$

και θέτουμε $u = \cos x$.

(γ) Γράφουμε

$$\int \tan^2 x \, dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \tan x - x + c.$$

(δ) Γράφουμε

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\cos^4 x} dx &= \int (\tan x)' \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{\tan x}{\cos^2 x} - \int \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)' dx \\ &= \frac{\tan x}{\cos^2 x} - \int \tan x \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx = \frac{\tan x}{\cos^2 x} - \int \frac{2(1 - \cos^2 x)}{\cos^4 x} dx \\ &= \frac{\tan x}{\cos^2 x} - 2 \int \frac{1}{\cos^4 x} dx + 2 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$3 \int \frac{1}{\cos^4 x} dx = \frac{\tan x}{\cos^2 x} + 2 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{\tan x}{\cos^2 x} + \tan x + c.$$

(ε) Με την αντικατάσταση $u = \sqrt{\tan x}$ παίρνουμε

$$du = \frac{1}{2\sqrt{\tan x}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2\sqrt{\tan x}} (\tan^2 x + 1) dx = \frac{u^4 + 1}{2u} dx,$$

οπότε θεωρούμε το

$$\int \frac{2u^2}{u^4 + 1} du,$$

το οποίο υπολογίζεται με ανάλυση σε απλά κλάσματα.

4. Γράφουμε

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} = \int (x)' \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx = \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2n \int \frac{x^2 + 1 - 1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2n \int \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx - 2n \int \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2nI_n - 2nI_{n+1}. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n} \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + \frac{2n - 1}{2n} I_n.$$

5. (α) Ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(β) Ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(γ) Ολοκλήρωση κατά μέρη:

$$\int x \log x \, dx = \frac{1}{2} \int (x^2)' \log x \, dx = \frac{x^2 \log x}{2} - \frac{1}{2} \int x \, dx = \frac{x^2 \log x}{2} - \frac{x^2}{4} + c.$$

(δ) Ολοκλήρωση κατά μέρη:

$$\int x \cos x \, dx = \int x(\sin x)' \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + c.$$

(ε) Ολοκλήρωση κατά μέρη:

$$\begin{aligned} I = \int e^x \sin x \, dx &= \int (e^x)' \sin x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx \\ &= e^x \sin x - \int (e^x)' \cos x \, dx = e^x \sin x - e^x \cos x + \int e^x (\cos x)' \, dx \\ &= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x \, dx = e^x (\sin x - \cos x) - I. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + c.$$

(στ) Χρησιμοποιώντας την ταυτότητα $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ παίρνουμε

$$\int x \sin^2 x \, dx = \int \frac{x}{2} \, dx - \int x \frac{\cos(2x)}{2} \, dx.$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα, χρησιμοποιήστε την αντικατάσταση $u = 2x$ και ολοκλήρωση κατά μέρη όπως στο (δ).

(ζ) Με ολοκλήρωση κατά μέρη παίρνουμε

$$\int \log(x + \sqrt{x}) \, dx = \int (x)' \log(x + \sqrt{x}) \, dx = x \log(x + \sqrt{x}) - \int \frac{x}{x + \sqrt{x}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \, dx.$$

Κατόπιν, εφαρμόστε την αντικατάσταση $u = \sqrt{x}$.

(η) Με την αντικατάσταση $u = \sqrt{1 - x^2}$ βλέπουμε ότι $\frac{dx}{x} = \frac{u \, du}{u^2 - 1}$, οπότε καταλήγουμε στο

$$\int \frac{1}{u^2 - 1} \, du$$

το οποίο υπολογίζεται με ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(θ) Ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(ι) Θέτουμε $y = \tan \frac{x}{2}$. Ελέγξτε ότι $dx = \frac{2}{1+y^2} dy$ και $\sin x = \frac{2y}{1+y^2}$. Αναγόμεμαστε έτσι στο ολοκλήρωμα

$$\begin{aligned} \int 2 \arctan y \frac{1}{1 + \frac{2y}{1+y^2}} \frac{2}{1+y^2} dy &= 4 \int \arctan y \frac{1}{(1+y)^2} dy \\ &= 4 \int \arctan y \left(-\frac{1}{1+y} \right)' dy \\ &= -4 \frac{\arctan y}{1+y} + 4 \int \frac{1}{(1+y^2)(1+y)} dy. \end{aligned}$$

Το τελευταίο ολοκλήρωμα υπολογίζεται με ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(κ) Γράφουμε

$$\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} (\sin x)' dx$$

και κάνουμε την αντικατάσταση $u = \sin x$.

(λ) Αντικατάσταση $y = x + 1$.

6. (α) Αν θέσουμε $u = \log x$, τότε $dx = e^u du$ και καταλήγουμε στο ολοκλήρωμα

$$\int e^u \sin u du,$$

το οποίο υπολογίζεται με ολοκλήρωση κατά μέρη.

(β) Γράφουμε

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x\sqrt{x}} \log(1-x) dx &= -2 \int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)' \log(1-x) dx \\ &= -\frac{2 \log(1-x)}{\sqrt{x}} - 2 \int \frac{1}{\sqrt{x}} \frac{1}{1-x} dx. \end{aligned}$$

Το τελευταίο ολοκλήρωμα υπολογίζεται με την αντικατάσταση $u = \sqrt{x}$.

7. (α) Γράφουμε

$$\begin{aligned} \int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1+x^2} \right)' \arctan x dx \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\arctan x}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx. \end{aligned}$$

Για το τελευταίο ολοκλήρωμα χρησιμοποιούμε τον αναγωγικό τύπο της Άσκησης 4.

(β) Γράφουμε

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx &= - \int \left(\frac{1}{1+x} \right)' xe^x dx \\ &= - \frac{xe^x}{1+x} + \int \frac{1}{1+x} (xe^x)' dx \\ &= - \frac{xe^x}{1+x} + \int \frac{1}{1+x} (1+x)e^x dx \\ &= - \frac{xe^x}{1+x} + e^x + c. \end{aligned}$$

8. (α) Με την αντικατάσταση $u = e^x$ αναγόμεστε στον υπολογισμό του ολοκληρώματος ρητής συνάρτησης.

(β) Με την αντικατάσταση $u = \tan x$ αναγόμεστε στον υπολογισμό του

$$\int \log u du = u \log u - u + c.$$

9. Υπολογίστε πρώτα τα αόριστα ολοκληρώματα:

(α) Γράφουμε

$$\int \frac{x}{\cos^2 x} dx = x \tan x - \int \tan x dx = x \tan x + \log(\cos x) + c.$$

(β) Γράφουμε

$$\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{(1 - \cos^2 x) \sin x}{\cos^6 x} dx$$

και κάνουμε την αντικατάσταση $u = \cos x$.

(γ) Με την αντικατάσταση $u = \sqrt{1+x^2}$ αναγόμεστε στον υπολογισμό του

$$\int u \log u du,$$

το οποίο υπολογίζεται με ολοκλήρωση κατά μέρη.

(δ) Γράφουμε

$$\int x \tan^2 x dx = \int x \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int x dx.$$

Το πρώτο ολοκλήρωμα υπολογίστηκε στο (α).

10. (α) Το εμβαδόν είναι ίσο με

$$\int_0^2 \sqrt{x} dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) dx.$$

Εξηγήστε γιατί και υπολογίστε το.

(β) Το εμβαδόν είναι ίσο με

$$\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) dx.$$

Εξηγήστε γιατί και υπολογίστε το.

B. Ασκήσεις

11. (α) Θέτουμε $y = \tan \frac{x}{2}$. Ελέγξτε ότι $dx = \frac{2}{1+y^2} dy$, $\cos x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$ και $\sin x = \frac{2y}{1+y^2}$. Αναγώμαστε έτσι στο ολοκλήρωμα

$$\int \frac{(1+y)^2}{y^2(1+y^2)} dy,$$

το οποίο υπολογίζεται με ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(β) Γράφουμε

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} dx$$

και κάνοντας την αντικατάσταση $u = \cos x$ αναγώμαστε στο $\int \frac{1}{u^2-1} du$, το οποίο υπολογίζεται με ανάλυση σε απλά κλάσματα.

(γ) Με την αντικατάσταση $u = x^2 + 1$ αναγώμαστε στον υπολογισμό του

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{2u} + c.$$

(δ) Με την αντικατάσταση $x = \sin u$ αναγώμαστε στον υπολογισμό του

$$\int \frac{1}{\sin u} du,$$

το οποίο υπολογίστηκε στο (β).

(ε) Χρησιμοποιούμε τον αναγωγικό τύπο της Άσκησης 4.

(στ) Με ολοκλήρωση κατά μέρη παίρνουμε

$$\int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + c.$$

Για την τελευταία ισότητα παρατηρήστε ότι

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx = \int dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx.$$

(ζ) Με την αντικατάσταση $u = x^2 + 1$ αναγόμεστε στον υπολογισμό του

$$\int \frac{du}{2\sqrt{u}} = \sqrt{u} + c.$$

(η) Θέτουμε $x^2 - 1 = (x - t)^2$. Ισοδύναμα, $x = \frac{t^2+1}{2t}$. Τότε, $dx = \frac{t^2-1}{2t^2} dt$ και $x - t = \frac{1-t^2}{2t}$, οπότε αναγόμεστε στον υπολογισμό του

$$\int \frac{-(t^2 - 1)^2}{4t^3} dt.$$

12. Με την αντικατάσταση $y = \pi - x$ παίρνουμε

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi - y) \sin y}{1 + \cos^2 y} dy = \pi \int_0^\pi \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y} dy - I,$$

δηλαδή

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y} dy.$$

Το τελευταίο ολοκλήρωμα υπολογίζεται με την αντικατάσταση $u = \cos y$.

13. Η αντικατάσταση $y = \frac{\pi}{2} - x$ δίνει (εξηγήστε γιατί)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = - \int_{\pi/2}^0 \frac{\cos y}{\cos y + \sin y} dy = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx.$$

Αφού

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{2},$$

συμπεραίνουμε ότι

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{4}.$$

14. Η αντικατάσταση $y = \frac{\pi}{4} - x$ δίνει

$$I = \int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx = \int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan(\pi/4 - y)) dy.$$

Παρατηρήστε ότι

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - y\right) = \frac{1 - \tan y}{1 + \tan y},$$

άρα,

$$1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - y\right) = \frac{2}{1 + \tan y}.$$

Συνεπώς,

$$\begin{aligned} I = \int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx &= \int_0^{\pi/4} \log\left(\frac{2}{1 + \tan y}\right) dy \\ &= \int_0^{\pi/4} (\log 2 - \log(1 + \tan y)) dy \\ &= \frac{\pi(\log 2)}{4} - I. \end{aligned}$$

Έπεται ότι

$$I = \frac{\pi(\log 2)}{8}.$$

15. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις: αν $p > -1$ τότε

$$\int_1^{\infty} x^p dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_1^M x^p dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \frac{M^{p+1} - 1}{p+1} = +\infty.$$

Αν $p < -1$ τότε

$$\int_0^1 x^p dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta}^1 x^p dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1 - \delta^{p+1}}{p+1} = +\infty.$$

Τέλος, αν $p = -1$ τότε

$$\int_1^{\infty} x^p dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_1^M \frac{1}{x} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \log M = +\infty.$$

Σε κάθε περίπτωση, έπεται ότι το γενικευμένο ολοκλήρωμα $\int_0^{\infty} x^p dx$ απειρίζεται.

16. (α) Για κάθε $M > 0$ έχουμε

$$\int_0^M x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^M = \frac{1 - e^{-M^2}}{2}.$$

Έπεται ότι

$$\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^M x e^{-x^2} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-M^2}}{2} = \frac{1}{2}.$$

(β) Για κάθε $s \in (0, 1)$ έχουμε

$$\int_0^s \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^s = \arcsin s - \arcsin 0 = \arcsin s.$$

Έπεται ότι

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{s \rightarrow 1^-} \int_0^s \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{s \rightarrow 1^-} \arcsin s = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

Λόγω συμμετρίας,

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

(γ) Για κάθε $\delta \in (0, 1)$ έχουμε

$$\int_{\delta}^1 \log x \, dx = x \log x - x \Big|_{\delta}^1 = -1 - \delta \log \delta + \delta.$$

Έπεται ότι

$$\int_0^1 \log x \, dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta}^1 \log x \, dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} (-\delta \log \delta + \delta - 1) = -1.$$

17. Με επαγωγή: για $n = 0$ έχουμε

$$\int_0^{\infty} e^{-x} \, dx = -e^{-x} \Big|_0^{\infty} = 1.$$

Αν $n \in \mathbb{N}$, τότε, για κάθε $M > 0$ έχουμε

$$\int_0^M e^{-x} x^n \, dx = \int_0^M (-e^{-x})' x^n \, dx = -e^{-x} x^n \Big|_0^M + n \int_0^M e^{-x} x^{n-1} \, dx.$$

Αφήνοντας το $M \rightarrow \infty$ βλέπουμε ότι

$$I_n = \int_0^{\infty} e^{-x} x^n \, dx = n \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1} \, dx = n I_{n-1}.$$

Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι $I_{n-1} = (n-1)!$, τότε $I_n = n \cdot (n-1)! = n!$.

18. (α) Με την αντικατάσταση $y = x^3$ βλέπουμε ότι αρκεί να υπολογίσουμε το

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y e^{-y^2} \int_0^y e^{t^2} \, dt.$$

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του L' Hospital:

$$\frac{\left(\int_0^y e^{t^2} \, dt\right)'}{(ey^2/y)'} = \frac{e^{y^2}}{2ey^2 - ey^2/y^2} = \frac{1}{2 - y^{-2}} \rightarrow \frac{1}{2}$$

όταν $y \rightarrow +\infty$. Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x^6} \int_0^{x^3} e^{t^2} \, dt = \frac{1}{2}.$$

(α) Με την αντικατάσταση $y = x^2$ βλέπουμε ότι αρκεί να υπολογίσουμε το

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{y^2} \int_0^y e^t \sin t \, dt.$$

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του L' Hospital:

$$\frac{(\int_0^y e^t \sin t dt)'}{(y^2)'} = \frac{e^y \sin y}{2y} \rightarrow \frac{1}{2}$$

όταν $y \rightarrow 0^+$. Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^4} \int_0^{x^2} e^t \sin t dt = \frac{1}{2}.$$

9.7 Κυρτές και Κοίλες Συναρτήσεις

Πρώτη Ομάδα

1. Έστω $a = \min\{x_1, \dots, x_m\}$ και $b = \max\{x_1, \dots, x_m\}$. Αφού το I είναι διάστημα και $a, b \in I$, συμπεραίνουμε ότι $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq [a, b] \subseteq I$. Αφού $t_i \geq 0$ και $t_1 + \dots + t_m = 1$, έχουμε

$$a = (t_1 + \dots + t_m)a \leq t_1x_1 + \dots + t_mx_m \leq (t_1 + \dots + t_m)b = b,$$

δηλαδή, $t_1x_1 + \dots + t_mx_m \in I$.

Θα δείξουμε την $f(t_1x_1 + \dots + t_mx_m) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_mf(x_m)$ με επαγωγή ως προς m . Για $m = 1$ δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε, ενώ για $m = 2$ η ανισότητα ισχύει από τον ορισμό της κυρτής συνάρτησης.

Για το επαγωγικό βήμα υποθέτουμε ότι $m \geq 2$, $x_1, \dots, x_{m+1} \in I$ και $t_1, \dots, t_{m+1} \geq 0$ με $t_1 + \dots + t_{m+1} = 1$. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιος $t_i < 1$ (αλλιώς, η ανισότητα ισχύει τετριμμένα). Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι $t_{m+1} < 1$. Θέτουμε $t = t_1 + \dots + t_m = 1 - t_{m+1} > 0$. Αφού $x_1, \dots, x_m \in I$ και $\frac{t_1}{t} + \dots + \frac{t_m}{t} = 1$, η επαγωγική υπόθεση μας δίνει

$$x = \frac{t_1}{t}x_1 + \dots + \frac{t_m}{t}x_m \in I$$

και

$$tf(x) = tf\left(\frac{t_1}{t}x_1 + \dots + \frac{t_m}{t}x_m\right) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_mf(x_m).$$

Εφαρμόζοντας τώρα τον ορισμό της κυρτής συνάρτησης, παίρνουμε

$$f(tx + t_{m+1}x_{m+1}) \leq tf(x) + t_{m+1}f(x_{m+1}).$$

Συνδυάζοντας τις δύο προηγούμενες ανισότητες, έχουμε

$$\begin{aligned} f(t_1x_1 + \dots + t_mx_m + t_{m+1}x_{m+1}) &= f(tx + t_{m+1}x_{m+1}) \\ &\leq t_1f(x_1) + \dots + t_mf(x_m) + t_{m+1}f(x_{m+1}). \end{aligned}$$

2. Έστω $x, y \in I$ και έστω $t \in [0, 1]$. Από την υπόθεση έχουμε $f_n(x) \rightarrow f(x)$, $f_n(y) \rightarrow f(y)$ και $f_n((1-t)x + ty) \rightarrow f((1-t)x + ty)$ όταν το $n \rightarrow \infty$. Από την κυρτότητα των f_n έχουμε

$$f_n((1-t)x + ty) \leq (1-t)f_n(x) + tf_n(y)$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Άρα,

$$\begin{aligned} f((1-t)x + ty) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_n((1-t)x + ty) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} ((1-t)f_n(x) + tf_n(y)) \\ &= (1-t) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) + t \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(y) = (1-t)f(x) + tf(y). \end{aligned}$$

Αφού τα $x, y \in I$ και $t \in [0, 1]$ ήταν τυχόντα, η f είναι κυρτή.

3. Έστω $x, y \in I$ και έστω $t \in [0, 1]$. Από τον ορισμό της f και την κυρτότητα των f_n , για κάθε $n \in \mathbb{N}$ έχουμε

$$f_n((1-t)x + ty) \leq (1-t)f_n(x) + tf_n(y) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Ο αριθμός $(1-t)f(x) + tf(y)$ είναι άνω φράγμα του συνόλου $\{f_n((1-t)x + ty) : n \in \mathbb{N}\}$, άρα

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Αφού τα $x, y \in I$ και $t \in [0, 1]$ ήταν τυχόντα, η f είναι κυρτή.

4. Έστω $x, y \in \mathbb{R}$ και έστω $t \in [0, 1]$. Αφού η f είναι κυρτή, έχουμε

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Η g είναι αύξουσα, άρα

$$(g \circ f)((1-t)x + ty) = g(f((1-t)x + ty)) \leq g((1-t)f(x) + tf(y)).$$

Αφού η g είναι κυρτή, έχουμε

$$g((1-t)f(x) + tf(y)) \leq (1-t)g(f(x)) + tg(f(y)) = (1-t)(g \circ f)(x) + t(g \circ f)(y).$$

Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες ανισότητες παίρνουμε

$$(g \circ f)((1-t)x + ty) \leq (1-t)(g \circ f)(x) + t(g \circ f)(y).$$

Αφού τα $x, y \in \mathbb{R}$ και $t \in [0, 1]$ ήταν τυχόντα, η $g \circ f$ είναι κυρτή.

5. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

(α) $x_1 + \delta < x_2$: Εφαρμόζοντας το λήμμα των τριών χορδών για τα $x_1 < x_1 + \delta < x_2$ και $x_1 + \delta < x_2 < x_2 + \delta$, παίρνουμε

$$\frac{f(x_1 + \delta) - f(x_1)}{\delta} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1 + \delta)}{x_2 - x_1 - \delta} \leq \frac{f(x_2 + \delta) - f(x_2)}{\delta}.$$

Συνεπώς, $f(x_1 + \delta) - f(x_1) \leq f(x_2 + \delta) - f(x_2)$.

(β) $x_2 < x_1 + \delta$: Εφαρμόζοντας το λήμμα των τριών χορδών για τα $x_1 < x_2 < x_1 + \delta$ και $x_2 < x_1 + \delta < x_2 + \delta$, παίρνουμε

$$\frac{f(x_1 + \delta) - f(x_1)}{\delta} \leq \frac{f(x_1 + \delta) - f(x_2)}{x_1 + \delta - x_2} \leq \frac{f(x_2 + \delta) - f(x_2)}{\delta}.$$

Συνεπώς, $f(x_1 + \delta) - f(x_1) \leq f(x_2 + \delta) - f(x_2)$.

(γ) $x_2 = x_1 + \delta$: Το ζητούμενο έπεται άμεσα από το λήμμα των τριών χορδών για τα $x_1 < x_2 = x_1 + \delta < x_2 + \delta$.

6. (α) Η $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 1 - \sqrt{x}$ είναι κυρτή και φραγμένη συνάρτηση. Δεν είναι όμως Lipschitz συνεχής στο $[0, 1]$. Παρατηρήστε ότι

$$\frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty \text{ καθώς το } x \rightarrow 0^+.$$

(β) Ελέγξτε ότι η $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^2$ όταν $-1 < x < 1$ και $f(-1) = f(1) = 2$ είναι κυρτή συνάρτηση. Όμως, δεν είναι συνεχής στα άκρα του $[-1, 1]$.

7. (α) Υποθέτουμε ότι η f έχει ολικό μέγιστο στο ξ . Τότε, $f(x) \leq f(\xi)$ για κάθε $x \in (a, b)$. Επιλέγουμε τυχόντα $x_1, x_2 \in (a, b)$ με $x_1 < \xi < x_2$. Ψάχνει $t \in (0, 1)$ ώστε $\xi = (1 - t)x_1 + tx_2$. Η f είναι κυρτή, άρα

$$f(\xi) \leq (1 - t)f(x_1) + tf(x_2) \leq (1 - t)f(\xi) + tf(\xi) = f(\xi).$$

Αναγκαστικά, $f(x_1) = f(x_2) = f(\xi)$ (εξηγήστε γιατί). Έπεται ότι $f(x) = f(\xi)$ για κάθε $x \in (a, b)$ (δηλαδή, η f είναι σταθερή).

(β) Υποθέτουμε ότι η f έχει ολικό ελάχιστο στο ξ . Έστω $a < x < y < \xi$. Υπάρχει $t \in (0, 1)$ ώστε $y = (1 - t)x + t\xi$. Η f είναι κυρτή και $f(\xi) \leq f(y)$, άρα

$$f(y) \leq (1 - t)f(x) + tf(\xi) \leq (1 - t)f(x) + tf(y),$$

άρα $(1 - t)f(y) \leq (1 - t)f(x)$. Αφού $0 < 1 - t < 1$, συμπεραίνουμε ότι $f(y) \leq f(x)$. Αυτό δείχνει ότι η f είναι φθίνουσα στο (a, ξ) . Με τον ίδιο τρόπο ελέγχουμε ότι η f είναι αύξουσα στο (ξ, b) .

(γ) Υποθέτουμε ότι η f έχει τοπικό ελάχιστο στο ξ . Υπάρχει $\delta > 0$ ώστε $(\xi - 2\delta, \xi + 2\delta) \subset (a, b)$ και $f(x) \geq f(\xi)$ για κάθε $x \in (\xi - 2\delta, \xi + 2\delta)$.

Ας υποθέσουμε ότι για κάποιο $y \in (\xi, b)$ ισχύει $f(y) < f(\xi)$. Αναγκαστικά, έχουμε $y \geq \xi + 2\delta$. Υπάρχει $t \in (0, 1)$ ώστε $\xi + \delta = (1 - t)\xi + ty$. Από την κυρτότητα της f παίρνουμε

$$f(\xi) \leq f(\xi + \delta) \leq (1 - t)f(\xi) + tf(y) < f(\xi)$$

το οποίο είναι άτοπο.

Αν υποθέσουμε ότι για κάποιο $y \in (a, \xi)$ ισχύει $f(y) < f(\xi)$, καταλήγουμε σε άτοπο με τον ίδιο τρόπο. Άρα, η f έχει ολικό ελάχιστο στο ξ .

(δ) Υποθέτουμε ότι η f είναι γνησίως κυρτή. Έστω ότι η f έχει ολικό ελάχιστο m στα $x < y$. Τότε,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{f(x) + f(y)}{2} = \frac{m + m}{2} = m$$

από την γνήσια κυρτότητα της f . Καταλήξαμε σε άτοπο, άρα η f έχει το πολύ ένα σημείο ολικού ελαχίστου.

8. Έστω ότι η f δεν είναι σταθερή. Υπάρχουν $x \neq y$ στο \mathbb{R} με $f(x) < f(y)$. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(α) $x < y$: Έστω $z > y$. Τότε,

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y},$$

δηλαδή

$$f(z) \geq A(z) := f(y) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x}(z - y).$$

Παρατηρήστε ότι $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} > 0$, άρα $\lim_{z \rightarrow +\infty} A(z) = +\infty$. Έπεται ότι η f δεν είναι άνω φραγμένη.

(β) $y < x$: Έστω $z < y$. Τότε,

$$\frac{f(y) - f(z)}{y - z} \leq \frac{f(x) - f(y)}{x - y},$$

δηλαδή

$$f(z) \geq B(z) := f(y) - \frac{f(x) - f(y)}{x - y}(y - z).$$

Παρατηρήστε ότι $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} < 0$, άρα $\lim_{z \rightarrow -\infty} B(z) = +\infty$. Έπεται ότι η f δεν είναι άνω φραγμένη.

9. Έστω I ένα φραγμένο διάστημα και έστω $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτή συνάρτηση. Θεωρούμε τυχόντα $a < b$ στο εσωτερικό του I . Ορίζουμε $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Η g είναι γραμμική και συμπίπτει με την f στα a και b . Δείξτε διαδοχικά τα εξής:

- (i) Η g είναι κάτω φραγμένη στο I : υπάρχει $m \in \mathbb{R}$ ώστε $g(x) \geq m$ για κάθε $x \in I$.
- (ii) Αν $x \in I$ και $x < a$ ή $x > b$, τότε $f(x) \geq g(x) \geq m$.
- (iii) Η f παίρνει ελάχιστη τιμή m' στο $[a, b]$.
- (iv) Η f είναι κάτω φραγμένη στο I : για κάθε $x \in I$ ισχύει η $f(x) \geq \min\{m, m'\}$.

10. Η f είναι αύξουσα και άνω φραγμένη, άρα υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) \right) = 0.$$

Για κάθε $x > 0$ εφαρμόζουμε το θεώρημα μέσης τιμής στο $[x/2, x]$: υπάρχει $\xi_x \in (x/2, x)$ ώστε

$$f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = f'(\xi_x) \frac{x}{2}.$$

Αφού η f είναι κοίλη, η f' είναι φθίνουσα (και μη αρνητική, γιατί η f είναι αύξουσα). Άρα,

$$f'(\xi_x) \geq f'(x) \geq 0.$$

Από τις προηγούμενες σχέσεις βλέπουμε ότι

$$0 \leq x f'(x) \leq 2 \left(f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) \right) \rightarrow 0.$$

Άρα, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f'(x) = 0$.

Δεύτερη Ομάδα

11. (α) Η συνάρτηση $x \mapsto \log x$ είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$. Αφού $r_i > 0$ και $r_1 + \dots + r_n = 1$, η ανισότητα του Jensen (για την κυρτή συνάρτηση $-\log$) δείχνει ότι

$$r_1 \log x_1 + \dots + r_n \log x_n \leq \log(r_1 x_1 + \dots + r_n x_n).$$

Δηλαδή,

$$\log(x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n}) \leq \log(r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n).$$

Αφού η εκθετική συνάρτηση $x \mapsto e^x$ είναι αύξουσα, έπεται ότι

$$x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} \leq r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n.$$

(β) Η ανισότητα αριθμητικού-γεωμετρικού μέσου

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$$

όπου $x_1, \dots, x_n > 0$, προκύπτει από το (α) αν πάρουμε $r_1 = \cdots = r_n = \frac{1}{n}$.

12. Από την προηγούμενη Άσκηση, αν $x, y > 0$ και $t, s > 0$ με $t + s = 1$, τότε

$$x^t y^s \leq tx + sy.$$

Αν $p, q > 1$ με $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ και αν (στην προηγούμενη ανισότητα) πάρουμε τους x^p, y^q στη θέση των x, y και τους $\frac{1}{p}, \frac{1}{q}$ στη θέση των t, s , βλέπουμε ότι

$$(*) \quad xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

Έστω $a_1, \dots, a_n > 0, b_1, \dots, b_n > 0$ και $p, q > 1$ με $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Θέλουμε να δείξουμε ότι

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

Θέτουμε $A = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p}$, $B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}$ και $x_i = a_i/A$, $y_i = b_i/B$. Τότε, η ζητούμενη ανισότητα παίρνει τη μορφή

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq 1.$$

Από την (*) έχουμε

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i^p}{p} + \frac{y_i^q}{q} \right) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n y_i^q.$$

Παρατηρούμε ότι

$$\sum_{i=1}^n x_i^p = \frac{1}{A^p} \sum_{i=1}^n a_i^p = 1 \quad \text{και} \quad \sum_{i=1}^n y_i^q = \frac{1}{B^q} \sum_{i=1}^n b_i^q = 1.$$

Άρα,

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = 1.$$

Έπεται το ζητούμενο.

13. Θέτουμε $S = x_1 + \dots + x_m$ και εφαρμόζουμε την ανισότητα του Jensen ως εξής: αφού η f είναι κυρτή και

$$\frac{y_1 + \dots + y_m}{S} = \frac{x_1}{S} \frac{y_1}{x_1} + \dots + \frac{x_m}{S} \frac{y_m}{x_m},$$

παίρνουμε

$$f\left(\frac{y_1 + \dots + y_m}{x_1 + \dots + x_m}\right) = f\left(\frac{y_1 + \dots + y_m}{S}\right) \leq \sum_{i=1}^m \frac{x_i}{S} f\left(\frac{y_i}{x_i}\right).$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη αυτής της ανισότητας επί S παίρνουμε το ζητούμενο.

Έστω $p \geq 1$. Τότε, η $f(x) = (1 + x^p)^{1/p}$ είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$: αυτό προκύπτει αν παραγωγίσουμε δύο φορές. Έχουμε $f'(x) = x^{p-1}(1 + x^p)^{\frac{1}{p}-1}$ και

$$f''(x) = (p-1)x^{p-2}(1+x^p)^{\frac{1}{p}-1} - (p-1)x^{2p-2}(1+x^p)^{\frac{1}{p}-2} = (p-1)x^{p-2}(1+x^p)^{\frac{1}{p}-2} \geq 0.$$

Παρατηρούμε ότι

$$((x_1 + \dots + x_m)^p + (y_1 + \dots + y_m)^p)^{1/p} = (x_1 + \dots + x_m) f\left(\frac{y_1 + \dots + y_m}{x_1 + \dots + x_m}\right).$$

Εφαρμόζοντας την ανισότητα του πρώτου ερωτήματος βλέπουμε ότι η τελευταία ποσότητα φράσσεται από

$$\sum_{i=1}^m x_i f\left(\frac{y_i}{x_i}\right) = \sum_{i=1}^m x_i \left(1 + \frac{y_i^p}{x_i^p}\right)^{1/p} = \sum_{i=1}^m (x_i^p + y_i^p)^{1/p}.$$

14. Έχουμε $(-\sin x)'' = \sin x \geq 0$ στο $[0, \pi]$, άρα η $f(x) = -\sin x$ είναι κυρτή στο $[0, \pi]$.

Έστω T ένα n -γωνο που εγγράφεται στο μοναδιαίο κύκλο. Αν ϕ_1, \dots, ϕ_n είναι οι επίκεντρες γωνίες που αντιστοιχούν στις πλευρές του και ℓ_1, \dots, ℓ_n είναι τα μήκη των πλευρών του, τότε

$$\ell_i = 2 \sin \frac{\phi_i}{2} \quad \text{για κάθε } i = 1, \dots, n.$$

Άρα, η περίμετρος P του T ισούται με

$$P = 2 \sum_{i=1}^n \sin \frac{\phi_i}{2}.$$

Όμως, $\sum_{i=1}^n \phi_i = 2\pi$, άρα $\sum_{i=1}^n \frac{\phi_i}{2} = \pi$. Η $g(x) = -\sin x$ είναι κυρτή στο $[0, \pi]$ και $\phi_i/2 \in [0, \pi]$ για κάθε $i = 1, \dots, n$. Από την ανισότητα του Jensen,

$$-\sin \left(\frac{1}{n} \frac{\phi_1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \frac{\phi_n}{2} \right) \leq -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{\phi_i}{2},$$

δηλαδή,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{\phi_i}{2} \leq \sin \left(\frac{2\pi}{2n} \right).$$

Άρα,

$$P = 2 \sum_{i=1}^n \sin \frac{\phi_i}{2} \leq 2n \sin \frac{\pi}{n}.$$

15. Θέτουμε $x_i = \log \alpha_i$ ($i = 1, \dots, n$). Για να δείξουμε την

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_n) \geq \left(1 + (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)^{1/n} \right)^n$$

αρκεί να δείξουμε ότι

$$\left(1 + e^{\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}} \right)^n \leq (1 + e^{x_1})(1 + e^{x_2}) \cdots (1 + e^{x_n}),$$

ή, ισοδύναμα,

$$\log \left(1 + e^{\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}} \right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + e^{x_i}).$$

Η τελευταία ανισότητα προκύπτει από την ανισότητα του Jensen, αν δείξουμε ότι η συνάρτηση $g(x) = \log(1 + e^x)$ είναι κυρτή. Παρατηρήστε ότι $g'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ και $g''(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} \geq 0$. Έπεται το ζητούμενο.

Τρίτη Ομάδα

16. Έστω $x, y \in I$ και έστω $t \in (0, 1)$. Θέλουμε να δείξουμε ότι

$$\frac{1-t}{f(x)} + \frac{t}{f(y)} - \frac{1}{f((1-t)x + ty)} = \frac{(1-t)f(y) + tf(x)}{f(x)f(y)} - \frac{1}{f((1-t)x + ty)} \geq 0,$$

η οποία ισχύει αν και μόνο αν

$$A := f((1-t)x + ty) \cdot ((1-t)f(y) + tf(x)) \geq f(x)f(y).$$

Αφού η f είναι κοίλη, έχουμε

$$\begin{aligned} A &\geq ((1-t)f(x) + tf(y))((1-t)f(y) + tf(x)) \\ &= [(1-t)^2 + t^2]f(x)f(y) + t(1-t)[f^2(y) + f^2(x)] \\ &\geq [(1-t)^2 + t^2]f(x)f(y) + t(1-t) \cdot 2f(x)f(y) \\ &= f(x)f(y), \end{aligned}$$

όπου, στο προτελευταίο βήμα, χρησιμοποιήσαμε την $a^2 + b^2 \geq 2ab$.

Άλλος τρόπος: Έχουμε $\frac{1}{f} = \exp\left(\log \frac{1}{f}\right)$. Αφού η \exp είναι κυρτή και αύξουσα, αρκεί να δείξουμε ότι η $\log \frac{1}{f}$ είναι κυρτή (Άσκηση 4). Όμως, $\log \frac{1}{f} = -\log f$, οπότε αρκεί να δείξουμε ότι η $\log f$ είναι κοίλη. Αφού η f είναι κοίλη και η \log είναι κοίλη και αύξουσα, επιχείρημα όμοιο με αυτό της Άσκησης 4 δείχνει ότι η $\log f$ είναι κοίλη.

17. Έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx \, dx &= \frac{1}{k} \int_0^{2k\pi} f\left(\frac{y}{k}\right) \cos y \, dy \\ &= \frac{1}{k} \sum_{m=0}^{k-1} \int_{2m\pi}^{2m\pi+2\pi} f\left(\frac{y}{k}\right) \cos y \, dy \\ &= \frac{1}{k} \sum_{m=0}^{k-1} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{y+2m\pi}{k}\right) \cos y \, dy. \end{aligned}$$

Για κάθε $m = 0, \dots, k-1$, η συνάρτηση $g_m(y) = f\left(\frac{y+2m\pi}{k}\right)$ είναι κυρτή στο $[0, 2\pi]$ (εξηγήστε γιατί). Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι αν $g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια κυρτή συνάρτηση τότε $\int_0^{2\pi} g(x) \cos x \, dx \geq 0$ (το ζητούμενο, για $k = 1$). Γράφουμε

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} g(x) \cos x \, dx &= \int_0^{\pi/2} g(x) \cos x \, dx + \int_{\pi/2}^{\pi} g(x) \cos x \, dx \\ &\quad + \int_{\pi}^{3\pi/2} g(x) \cos x \, dx + \int_{3\pi/2}^{2\pi} g(x) \cos x \, dx. \end{aligned}$$

Κάνοντας τις αλλαγές μεταβλητής $y = \pi - x$, $z = x - \pi$, $w = 2\pi - x$ βλέπουμε ότι

$$\begin{aligned} \int_{\pi/2}^{\pi} g(x) \cos x \, dx &= - \int_0^{\pi/2} g(\pi - y) \cos y \, dy \\ \int_{\pi}^{3\pi/2} g(x) \cos x \, dx &= - \int_0^{\pi/2} g(z + \pi) \cos z \, dz \\ \int_{3\pi/2}^{2\pi} g(x) \cos x \, dx &= \int_0^{\pi/2} g(2\pi - w) \cos w \, dw, \end{aligned}$$

άρα

$$\int_0^{2\pi} g(x) \cos x \, dx = \int_0^{\pi/2} [g(x) - g(\pi - x) - g(\pi + x) + g(2\pi - x)] \cos x \, dx.$$

Αν $0 \leq x \leq \pi/2$ τότε $x \leq \pi - x \leq \pi + x \leq 2\pi - x$. Η g είναι κυρτή, άρα

$$\frac{g(\pi - x) - g(x)}{(\pi - x) - x} \leq \frac{g(2\pi - x) - g(\pi + x)}{(2\pi - x) - (\pi + x)}.$$

Όμως, $(\pi - x) - x = \pi - 2x = (2\pi - x) - (\pi + x)$. Άρα,

$$g(x) - g(\pi - x) - g(\pi + x) + g(2\pi - x) \geq 0.$$

Αφού $\cos x \geq 0$ στο $[0, \pi/2]$, έπεται ότι $\int_0^{2\pi} g(x) \cos x \, dx \geq 0$.

18. Υποθέτουμε πρώτα ότι η f είναι κυρτή. Έστω $x \in (a, b)$ και $h > 0$ για το οποίο $[x - h, x + h] \subset (a, b)$. Για κάθε $t \in [0, h]$ έχουμε

$$f(x) \leq \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2}$$

από την κυρτότητα της f . Παρατηρήστε ότι

$$\begin{aligned} \int_{-h}^h f(x+t) \, dt &= \int_0^h f(x+t) \, dt + \int_0^h f(x-t) \, dt \\ &= \int_0^h (f(x+t) + f(x-t)) \, dt \\ &\geq \int_0^h 2f(x) \, dt \\ &= 2hf(x). \end{aligned}$$

Δηλαδή,

$$(*) \quad f(x) \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x+t) \, dt.$$

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η συνεχής συνάρτηση $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί την (*) για κάθε διάστημα $[x - h, x + h] \subset (a, b)$. Έστω $[x, y] \subset (a, b)$. Η f παίρνει μέγιστη τιμή στο $[x, y]$ (λόγω συνέχειας). Ας υποθέσουμε ότι αυτή η μέγιστη τιμή δεν πιάνεται σε κάποιο από τα x ή y . Δηλαδή, υπάρχει $c \in (x, y)$ ώστε $f(z) \leq f(c)$ για κάθε $z \in [x, y]$ και $\max\{f(x), f(y)\} < f(c)$. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι $h = c - x \leq y - c$. Τότε, η μέγιστη τιμή της f στο $[c - h, c + h]$ παίρνεται στο σημείο c και $f(c - h) = f(x) < f(c)$. Αφού η f είναι συνεχής στο $[c - h, c + h]$, συμπεραίνουμε ότι

$$\int_{-h}^h f(c+t) \, dt < 2h \cdot f(c).$$

Τότε, η υπόθεση (*) οδηγεί σε άτοπο: έχουμε

$$f(c) \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(c+t) dt < f(c).$$

Έχουμε λοιπόν δείξει το εξής:

Ισχυρισμός. Αν η συνεχής συνάρτηση $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί την (*) για κάθε διάστημα $[x-h, x+h] \subset (a, b)$, τότε για κάθε διάστημα $[x, y] \subset (a, b)$ η μέγιστη τιμή της f στο $[x, y]$ παίρνεται σε κάποιο από τα άκρα του $[x, y]$.

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω θα δείξουμε ότι η f είναι κυρτή. Έστω $x < y$ στο (a, b) . Θεωρούμε τη γραμμική συνάρτηση $\ell : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ που συμπίπτει με την f στα x και y . Δηλαδή,

$$\ell(z) = f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x}(z - x).$$

Παρατηρήστε ότι

$$\ell(z) = \frac{1}{2h} \int_{-h}^h \ell(z+t) dt$$

για κάθε $z \in (a, b)$ και $[z-h, z+h] \subset (a, b)$. Άρα, η συνάρτηση $g := f - \ell$ ικανοποιεί την

$$g(z) \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h g(z+t) dt$$

για κάθε $z \in (a, b)$ και $[z-h, z+h] \subset (a, b)$. Από τον ισχυρισμό, η g παίρνει τη μέγιστη τιμή της στο $[x, y]$ σε κάποιο από τα x, y . Όμως, $g(x) = f(x) - \ell(x) = 0$ και, όμοια, $g(y) = 0$. Άρα, $f(z) \leq \ell(z)$ για κάθε $z \in [x, y]$. Ισοδύναμα, για κάθε $t \in [0, 1]$ έχουμε

$$f((1-t)x + ty) \leq f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x}[t(y - x)] = (1-t)f(x) + tf(y).$$

Αφού τα $x, y \in (a, b)$ και $t \in [0, 1]$ ήταν τυχόντα, η f είναι κυρτή.

19. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο c , τότε

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c-h) - f(c)}{-h} = - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c-h) - f(c)}{h},$$

άρα

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) + f(c-h) - 2f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c-h) - f(c)}{h} = 0.$$

Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι

$$(*) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) + f(c-h) - 2f(c)}{h} = 0.$$

Αφού η f είναι κυρτή, υπάρχουν οι πλευρικές παράγωγοι

$$f'_+(c) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \quad \text{και} \quad f'_-(c) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c-h) - f(c)}{-h}.$$

Αφαιρώντας κατά μέλη παίρνουμε

$$f'_+(c) - f'_-(c) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) + f(c-h) - 2f(c)}{h}.$$

Από την (*), το τελευταίο όριο είναι ίσο με 0. Άρα, $f'_+(c) = f'_-(c)$. Συνεπώς, η f είναι παραγωγίσιμη στο c .

20. Έστω $x > 0$. Κάνοντας την αλλαγή μεταβλητής $t = xs$ βλέπουμε ότι

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(xs) ds.$$

Έστω $x, y > 0$ και $t \in [0, 1]$. Από την κυρτότητα της f έχουμε

$$f([(1-t)x + ty]s) \leq (1-t)f(xs) + tf(ys)$$

για κάθε $s \in [0, 1]$. Άρα,

$$\begin{aligned} F((1-t)x + ty) &= \int_0^1 f([(1-t)x + ty]s) ds \\ &\leq (1-t) \int_0^1 f(xs) ds + t \int_0^1 f(ys) ds \\ &= (1-t)F(x) + tF(y). \end{aligned}$$

Επίσης, χρησιμοποιώντας τις $f(0) = 0$ και $F(0) = 0$ βλέπουμε ότι: για κάθε $x > 0$ και για κάθε $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} F((1-t)0 + tx) &= \int_0^1 f([(1-t)0 + tx]s) ds \\ &\leq (1-t) \int_0^1 f(0) ds + t \int_0^1 f(xs) ds \\ &= tF(x) = (1-t)F(0) + tF(x). \end{aligned}$$

Από τα παραπάνω έπεται ότι η F είναι κυρτή.