

Ο χώρος Hilbert του Hardy και οι τελεστές του

Απο τις διαφανειες των παραδοσεων, Χειμερινό Εξάμηνο 2023

1 Ο Χώρος H^2 του Hardy

Αν $a_n \in \mathbb{C}$ και $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$ τότε για κάθε $r \in (0, 1)$ έχουμε $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n < \infty$ συνεπώς η δύναμοσειρα $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ συγκλίνει απολυτα για κάθε $z \in \mathbb{D}$ και ομοιομορφα σε κάθε δισκο ακτινας $r < 1$, αρα οριζει συναρτηση $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ που μαλιστα εχει μιγαδικη παραγωγο (και καθε ταξης), ειναι δηλαδη **ολομορφη** στον ανοικτο δισκο \mathbb{D} .

Ορισμός 1.

$$H^2 := \left\{ f : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{με} \quad \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \right\}$$

Η $(a_n) \mapsto f : \ell^2 \rightarrow H^2$ ειναι γραμμικος ισομορφισμος.¹ Αρα, με το **εσωτερικο γινομενο** $\langle f, g \rangle := \sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{b}_n$, οπου $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ (και νορμα $\|f\| := \langle f, f \rangle^{1/2}$), ο H^2 ειναι **χωρος Hilbert**.

Ο H^2 ειναι χωρος (ολομορφων) συναρτησεων $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$.

Μεχρι εκει ομως:

Παράδειγμα 2. Η $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ ανηκει στον H^2 , αλλα δεν επεκτεινεται σε μεγαλυτερο δισκο (δεν οριζεται καν οταν $z = 1 \in \bar{\mathbb{D}}$).

Παράδειγμα 3. Η $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ (οριζεται και) ειναι ολομορφη στο \mathbb{D} , αλλα δεν ανηκει στον H^2 .

Θεώρημα 4. Για καθε $z_0 \in \mathbb{D}$, η απεικονιση $f \mapsto f(z_0) : (H^2, \|\cdot\|) \rightarrow (\mathbb{C}, |\cdot|)$ ειναι συνεχης. Μαλιστα, $f(z_0) = \langle f, k_{z_0} \rangle$ για καθε $f \in H^2$, οπου $k_{z_0}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \bar{z}_0^n z^n$.

Πρβλ:

Παρατήρηση 5. Στον χωρο $C([0, 1])$ με εσωτ. γινομενο $\langle f, g \rangle := \int f(t) \overline{g(t)} dt$ η απεικονιση $f \mapsto f(1) : (C([0, 1]), \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{C}, |\cdot|)$ ΔΕΝ ειναι συνεχης.

¹Εξπλ.είν Χουαί!

Πρόταση 6. Αν $\|f_n - f\| \rightarrow 0$ στον H^2 , τότε $f_n(z) \rightarrow f(z)$ ομοιομορφα στα συμπαγή υποσυνολα του \mathbb{D} .

Ορισμός 7. Η συναρτηση $k(z, w) := k_w(z) = \frac{1}{1-\bar{w}z}$, $(z, w) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}$ λεγεται **πυρηνας του Szegő**.

Εχουμε $f(z_0) = \langle f, k_{z_0} \rangle$ για καθε $f \in H^2$.

Reproducing Kernel Hilbert Spaces

Εστω X μη κενο συνολο (σνηθως $X \subseteq \mathbb{C}^d$). Ενας χωρος \mathcal{H} λεγεται **Reproducing Kernel Hilbert Space** στο X οταν

(α) αποτελείται απο συναρτησεις $X \rightarrow \mathbb{C}$ και ειναι γραμμικος χωρος με πραξεις κατα σημειο,

(β) ειναι εφοδιασμενος με ενα εσωτερικο γινομενο ως προς το οποιο ειναι χωρος Hilbert, και

(γ) για καθε $z_0 \in X$ η απεικονιση $f \mapsto f(z_0) : (\mathcal{H}, \|\cdot\|) \rightarrow (\mathbb{C}, |\cdot|)$ ειναι συνεχης.

Επεται τοτε (Θεωρημα Riesz) ότι για καθε $z_0 \in X$ υπαρχει $k_{z_0} \in \mathcal{H}$ ωστε $f(z_0) = \langle f, k_{z_0} \rangle$ για καθε $f \in \mathcal{H}$. Η συναρτηση

$$k(z, w) := k_w(z) \quad (z, w) \in X \times X$$

λεγεται **πυρηνας αναπαγωγης (reproducing kernel)** για τον \mathcal{H} .

Ο Χωρος \tilde{H}^2 του Hardy στον κυκλο \mathbb{T}

Θυμιζουμε τον $L^2(\mathbb{T})$ με εσωτερικο γινομενο $\langle f, g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \overline{g(e^{it})} dt$ και ορθοκανονικη βαση $\{f_n : n \in \mathbb{Z}\}$ οπου $f_n(e^{it}) = e^{int}$. Γραφουμε $\hat{f}(k) = \langle f, f_k \rangle$, $k \in \mathbb{Z}$.

Δηλαδη $\langle f_n, f_m \rangle = \delta_{mn}$ και για καθε $f \in L^2(\mathbb{T})$ εχουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{|k| \leq n} \hat{f}(k) f_k \right\|_{L^2} = 0 \quad \text{και} \quad \|f\|_{L^2}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2.$$

Ειναι η $\|\cdot\|_{L^2}$ - κλειστη θηκη των *τριγ. πολυωνυμων* $\text{span}\{f_k : k \in \mathbb{Z}\}$.

Ορισμός 8. $\tilde{H}^2 := \{ \tilde{f} \in L^2(\mathbb{T}) : \langle \tilde{f}, f_n \rangle = 0 \forall n < 0 \}$.

Ο \tilde{H}^2 ειναι κλειστος γραμμ. υποχωρος του $L^2(\mathbb{T})$. Ειναι η $\|\cdot\|_{L^2}$ - κλειστη θηκη των *αναλυτικων τριγ. πολυωνυμων* $\text{span}\{f_k : k \in \mathbb{Z}_+\}$.

Ο Χωρος \tilde{H}^2 και ο χωρος H^2

\tilde{H}^2 : αποτελείται από (σχ. παντου ορισμενες) συναρτησεις $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$.

H^2 : αποτελείται απο συναρτησεις $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$. Ειναι η $\|\cdot\|_{H^2}$ - κλειστη θηκη των *πολυωνυμων* $\text{span}\{\zeta_k : k \in \mathbb{Z}_+\}$ οπου $\zeta_k(z) = z^k$, $z \in \mathbb{D}$.

Ισομορφισμοι:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n \leftrightarrow (a_n) \leftrightarrow \tilde{f} \sim \sum_{n \geq 0} a_n f_n$$

$$H^2 \leftrightarrow \ell^2 \leftrightarrow \tilde{H}^2$$

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad a_n = \langle \tilde{f}, f_n \rangle$$

Θεώρημα 9. Αν $f \in H^2$ με $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ορίζουμε για $r \in (0, 1)$

$$f_r(e^{it}) = f(re^{it}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n e^{int}, \quad e^{it} \in \mathbb{T}.$$

Τότε $f_r \in \tilde{H}^2$ και υπάρχει το

$$\lim_{r \nearrow 1} f_r := \tilde{f} \quad \text{ως προς τη νόρμα του } \tilde{H}^2$$

οπότε $\tilde{f} \in \tilde{H}^2$ με $\langle \tilde{f}, f_n \rangle = a_n \quad \forall n \geq 0$.

Πόρισμα 10. Αν $f \in H^2$ υπάρχει (r_n) με $0 \leq r_n \nearrow 1$ ώστε

$$\lim_n f(r_n e^{it}) = \tilde{f}(e^{it})$$

σχεδόν για κάθε $e^{it} \in \mathbb{T}$.

Ο Χώρος H^2 του Hardy: εναλλακτικός ορισμός

Θεώρημα 11. Εστω $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ολομορφη. Εχουμε

$$f \in H^2 \iff \sup_{0 < r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(re^{it})|^2 dt < \infty.$$

Μάλιστα

$$f \in H^2 \implies \sup_{0 < r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(re^{it})|^2 dt = \|f\|^2.$$

Πόρισμα 12. Εστω $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ολομορφη. Η συναρτηση

$$r \mapsto M(r) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(re^{it})|^2 dt$$

είναι αυξουσα στο $(0, 1)$. Η f ανηκει στον H^2 αν-ν η $r \mapsto M(r)$ είναι φραγμενη, και τότε $\|f\|^2 = \lim_{r \nearrow 1} M(r)$.

Θεώρημα 13 (Ολοκληρωτικός τυπος Cauchy). Αν f είναι ολομορφη σε ανοικτο συνολο που περιχει τον κλειστο δισκο $\bar{\mathbb{D}}$, τότε για κάθε $z_0 \in \mathbb{D}$ εχουμε

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{T}} \frac{f(w)}{w - z_0} dw.$$

Θεώρημα 14 (Ολοκληρωτικός τύπος Poisson). Αν $f \in H^2$ με αντιστοιχία $\tilde{f} \in \tilde{H}^2$ τότε για κάθε $re^{it} \in \mathbb{D}$ έχουμε

$$f(re^{it}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(e^{is}) P_r(s-t) ds$$

όπου P_r ο πυρήνας Poisson

$$P_r(\theta) := \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2}, \quad r \in [0,1), \theta \in [0,2\pi].$$

2 Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών

Υπενθυμιση: Φραγμενοι τελεστες

Έστω $(E, \|\cdot\|_E)$ και $(F, \|\cdot\|_F)$ χώροι με νόρμα.

Παρατήρηση. Καμμιά γραμμική συνάρτηση (εκτός απ' την 0) δεν είναι φραγμένη με τη συνήθη έννοια **σε όλον το χώρο**.

Ορισμός 15. Μία γραμμική απεικόνιση $T : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ λέγεται **φραγμένη** ή **φραγμένος τελεστής (bounded operator)** αν (είναι φραγμένος στην $\text{ball}(E)$, δηλ.)

$$\|T\| := \sup\{\|Tx\|_F : x \in E, \|x\|_E \leq 1\} < +\infty.$$

$\mathcal{B}(E, F)$: ο χώρος των φραγμένων τελεστών.

... ισοδύναμα, αν υπάρχει M ώστε για κάθε $x \in E$ να ισχύει $\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E$.

$$\|Tx - Tx'\|_F \stackrel{\text{τρ.}}{=} \|T(x - x')\|_F \stackrel{\text{φρ.}}{\leq} \|T\| \|x - x'\|_E$$

Αν T γραμμική,

φραγμένη \iff συνεχής \iff ομοιόμορφα συνεχής.

Το Φάσμα τελεστη

Ορισμός 16. Το **φάσμα** ενός φραγμένου τελεστή $A : E \rightarrow E$ σ' έναν χώρο Banach E είναι το σύνολο

$$\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{o } A - \lambda I \text{ δεν έχει (φραγμ.) αντίστροφο}\}.$$

Το **σημειακό φάσμα** $\sigma_p(A)$ ή $\Pi_0(A)$ είναι το σύνολο των ιδιοτιμών:

$$\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{o } A - \lambda I \text{ δεν είναι 1-1}\}.$$

Το **προσεγγιστικά σημειακό φάσμα** $\sigma_a(A)$ ή $\Pi(A)$ είναι το σύνολο των $\lambda \in \mathbb{C}$ για τα οποία υπάρχουν $x_n \in E$ με $\|x_n\| = 1$ και $\lim_n \|(A - \lambda I)x_n\| = 0$.

Ισχύει ότι το φάσμα $\sigma(A)$ είναι συμπαγές μη κενό (!) υποσύνολο του \mathbb{C} .

Η **φασματική ακτινα** είναι το $r(A) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}$.

Έχουμε, $\sigma_p(A) \subseteq \sigma_a(A) \subseteq \sigma(A) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|A\|\}$.

Το Φάσμα τελεστή σε χώρο Hilbert

Συζυγής τελεστής Αν $A \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ (H_i : Hilbert), υπάρχει μοναδικός $A^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$ ώστε

$$\langle Ax, y \rangle_2 = \langle x, A^*y \rangle_1 \quad \forall x \in H_1, y \in H_2.$$

Εστω $A \in \mathcal{B}(H)$ (H : Hilbert).

- Αν $\|I - A\| < 1$, ο A έχει (φρ.) αντιστροφή.
- Αν $\exists A^{-1}$, τότε $\sigma(A^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(A)\}$.
- $\sigma(A^*) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma(A)\}$.
- $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$ (αρα $r(A) \leq \|A\|$).
- Αν $\dim H < \infty$ τότε $\sigma(A) = \sigma_p(A)$. Αλλιώς, μπορεί $\sigma_p(A) = \emptyset$.
- Ο αριθμός λ ΔΕΝ είναι στο $\sigma_a(A)$ αν-ν υπάρχει $m > 0$ ώστε $\|(A - \lambda I)x\| \geq m\|x\|$ για κάθε $x \in H$, αν-ν ο $A - \lambda I$ είναι 1-1 και έχει κλειστό σύνολο τιμών.

Υπενθύμιση: χώροι L^p

Αν $p \in [1, \infty)$, με το σύμβολο $\mathcal{L}^p(\mathbb{T})$ εννοούμε το σύνολο των μετρήσιμων *συναρτήσεων* $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ που ικανοποιούν

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p dm(t) < \infty \quad (\text{μέτρο Lebesgue}).$$

Γράφουμε

$$\|f\|_p := \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p \frac{dm(t)}{2\pi} \right)^{1/p}.$$

Παρατηρούμε ότι $\|f\|_p = 0$ αν και μόνον αν $f(t) = 0$ *m-σχεδόν για κάθε t*.

Με $L^p(\mathbb{T})$ συμβολίζουμε τον χώρο των κλάσεων ισοδυναμίας $[f]$, των $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{T})$, modulo ισότητα σχεδόν παντού.

Ο $L^p(\mathbb{T})$ είναι γραμμικός χώρος και η $\|\cdot\|_p$ είναι νόρμα στον $L^p(\mathbb{T})$ ως προς την οποία ο $L^p(\mathbb{T})$ είναι **χώρος Banach** (Θεώρημα Riesz-Fisher).

Αν $1 \leq p \leq q < \infty$ και f μετρήσιμη, έχουμε

$$\|f\|_p \leq \|f\|_q \leq \|f\|_{\infty}, \quad \text{άρα } C(\mathbb{T}) \subseteq L^q(\mathbb{T}) \subseteq L^p(\mathbb{T}) \subseteq L^1(\mathbb{T}).$$

Αν $g \in L^1(\mathbb{T})$ γράφω $\hat{g}(k) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(e^{it}) e^{-ikt} dm(t)$ ($k \in \mathbb{Z}$). Ο **μετασχηματισμός Fourier** $L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z}) : g \mapsto (\hat{g}(k))_{k \in \mathbb{Z}}$ είναι γραμμική, 1-1 και συνεχής (όχι επί).

Ο περιορισμός του, \mathcal{F} , στον $L^2(\mathbb{T})$ ικανοποιεί $\|g\|_{L^2} = \|\hat{g}\|_{\ell^2}$ και απεικονίζει την $\{f_n : n \in \mathbb{Z}\}$ στην $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$, άρα απεικονίζει τον $L^2(\mathbb{T})$ ισομετρικά και επί του $\ell^2(\mathbb{Z})$.

Υπενθύμιση: Ο $L^\infty(X, \mathcal{S}, \mu)$

Αν (X, \mathcal{S}, μ) είναι χώρος μέτρου, μία $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ ανήκει στον $L^\infty(X, \mathcal{S}, \mu)$ αν (α) είναι \mathcal{S} -μετρήσιμη και

(β) είναι **ουσιωδώς φραγμένη (essentially bounded)**, δηλ. υπάρχει $M < +\infty$ ώστε $|f(x)| \leq M$ σχεδόν παντού, δηλ. $\mu(\{x \in X : |f(x)| > M\}) = 0$.

Ο μικρότερος τέτοιος M (υπάρχει και) λέγεται το **ουσιώδες φράγμα (essential supremum)** της $|f|$.

Δηλ. ορίζουμε $\|f\|_\infty := \text{esssup}|f| := \min\{M : \mu(\{x \in X : |f(x)| > M\}) = 0\}$.

Αν $f \in \mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{S}, \mu)$, τότε $\|f\|_\infty = 0$ ανν $f(x) = 0$ μ -σχεδόν για κάθε $x \in X$.

Ο $L^\infty(X, \mathcal{S}, \mu)$ είναι ο χώρος των κλάσεων ισοδυναμίας, modulo ισότητα μ -σχεδόν παντού, συναρτήσεων του $\mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{S}, \mu)$.

Η $\|\cdot\|_\infty$ είναι νόρμα στον $L^\infty(X, \mathcal{S}, \mu)$, που γίνεται άλγεβρα Banach με τις πράξεις κατά σημείο.

Πολλαπλασιαστικοί τελεστές στον L^2

Εστω $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$. Για κάθε $f \in L^2(\mathbb{T})$, η συναρτηση ϕf είναι μετρησιμη και $\|\phi f\|_2 \leq \|\phi\|_\infty \|f\|_2$. Συνεπώς:

Πρόταση 17. Καθε $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$ ορίζει φραγμενο τελεστη

$$M_\phi : L^2(\mathbb{T}) \rightarrow L^2(\mathbb{T}) : f \mapsto \phi f.$$

Μάλιστα $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty = \text{esssup}|\phi|$.

3 Οι Τελεστές Μετατόπισης (Shift Operators)

- Στον $\ell^2(\mathbb{Z}) = \{x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K} : \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(k)|^2 < \infty\}$:

$$x = (\dots, x(-1), x(0), x(1), x(2), \dots)$$

Ορίζω W και V :

$$Wx = (\dots, x(-2), x(-1), x(0), x(1), \dots)$$

$$Vx = (\dots, x(0), x(1), x(2), x(3), \dots)$$

δηλαδή $(Wx)(n) = x(n-1)$ και $(Vx)(n) = x(n+1)$ για κάθε $n \in \mathbb{Z}$.

Προφανώς $W, V : \ell^2(\mathbb{Z}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$, γραμμικοί, ισομετρίες και επί, διότι $WV = VW = I$, δηλ. $W^{-1} = V$.

Ο συζυγής του W είναι ο V . Άρα $WW^* = W^*W = I$.

- Τελεστές μετατόπισης (α) Στον $\ell^2(\mathbb{Z})$ (αλλιώς):

$$We_n := e_{n+1} \quad (\text{μετατόπιση δεξιά})$$

$$\text{και } Ve_n := e_{n-1} \quad (\text{μετατόπιση αριστερά}) \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Επεκτείνω γραμμικά στον $c_{00}(\mathbb{Z})$, παρατηρώ ότι είναι $\|\cdot\|_2$ -ισομετρίες, άρα επεκτείνονται σε ισομετρίες $\ell^2(\mathbb{Z}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$. Δείχνουμε ότι $\langle Ve_n, e_m \rangle = \langle e_n, We_m \rangle$ για κάθε $n, m \in \mathbb{Z}$, άρα $V = W^*$ (γιατί;).

- (β) Στον $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$:

$$S e_n := e_{n+1} \quad (\text{μετατόπιση δεξιά}) \quad (n \in \mathbb{Z}_+)$$

$$\text{και } S' e_n := \begin{cases} e_{n-1} & \text{όταν } n \geq 1 \\ 0 & \text{όταν } n = 0 \end{cases} \quad (\text{μετατόπιση αριστερά})$$

Επεκτείνω γραμμικά στον $c_{00}(\mathbb{Z}_+)$, παρατηρώ ότι είναι $\|\cdot\|_2$ -συστολές (δηλ. $\|Sx\|_2 \leq \|x\|_2$ για κάθε $x \in c_{00}(\mathbb{Z}_+)$), άρα επεκτείνονται σε συστολές $\ell^2(\mathbb{Z}_+) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}_+)$. Δείχνω $S' = S^*$.

(Μάλιστα ο S είναι ισομετρία. Ο S^* .)

Συμπέρασμα

$$\begin{aligned} \text{Στον } \ell^2(\mathbb{Z}) : W e_n &= e_{n+1} && (\text{μετατόπιση δεξιά}) \\ W^* e_n &= e_{n-1} && (\text{μετατόπιση αριστερά}) \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ \text{Στον } \ell^2(\mathbb{Z}_+) : S e_n &= e_{n+1} && (\text{μετατόπιση δεξιά}) \quad (n \in \mathbb{Z}_+) \\ S^* e_n &= \begin{cases} e_{n-1} & \text{όταν } n \geq 1 \\ 0 & \text{όταν } n = 0 \end{cases} && (\text{μετατόπιση αριστερά}) \end{aligned}$$

- Ο W είναι ισομετρία και επι.
Ισχύει $W(\ell^2(\mathbb{Z}_+)) \subseteq \ell^2(\mathbb{Z}_+)$ αλλά $W^*(\ell^2(\mathbb{Z}_+)) \not\subseteq \ell^2(\mathbb{Z}_+)$
- Ο S είναι ισομετρία, όχι επι. Ο S είναι επι, όχι 1-1.

Το φάσμα των τελεστών μετατόπισης

$$S : \ell^2(\mathbb{Z}_+) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}_+):$$

$$\text{Αφού } \|S^*\| = 1, \text{ έχω } \sigma(S^*) \subseteq \overline{\mathbb{D}}.$$

Δείχνω ότι

- $\sigma_p(S^*) = \mathbb{D}$: για κάθε $\lambda \in \mathbb{D}$, αν $x_\lambda := (1, \lambda, \lambda^2, \dots)$, έχω $x_\lambda \in \ell^2(\mathbb{Z}_+)$ και $S^* x_\lambda = \lambda x_\lambda$.
Επεται ότι
- $\sigma(S^*) = \overline{\mathbb{D}} = \sigma(S)$.

Ομως

$$\bullet \sigma_p(S) = \emptyset.$$

$$W : \ell^2(\mathbb{Z}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}):$$

Πάλι $\sigma(W^*) \subseteq \overline{\mathbb{D}}$. Ομως $\sigma(W^*) = \sigma(W^{-1}) = \{\frac{1}{\lambda} : \lambda \in \sigma(W)\}$. Συνεπώς αν $\lambda \in \sigma(W^*)$ πρέπει $|\lambda| \leq 1$ και $\frac{1}{|\lambda|} \leq 1$ αφού $\sigma(W) \subseteq \overline{\mathbb{D}}$. Άρα $|\lambda| = 1$. Δηλαδή $\sigma(W^*) \subseteq \mathbb{T}$.

$$\text{Άσκηση: } \sigma(W) = \sigma(W^*) = \mathbb{T}.$$

$$\text{Άσκηση: } \sigma_p(W) = \emptyset.$$

Σχετικά με το φάσμα (δείτε και το [specS.pdf](#).)

Πρόταση 18. Ένας φραγμένος τελεστής $T : E \rightarrow F$ μεταξύ χωρών Banach είναι αντιστρέψιμος αν-ν έχει πυκνή εικόνα και υπάρχει $m > 0$ ώστε $\|Tx\| \geq m\|x\|$ για κάθε $x \in E$ (λέμε «ο T είναι κάτω φραγμένος στη μοναδιαία σφαίρα του E »).

Ορισμός 19. Έστω $A \in \mathcal{B}(E)$ (E : Banach). Το **σημειακό φάσμα**:

$$\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \ker(A - \lambda I) \neq \{0\}\}.$$

Το **προσεγγιστικά σημειακό φάσμα** $\sigma_a(A)$ είναι το σύνολο των λ ώστε ο $A - \lambda I$ να μην είναι κάτω φραγμένος στη μοναδιαία σφαίρα του E :

$$\sigma_a(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : \|(A - \lambda I)x_\varepsilon\| < \varepsilon\|x_\varepsilon\|\}.$$

Το **φάσμα συμπίεσης (compression spectrum)** είναι το σύνολο

$$\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \overline{(A - \lambda I)(E)} \neq E\}.$$

Πρόταση 20. Η ένωση $\sigma_a(A) \cup \sigma_c(A)$ ισούται με $\sigma(A)$.

Λήμμα 21. Έστω \mathcal{H} χώρος Hilbert και $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Τότε

$$\ker T = (T^*(\mathcal{H}))^\perp \quad \text{και} \quad \overline{T(\mathcal{H})} = (\ker T^*)^\perp.$$

Λήμμα 22. Έστω \mathcal{H} χώρος Hilbert και $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Τότε

- (i) $\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma(T)\}$
- (ii) $\sigma_p(T) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma_c(T^*)\}$ και $\sigma_c(T) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma_p(T^*)\}$.

Παράδειγμα 23. Αν $S \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{Z}_+))$ είναι ο τελεστής της μετατόπισης $Se_n = e_{n+1}$, τότε

$$\sigma_p(S) = \emptyset, \quad \sigma_a(S) = \mathbb{T}, \quad \sigma_c(S) = \mathbb{D} \quad \text{και} \quad \sigma(S) = \overline{\mathbb{D}}.$$

[Αποδείξεις στο specS.pdf.](#)

Αναλλοίωτοι υπόχωροι

Ένας γραμμικός υπόχωρος $E \subseteq H$ είναι **αναλλοίωτος (invariant)** από έναν φραγμένο τελεστή $A \in \mathcal{B}(H)$ αν $A(E) \subseteq E$, δηλ. αν $Ax \in E$ για κάθε $x \in E$. Τότε ο κλειστός υπόχωρος \overline{E} είναι και αυτός A -αναλλοίωτος. Όταν και ο E και ο E^\perp είναι A -αναλλοίωτοι, θα λέμε ότι ο υπόχωρος E **ανάγει (reduces)** τον A .

Λήμμα 24. Ένας κλειστός υπόχωρος E είναι A -αναλλοίωτος αν και μόνον αν $AP = PAP$ (όπου $P = P_E$, η **ορθή προβολή στον E**). Ο E ανάγει τον A αν και μόνον αν $A(E) \subseteq E$ και $A^*(E) \subseteq E$, ισοδύναμα αν και μόνον αν $AP = PA$.

Ενημερωτικά, το ακολουθο είναι ανοικτο:

Το πρόβλημα του αναλλοίωτου υπόχωρου:

Είναι αλήθεια ότι κάθε φραγμένος τελεστής A σε έναν (διαχωρίσιμο, απειροδιάστατο, μιγαδικό) χώρο Hilbert H (ισοδύναμα, στον ℓ^2) έχει μη τετριμμένο κλειστό αναλλοίωτο υπόχωρο;

Αναλλοίωτοι υπόχωροι του shift S

Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, θεωρούμε

$$\begin{aligned} E_n &:= \{x \in \ell^2(\mathbb{Z}_+) : x = (0, \dots, 0, x(n), \dots)\} = \overline{\text{span}}\{e_k : k \geq n\} \\ &= \{e_k : 0 \leq k < n\}^\perp = \{e_0, S(e_0), \dots, S^{n-1}(e_0)\}^\perp. \end{aligned}$$

Ο E_n είναι (γνησίως) S -αναλλοιωτός υποχώρος.
Επίσης για κάθε $\lambda \in \mathbb{D}$ ο υποχώρος

$$E(\lambda) := \{x_\lambda\}^\perp$$

είναι S -αναλλοιωτός. **Άσκηση:** Το ίδιο και ο

$$E_n(\lambda) := \text{span}\{x_\lambda, S(x_\lambda), \dots, S^{n-1}(x_\lambda)\}^\perp.$$

The (unilateral) shift S on ℓ^2 and T_1 on H^2

$$\begin{aligned} S : \ell^2 \rightarrow \ell^2 : S(a_0, a_1 \dots) &:= (0, a_0, a_1 \dots), \quad (a_0, a_1 \dots) \in \ell^2(\mathbb{Z}_+) \\ T_1 : H^2 \rightarrow H^2 : (T_1 f)(z) &:= zf(z), \quad f \in H^2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \ell^2(\mathbb{Z}_+) & \xrightarrow{S} & \ell^2(\mathbb{Z}_+) \\ \downarrow V & & \downarrow V \\ H^2 & \xrightarrow{T_1} & H^2 \end{array}$$

$$: T_1 = VSV^{-1}$$

$$\text{οπου } V : \ell^2(\mathbb{Z}_+) \rightarrow H^2 : e_n \mapsto \zeta_n \text{ (εδώ } \zeta_n(z) = z^n, z \in \mathbb{D}).$$

T_1 -Αναλλοίωτοι υποχώροι

Αν $E_m = \overline{\text{span}}\{e_n : n \geq m\}$. ο $V(E_m)$ είναι T_1 -αναλλοιωτός και

$$V(E_m) = \{f \in H^2 : f^{(k)}(0) = 0, 0 \leq k < m\} = \{\zeta_m f : f \in H^2\}.$$

Επίσης αν $\lambda \in \mathbb{D}$ και $E(\bar{\lambda}) = \{x_{\bar{\lambda}}\}^\perp$, ο υποχώρος

$$V(E(\bar{\lambda})) = \{k_\lambda\}^\perp = \{f \in H^2 : f(\lambda) = 0\}$$

είναι T_1 -αναλλοιωτός.

Άσκησης Για κάθε $\lambda \in \mathbb{D}$, τα διανύσματα $\{x_\lambda, S(x_\lambda), S^2(x_\lambda), \dots\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα, και η κλειστή γραμμική τους θήκη ισούται με $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$.

The (bilateral) shift W on $\ell^2(\mathbb{Z})$ and M_1 on $L^2(\mathbb{T})$

$$\begin{aligned} \mathcal{F} : L^2(\mathbb{T}) &\rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}) : f \mapsto (\hat{f}(k))_{k \in \mathbb{Z}} \\ f_n &\mapsto e_n \quad (n \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \ell^2(\mathbb{Z}) & \xrightarrow{W} & \ell^2(\mathbb{Z}) \\ \uparrow \mathcal{F} & & \uparrow \mathcal{F} \\ L^2(\mathbb{T}) & \xrightarrow{M_1} & L^2(\mathbb{T}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \ell^2(\mathbb{Z}_+) & \xrightarrow{S} & \ell^2(\mathbb{Z}_+) \\ \uparrow \mathcal{F}| & & \uparrow \mathcal{F}| \\ \tilde{H}^2 & \xrightarrow{T_1} & \tilde{H}^2 \end{array}$$

$$(M_1 f)(e^{it}) = e^{it} f(e^{it}), \quad T_1 = M_1|_{\tilde{H}^2}$$

Αναγοντες (reducing) υποχωροι των shifts

Πρόταση 25. Οι μονοι κλειστοι υποχωροι του $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$ που αναγουν τον S ειναι ο $\{0\}$ και ο $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$.

Πρόταση 26. Ένας κλειστος υποχωρος E του $\ell^2(\mathbb{Z})$ αναγει τον W αν-ν υπαρχει μετρησιμο $\Omega \subseteq \mathbb{T}$ ωστε

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(E) &= \{f \in L^2(\mathbb{T}) : f(e^{it}) = 0 \text{ σχεδον για καθε } e^{it} \notin \Omega\} \\ &= \{\chi_\Omega g : g \in L^2(\mathbb{T})\}. \end{aligned}$$

Αλλιως: Ένας κλειστος υποχωρος του $L^2(\mathbb{T})$ αναγει τον M_1 αν-ν ειναι της μορφης

$$E_\Omega := \{\chi_\Omega g : g \in L^2(\mathbb{T})\}$$

οπου $\Omega \subseteq \mathbb{T}$ μετρησιμο.

Η αποδειξη της Προτασης για τον W θα χρειασθει προετοιμασια:

Ο μεταθετης (commutant) του W

Να βρούμε όλους τους τελεστες στον $\ell^2(\mathbb{Z})$ που μετατιθενται με τον W . Ισοδυναμια, να βρούμε όλους τους τελεστες στον $L^2(\mathbb{T})$ που μετατιθενται με τον $M_1 = \mathcal{F}^{-1}W\mathcal{F}$.

Καθε πολλαπλασιαστικος τελεστης M_ϕ με $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$ μετατιθεται με τον (πολλαπλασιαστικο τελεστη) M_1 . Δεν υπαρχουν αλλοι:

Θεώρημα 27. Το συνολο των τελεστων στον $L^2(\mathbb{T})$ που μετατιθενται με τον M_1 ειναι το

$$\{M_\phi : \phi \in L^\infty(\mathbb{T})\}.$$

Οι Αναλλοιωτοι υποχωροι του M_1

Πρόταση 28. Ενας κλειστος υποχωρος του $L^2(\mathbb{T})$ αναγει τον M_1 αν-ν ειναι της μορφης

$$E_\Omega := \{\chi_\Omega g : g \in L^2(\mathbb{T})\} = \chi_\Omega L^2(\mathbb{T})$$

οπου $\Omega \subseteq \mathbb{T}$ μετρησιμο.

Θεώρημα 29. Ενας κλειστος υποχωρος E του $L^2(\mathbb{T})$ ειναι M_1 -αναλλοιωτος αλλα δεν αναγει τον M_1 αν-ν ειναι της μορφης

$$E = \{\phi g : g \in \tilde{H}^2\} = \phi \tilde{H}^2$$

οπου $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$ με $|\phi(e^{it})| = 1$ σχεδον για καθε $e^{it} \in \mathbb{T}$ ωστε

Καθοριζεται μοναδικα η ϕ απο τον E ;

Οι Αναλλοιωτοι υποχωροι του M_1 και του S

Πρόταση 30 («Μοναδικότητα»). Αν $\phi, \psi \in L^\infty(\mathbb{T})$ με $|\phi(e^{it})| = 1 = |\psi(e^{it})|$ σχεδον για καθε $e^{it} \in \mathbb{T}$, τοτε

$$\phi \tilde{H}^2 = \psi \tilde{H}^2 \iff \exists c \in \mathbb{T} : \phi = c\psi.$$

Ορισμός 31. Μια $\phi \in H^\infty$ λεγεται εσωτερικη (inner function) αν $|\tilde{\phi}(e^{it})| = 1$ σχεδον για καθε $e^{it} \in \mathbb{T}$.

Πρόταση 32. Εστω $\phi \in H^2$. Αν $|\tilde{\phi}(e^{it})| = 1$ σχεδον για καθε $e^{it} \in \mathbb{T}$, τοτε η ϕ ειναι εσωτερικη.

Θεώρημα 33 (A. Beurling). Καθε μη μηδενικος T_1 -αναλλοιωτος κλειστος υποχωρος E του H^2 ειναι της μορφης $E = \phi H^2$ οπου ϕ εσωτερικη.

4 Παραγοντοποίηση συναρτησεων

Ορισμός 34. Μια $\phi \in H^\infty$ λεγεται **εσωτερικη (inner function)** αν $|\tilde{\phi}(e^{it})| = 1$ σχεδον για καθε $e^{it} \in \mathbb{T}$.

Theorem (A. Beurling). Καθε μη μηδενικος T_1 -αναλλοιωτος κλειστος υποχωρος E του H^2 ειναι της μορφης $E = \phi H^2$ οπου ϕ εσωτερικη.

Αν $\phi \tilde{H}^2 = \psi \tilde{H}^2$ με ψ εσωτερικη, τοτε υπαρχει $c \in \mathbb{T}$ ωστε $\psi = c\phi$.

Πρόταση 35. Καθε T_1 -αναλλοιωτος κλειστος υποχωρος E του H^2 ειναι T_1 -κυκλικος, δηλ. υπαρχει $\phi \in E$ ωστε

$$E = \overline{\text{span}}\{T_1^n(\phi) : n \in \mathbb{Z}_+\}.$$

(Το ϕ λεγεται **κυκλικο διάνυσμα για τον E**)

Εσωτερικές και εξωτερικές συναρτησεις

Ορισμός 36. Μια $\phi \in H^\infty$ λεγεται **εσωτερικη (inner function)** αν

$$|\tilde{\phi}(e^{it})| = 1 \quad \text{σχεδον για καθε } e^{it} \in \mathbb{T}.$$

Μια $F \in H^2$ λεγεται **εξωτερικη (outer function)** αν

$$\overline{\text{span}}\{T_1^n(F) : n \in \mathbb{Z}_+\} = H^2.$$

Πρόταση 37. Μια εξωτερικη συναρτηση δεν εχει καμια ριζα στον \mathbb{D} .

Υπενθ: Οι ριζες μιας $\neq 0$ ολομορφης συναρτησης στον \mathbb{D} αποτελουν «μικρο» συνολο: δεν εχουν σημεια συσσωρευσης στο \mathbb{D} .

Θεώρημα 38 (F. και M. Riesz). Αν $f \in H^2$ μη μηδενικη, το συνολο $\{e^{i\theta} : \tilde{f}(e^{i\theta}) = 0\}$ εχει μετρο (Lebesgue) μηδεν.

Θεώρημα 39 (Inner-Outer factorization). Αν $f \in H^2$ μη μηδενικη, υπαρχει εσωτερικη φ και εξωτερικη F ωστε $f = \varphi F$.

Αν επισης $f = \varphi' F'$ με φ' εσωτερικη και F' εξωτερικη τοτε $\varphi' = c\varphi$ οπου $c \in \mathbb{T}$ (και αρα $F = cF'$).

• Επομενωσ οι ριζες μιας μη μηδενικης $f \in H^2$ ειναι ακριβωσ οι ριζες του εσωτερικου της παραγοντα.

Εσωτερικές συναρτησεις: Γινομενα Blaschke

Υπενθ. Για καθε $z_0 \in \mathbb{D}$, ο υποχωρος

$$E_{z_0} := \{f \in H^2 : f(z_0) = 0\} = \{k_{z_0}\}^\perp$$

του H^2 ειναι T_1 -αναλλοιωστος .

Πρόταση 40. Για κάθε $z_0 \in \mathbb{D}$ η συναρτηση

$$\psi(z) = \frac{z_0 - z}{1 - \bar{z}_0 z}$$

είναι εσωτερικη και $E_{z_0} = \psi H^2$.

Πρόταση 41. Αν $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{D}$ η συναρτηση

$$\psi(z) = \prod_{i=1}^n \frac{z_i - z}{1 - \bar{z}_i z}$$

είναι εσωτερικη και $\psi H^2 = \{f \in H^2 : f(z_1) = f(z_2) = \dots = f(z_n) = 0\}$.

Πόρισμα 42. Εστω ϕ εσωτερικη συναρτηση που εχει ριζες στα $\{0, z_1, \dots, z_n\} \subseteq \mathbb{D}$ οπου το 0 είναι ριζα με πολλαπλοτητα $s \geq 0$. Αν

$$\psi(z) := z^s \prod_{i=1}^n \frac{z_i - z}{1 - \bar{z}_i z}$$

τοτε

$$\phi(z) = \psi(z)S(z), \quad z \in \mathbb{D}$$

οπου η S είναι εσωτερικη συναρτηση (οπως και η ψ).

Πόρισμα 43. Αν $\phi \in H^\infty$ είναι εσωτερικη συναρτηση, μη σταθερη, τοτε $|\phi(z)| < 1$ για καθε $z \in \mathbb{D}$.

Αποδειξη (απο την ταξη - ευχαριστω!) Απο τον τυπο του Poisson (14) εχουμε $|\phi(z)| \leq 1$ για καθε $z \in \mathbb{D}$ (γιατι $\|P_r\|_1 = 1$). Αν υπηρχε z στον \mathbb{D} οστε $|\phi(z)| = 1$ τοτε η ϕ θα ηταν σταθερη απο την αρχη του μεγιστου. \square

Ριζες Εσωτερικων συναρτησεων

Πρόταση 44. Εστω ϕ εσωτερικη συναρτηση με $\phi(0) \neq 0$. Υποθετουμε οτι η ϕ μηδενιζεται στα σημεια $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$. Τοτε

$$|\phi(0)| \leq \prod_{i=1}^n |z_i| \quad \text{για καθε } n \in \mathbb{N}.$$

Πότε μια απειρη ακολουθια (z_n) σημειων του δισκου μπορει να αποτελειται απο ριζες μιας $f \in H^2$; Αναγκαια συνθηκη (αρχη μεγιστου) είναι η $\lim_n |z_n| = 1$. Αρκει;

Παράδειγμα 45. Δεν υπαρχει $f \in H^2$ με συνολο ριζων $Z(f) = \{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$.

Ορισμός 46 (Συγκλιση απειρογοινομενων).

• Εστω $\{w_k\} \subseteq \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Αν τα μερικα γινόμενα $p_n := \prod_{i=1}^n w_i$ συγκλινουν σε ενα $p \neq 0$

λεμε οτι το $\prod_{i=1}^{\infty} w_i$ **συγκλινει (στο p)**.

• Εστω $\{w_k\} \subseteq \mathbb{C}$. Αν καποια w_k μηδενιζονται, και υπαρχει N οστε $w_n \neq 0$ για καθε $n \geq N$ και το $\prod_{i=N}^{\infty} w_i$ συγκλινει (σε καποιο $p \neq 0$), τοτε λεμε οτι το $\prod_{i=1}^{\infty} w_i$ **συγκλινει στο 0**.

Πρόταση 47. Εστω $f \in H^2$ μη μηδενική συναρτησή. Αν $z_n \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ και η f μηδενίζεται (τουλάχιστον) στα σημεία $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$, τότε το $\prod_{i=1}^{\infty} |z_i|$ συγκλίνει (σε ένα $p \neq 0$).

Παρατήρηση 48. Αν $r_k \in (0, 1)$ για κάθε $k \in \mathbb{N}$, το απειρογινόμενο $\prod_{i=1}^{\infty} r_i$ συγκλίνει αν-ν η σειρά $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - r_i)$ συγκλίνει.

Πόρισμα 49. Εστω $f \in H^2$ μη μηδενική συναρτησή. Αν $z_n \in \mathbb{D}$ και η f μηδενίζεται (τουλάχιστον) στα σημεία $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$, τότε $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - |z_i|) < \infty$.

Θα δούμε ότι αντιστρόφα, αν $\{z_n\} \subseteq \mathbb{D}$ με $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - |z_i|) < \infty$ τότε υπάρχει $f \in H^2$ (μαλιστα, εσωτερική) που έχει ακριβώς αυτές τις ρίζες.

Ορισμός 50. Εστω $\{z_k\} \subseteq \mathbb{D} \setminus \{0\}$ με $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - |z_i|) < \infty$ και $s \in \mathbb{Z}_+$. Το γινόμενο Blaschke με ρίζες στα $\{z_k\}$ και ρίζα πολλαπλότητας s στο $z = 0$ είναι η συναρτησή

$$B(z) := z^s \prod_{i=1}^{\infty} \frac{\bar{z}_i}{|z_i|} \frac{z_i - z}{1 - \bar{z}_i z}.$$

Θεώρημα 51. • Το απειρογινόμενο που ορίζει την $B(z)$ συγκλίνει για κάθε $z \in \mathbb{D}$.

- Η B είναι εσωτερική συναρτησή.
- Οι ρίζες της B είναι ακριβώς τα σημεία $\{z_k\}$ (με τις πολλαπλότητες που εμφανίζονται)² καθώς και το 0 με πολλαπλότητα s .

Επομένως, η συνθήκη $z_n \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ με $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - |z_i|) < \infty$ είναι ικανή και αναγκαία για την υπάρξη $f \in H^2$ (μαλιστα, εσωτερικής) με ακριβώς αυτές τις ρίζες.

Παράδειγμα 52. Υπάρχει $f \in H^2$ (μαλιστα, εσωτερική) που δεν επεκτείνεται σε κανένα σημείο της περιφέρειας \mathbb{T} σε ολομορφη συναρτησή.

Παρατήρηση [Δ.Ε.] Μαλιστα, δεν επεκτείνεται καν σε συνεχή συναρτησή.

Singular inner functions (δείτε και το [singinner.pdf](#))

Ορισμός 53. Μια εσωτερική συναρτησή $\varphi \in H^\infty$ λεγεται **ιδιόζουσα εσωτερική συναρτησή (singular inner function)** αν δεν είναι σταθερή και δεν έχει ρίζες στον \mathbb{D} .

Παράδειγμα 54. $\varphi(z) = \exp\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$, $z \in \mathbb{D}$.

² Δηλαδή, αν $Z(B)$ το σύνολο των ριζών της B και s_w η πολλαπλότητα της ρίζας w ,

$$B(z) := z^s \prod_{w \in Z(B) \setminus \{0\}} \left(\frac{\bar{w}}{|w|} \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right)^{s_w}.$$

Παράδειγμα 55. $\varphi(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^n \frac{z+e^{i\theta_k}}{z-e^{i\theta_k}} a_k\right)$, $z \in \mathbb{D}$ όπου $a_k > 0$ και $\theta_k \in [0, 2\pi]$.

Θεώρημα 56. Μια $S : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ είναι ιδιάζουσα εσωτερική συναρτησιμότητα αν-ν είναι της μορφής

$$S(z) = c \exp\left(-\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\mu(e^{it})\right), \quad z \in \mathbb{D}$$

όπου $c \in \mathbb{T}$ και μ είναι κανονικό θετικό μη μηδενικό μέτρο Borel στον \mathbb{T} που είναι κάθετο ή ιδιάζον ως προς το μέτρο Lebesgue.

(Ένα θετικό μέτρο Borel στον \mathbb{T} λέγεται κάθετο ή ιδιάζον ως προς το μέτρο Lebesgue m αν είναι συγκεντρωμένο σε ένα m -μηδενικό σύνολο $A \subseteq \mathbb{T}$, αν δηλαδή $\mu(A^c) = 0$ και $m(A) = 0$.)

Θα χρειασθεί το ακόλουθο Θεώρημα αναπαράστασης:

Θεώρημα 57 (Herglotz). Έστω $h : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ολομορφή ώστε $\operatorname{Re} h(z) > 0$ για κάθε $z \in \mathbb{D}$. Τότε υπάρχει κανονικό θετικό μέτρο Borel μ στον \mathbb{T} ώστε

$$h(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\mu(e^{it}) + i \operatorname{Im}(h(0)), \quad z \in \mathbb{D}.$$

Λήμμα 58. Έστω μ κανονικό θετικό μέτρο Borel στον \mathbb{T} . Ορίζουμε

$$F(z) := \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\mu(e^{it}) \quad z \in \mathbb{D}.$$

Τότε η F είναι ολομορφή στο \mathbb{D} .

Αποδειξίς στο [singinner.pdf](#)

Παραγοντοποίηση εσωτερικών συναρτησεών

Πρόταση 59. Κάθε εσωτερική συναρτησιμότητα $\phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ παραγοντοποιείται ως $\phi = BS$, όπου B είναι το γινόμενο Blaschke

$$B(z) = z^s \prod_{w \in Z(\phi) \setminus \{0\}} \left(\frac{\bar{w}}{|w|} \frac{w-z}{1-\bar{w}z} \right)^{s_w}, \quad z \in \mathbb{D}$$

που ορίζεται από το σύνολο $Z(\phi)$ των ριζών της ϕ (με την πολλαπλότητα s_w της κάθε μιας) και S είναι ιδιάζουσα εσωτερική συναρτησιμότητα της μορφής

$$S(z) = c \exp\left(-\int_{\mathbb{T}} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\mu(e^{it})\right), \quad z \in \mathbb{D}$$

όπου $c \in \mathbb{T}$ και μ είναι κανονικό θετικό μέτρο Borel στον \mathbb{T} που είναι κάθετο (ή ιδιάζον) ως προς το μέτρο Lebesgue.

Συνεπειες για τους αναλλοιωτους υποχωρους του shift

Υπενθυμιση (Θ. Beurling): $\text{Lat}(S) = \{\phi H^2 : \phi \text{ εσωτερικη}\}$.

Παράδειγμα 60. Για $a \in [0, 1]$ θετουμε $\phi_a(z) := \exp\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$. Εχουμε

$$0 \leq a \leq b \leq 1 \Rightarrow \phi_0 H^2 \subseteq \phi_a H^2 \subseteq \phi_b H^2 \subseteq \phi_1 H^2 = H^2.$$

Δηλαδη η απεικονιση $[0, 1] \rightarrow \text{Lat}(S) : a \mapsto \phi_a$ (ειναι 1-1 και) διατηρει τη διαταξη.

Θα δοουμε σε λιγο οτι η συνεπαγωγη \Rightarrow ειναι στην πραγματικοτητα ισοδυναμια \Leftrightarrow .

Δηλαδη ο συνδεσμος $\text{Lat}(S)$ εχει υποσυνδεσμους ισομορφους ως προς τη διαταξη με το $[0, 1]$ (με τη φυσιολογικη του διαταξη).

Πρόταση 61. Θεωρουμε δυο εσωτερικες συναρτησεις ϕ_1 και ϕ_2 . Τότε εχουμε $\phi_1 H^2 \subseteq \phi_2 H^2$ αν-ν η ϕ_1/ϕ_2 ειναι εσωτερικη συναρτηση. Αυτο συμβαινει αν-ν

- καθε ριζα z της ϕ_2 ειναι ριζα της ϕ_1 με την ιδια ή μεγαλυτερη πολλαπλοτητα ($\text{mult}_1(z) \geq \text{mult}_2(z)$) και

- εχουμε $\mu_2(E) \leq \mu_1(E)$ για καθε Borel $E \subseteq \mathbb{T}$, οπου μ_i ειναι το ιδιαζον μετρο που αντιστοιχει στην ϕ_i .

Λήμμα 62. Αν μ και ν ειναι θετικα πεπερασμενα μετρα Borel στο $[0, 2\pi]$ και

$$\exp\left(-\int_0^{2\pi} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\mu(t)\right) = \exp\left(-\int_0^{2\pi} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\nu(t)\right)$$

για καθε $z \in \mathbb{D}$, τότε $\mu = \nu$.

Πρόταση 63. Εστω ϕ εσωτερικη συναρτηση. Ο υποχωρος ϕH^2 του H^2 εχει πεπερασμενη συνδιασταση (δηλαδη $\dim(\phi H^2)^\perp = m < \infty$) αν-ν η ϕ ειναι γινομενο Blaschke με πεπερασμενο πληθος ($= m$) παραγοντων (επι μια σταθερα).

Ορισμός 64. Αν ϕ_1, ϕ_2 ειναι εσωτερικες συναρτησεις, λεμε οτι η ϕ_2 διαιρει την ϕ_1 αν υπαρχει ϕ_3 εσωτερικη ωστε $\phi_1 = \phi_2 \phi_3$.

Εστω $\{\phi_i, i \in I\}$ οικογενεια εσωτερικων συναρτησεων. Λεμε οτι η εσωτερικη συναρτηση ϕ_M ειναι ο μεγαistos κοινος διαιρετης της $\{\phi_i, i \in I\}$ αν (α) η ϕ_M διαιρει καθε ϕ_i , $i \in I$ και (β) καθε αλλη εσωτερικη συναρτηση ϕ που διαιρει την $\{\phi_i, i \in I\}$, διαιρει και την ϕ_M .

Λεμε οτι η εσωτερικη συναρτηση ϕ_E ειναι το ελαχιστο κοινο πολλαπλασιο της $\{\phi_i, i \in I\}$ αν (α) καθε $\phi_i, i \in I$ διαιρει την ϕ_E και (β) αν μια εσωτερικη συναρτηση ϕ διαιρειται απο ολες τις ϕ_i τότε διαιρειται και απο την ϕ_E .

Πρόταση 65. Καθε οικογενεια $\{\phi_i, i \in I\}$ εσωτερικων συναρτησεων εχει μεγαστο κοινο διαιρετη.

Καθε πεπερασμενη οικογενεια $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ εσωτερικων συναρτησεων εχει ελαχιστο κοινο πολλαπλασιο.

Παράδειγμα 66. Οικογενεια εσωτερικων συναρτησεων που δεν εχει ελαχιστο κοινο πολλαπλασιο;

Πρόταση 67. Αν E ειναι μη μηδενικος κλειστος S -αναλλοιωτος υποχωρος του H^2 , τότε $E = \phi H^2$ οπου η ϕ ειναι ο μεγαistos κοινος διαιρετης των εσωτερικων μερων ολων των $f \in E$.

5 Τελεστές Toeplitz

Υπενθυμισή Αν $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ ορθοκανονική βάση χώρου Hilbert H , σε κάθε $A \in \mathcal{B}(H)$ αντιστοιχεί πίνακας $[a_{nm}]$ όπου $[a_{nm}] = \langle Ae_m, e_n \rangle$.

Αν $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$, ο πίνακας του τελεστή M_ϕ ως προς τη συνηθισμένη ο/κ βάση $\{f_n : n \in \mathbb{Z}\}$ του $L^2(\mathbb{T})$ είναι

$$\begin{bmatrix} \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \hat{\phi}(-3) & \hat{\phi}(-4) & \dots \\ \dots & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \hat{\phi}(-3) & \dots \\ \dots & \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \dots \\ \dots & \hat{\phi}(3) & \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \dots \\ \dots & \hat{\phi}(4) & \hat{\phi}(3) & \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} = [\hat{\phi}(n-m)].$$

Πρόταση 68. Αν $A \in \mathcal{B}(L^2(\mathbb{T}))$ έχει $[a_{nm}] = [u(m-n)]$ στη συνηθισμένη ο/κ βάση, τότε υπάρχει $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$ ώστε $A = M_\phi$.

Πίνακες Toeplitz

Ορισμός 69. Ένας πίνακας (είτε τετραγωνικός είτε $\infty \times \infty$) λέγεται **πίνακας Toeplitz** αν έχει «σταθερές διαγωνίους», δηλ. αν $m-n = j-i \Rightarrow [a_{nm}] = [a_{ij}]$.

Ορισμός 70. Το **ουσιώδες σύνολο τιμών (essential range)** μιας $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$:

$$\text{essran}(\phi) := \{\lambda \in \mathbb{C} : m(\{e^{it} \in \mathbb{T} : |\phi(e^{it}) - \lambda| < \varepsilon\}) > 0 \forall \varepsilon > 0\}.$$

Πρόταση 71. Αν $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$,

$$\sigma(M_\phi) = \sigma_a(M_\phi) = \text{essran}(\phi).$$

Τελεστές Toeplitz

Ορισμός 72. Η **προβολή του Riesz** $P \in \mathcal{B}(L^2(\mathbb{T}))$ ορίζεται από τον τύπο

$$P \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) f_k \right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}_+} \hat{f}(n) f_n, \quad f \in L^2(\mathbb{T})$$

ισοδυναμα

$$P(f_n) = \begin{cases} f_n, & \text{αν } n \geq 0 \\ 0, & \text{αν } n < 0 \end{cases}$$

είναι δηλαδή η ορθή προβολή του $L^2(\mathbb{T})$ επί του \tilde{H}^2 .

Ορισμός 73. Αν $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$ ορίζουμε τον **τελεστή Toeplitz** T_ϕ

$$T_\phi := PM_\phi|_{\tilde{H}^2} : \tilde{H}^2 \rightarrow \tilde{H}^2 : f \mapsto M_\phi f \mapsto PM_\phi f.$$

Η $\{f_n : n \geq 0\}$ είναι ορθοκανονική βάση του \tilde{H}^2 και η $\{f_n : n < 0\}$ είναι ο/κ βάση του $(\tilde{H}^2)^\perp$. Εστω $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$. Ως προς τη διασπαση $L^2(\mathbb{T}) = (\tilde{H}^2)^\perp \oplus \tilde{H}^2$ ο πίνακας του τελεστή M_ϕ γίνεται

$$M_\phi \simeq \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} \ddots & \vdots & \vdots \\ \dots & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) \\ \dots & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{\phi}(-2) & \hat{\phi}(-3) & \hat{\phi}(-4) & \dots \\ \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \hat{\phi}(-3) & \dots \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dots & \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) \\ \dots & \hat{\phi}(3) & \hat{\phi}(2) \\ \dots & \hat{\phi}(4) & \hat{\phi}(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \dots \\ \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \dots \\ \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

Άρα

$$T_\phi = PM_\phi|_{\tilde{H}^2} \simeq \begin{bmatrix} \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \hat{\phi}(-3) & \dots \\ \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \hat{\phi}(-2) & \dots \\ \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \hat{\phi}(-1) & \dots \\ \hat{\phi}(3) & \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Ορισμός 74. Ένας τελεστής Toeplitz T_ϕ λέγεται **αναλυτικός τελεστής Toeplitz** αν $\phi \in \tilde{H}^\infty$ (οπότε $T_\phi = M_\phi|_{\tilde{H}^2} : \tilde{H}^2 \rightarrow \tilde{H}^2 : f \mapsto M_\phi f$).

$$T_\phi = M_\phi|_{\tilde{H}^2} \simeq \begin{bmatrix} \hat{\phi}(0) & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & 0 & 0 & \dots \\ \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & 0 & \dots \\ \hat{\phi}(3) & \hat{\phi}(2) & \hat{\phi}(1) & \hat{\phi}(0) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Πρόταση 75. Ο μεταθετής του unilateral shift T_1 στον \tilde{H}^2 είναι το σύνολο των αναλυτικών τελεστών Toeplitz: Αν $A \in \mathcal{B}(\tilde{H}^2)$, τότε

$$AT_1 = T_1A \iff A = T_\phi \text{ για κάποιο } \phi \in \tilde{H}^\infty.$$

Πρόταση 76. Ένας φραγμένος τελεστής $A \in \mathcal{B}(\tilde{H}^2)$ είναι τελεστής Toeplitz αν-ν έχει πίνακα Toeplitz ως προς την ο/κ βάση $\{f_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$.

Συνεπεία για $T \in \mathcal{B}(H^2)$:

Πόρισμα 77. Ένας φραγμένος τελεστής $T \in \mathcal{B}(H^2)$ είναι τελεστής Toeplitz³ αν-ν

$$S^*TS = T.$$

Παρατήρηση Η απεικόνιση $L^\infty(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(L^2(\mathbb{T})) : \phi \mapsto M_\phi$

- Είναι γραμμική: $M_{\phi+\lambda\psi} = M_\phi + \lambda M_\psi$
- Διατηρεί τη μονάδα: $M_1 = I$
- Διατηρεί την ενελίξη: $M_{\bar{\phi}} = M_\phi^*$
- Είναι συστολή (μαλιστα ισομετρία): $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$
- Διατηρεί το γινόμενο: $M_{\phi\psi} = M_\phi M_\psi$

³δηλ. ο επαγόμενος $\tilde{T} \in \mathcal{B}(\tilde{H}^2)$ είναι τελεστής Toeplitz

Πρόταση 78. Η απεικόνιση $L^\infty(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\tilde{H}^2) : \phi \mapsto T_\phi = PM_\phi|_{\tilde{H}^2}$

- Είναι γραμμική: $T_{\phi+\lambda\psi} = T_\phi + \lambda T_\psi$
- Διατηρεί τη μονάδα: $T_1 = I$
- Διατηρεί την ενελιξη: $T_{\bar{\phi}} = T_\phi^*$
- Είναι συστολή: $\|T_\phi\| \leq \|\phi\|_\infty$ και 1-1 (αργότερα θα δειχθεί ισομετρία)
- Δεν διατηρεί το γινόμενο

(πχ. $f_{-1}f_1 = f_1f_{-1}$ ενώ $T_{f_{-1}}T_{f_1} \neq T_{f_1}T_{f_{-1}}$).

Πρόταση 79. Αν $\phi, \psi \in L^\infty(\mathbb{T})$, ο τελεστής $T_\psi T_\phi$ είναι Toeplitz αν-ν είτε $\phi \in \tilde{H}^\infty$ είτε $\bar{\psi} \in \tilde{H}^\infty$. Τότε έχουμε $T_\psi T_\phi = T_{\psi\phi}$.

Θα χρειασθουν

Συμβολισμός Αν H Hilbert και $f, g \in H$ ο τελεστής $fg^* \in \mathcal{B}(H)$ ορίζεται ως εξής:

$$fg^* : h \mapsto \langle h, b \rangle f, f \in H.$$

Λήμμα 80. Αν $\phi, \psi \in L^\infty(\mathbb{T})$,

$$T_1^*(T_\psi T_\phi)T_1 - (T_\psi T_\phi) = fg^*$$

όπου $f = P(f_{-1}\psi)$ και $g = P(f_{-1}\bar{\phi})$.

Πόρισμα 81. Αν $\phi, \psi \in L^\infty(\mathbb{T})$, έχουμε $T_\psi T_\phi = 0$ αν-ν είτε $\psi = 0$ ή $\phi = 0$ (σ.π.).

Ποτε μετατιθενται; Ελεγχουμε ότι αν και οι δυο $\phi, \psi \in \tilde{H}^\infty$, ή και οι δυο $\bar{\phi}, \bar{\psi} \in \tilde{H}^\infty$, ή $\exists a, b \in \mathbb{C}$ ώστε $a\psi + b\phi = f_0 = 1$, τότε μετατιθενται.

Πρόταση 82. Εστω $\phi, \psi \in L^\infty(\mathbb{T})$. Εχουμε $T_\psi T_\phi = T_\phi T_\psi$ αν-ν ισχύει (τουλάχιστο) ένα από τα ακόλουθα

- οι ϕ και ψ ανήκουν στον \tilde{H}^∞ ,
- οι $\bar{\phi}$ και $\bar{\psi}$ ανήκουν στον \tilde{H}^∞ ,
- υπάρχουν $a, b \in \mathbb{C}$ με $|a| + |b| \neq 0$ ώστε $a\psi + b\phi = c1$ όπου $c \in \mathbb{C}$.

Πόρισμα 83. Αν $\phi, \psi \in L^\infty(\mathbb{T})$ και έχουμε $T_\psi T_\phi = T_\phi T_\psi$, τότε είτε ο $T_\psi T_\phi$ είναι Toeplitz ή μια απ τις ϕ, ψ είναι γραμμ. συνδυασμός της άλλης και της 1.

Παρατήρηση 84. Ένας τελεστής Toeplitz T_ϕ είναι αυτοσυζυγής αν-ν η ϕ παίρνει σ.π. πραγματικές τιμές (γιατί $T_\phi^* = T_{\bar{\phi}}$).

Πόρισμα 85. Ένας τελεστής Toeplitz T_ϕ είναι φυσιολογικός αν-ν υπάρχουν $c, d \in \mathbb{C}$ και $\psi \in L^\infty(\mathbb{T})$ πραγματική ώστε $\phi = c\psi + d$ σ.π.

Πρόταση 86. Δεν υπάρχουν $\neq 0$ συμπαγείς τελεστές Toeplitz.

Το φάσμα τελεστών Toeplitz

Ορισμός 87. Το ουσιώδες σύνολο τιμών (essential range) μιας $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$:

$$\text{essran}(\phi) := \{\lambda \in \mathbb{C} : m(\{e^{it} \in \mathbb{T} : |\phi(e^{it}) - \lambda| < \varepsilon\}) > 0 \forall \varepsilon > 0\}.$$

Πρόταση 88. Αν $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$,

$$\sigma(M_\phi) = \sigma_a(M_\phi) = \text{essran}(\phi).$$

Θεώρημα 89. Αν $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$, τότε $\sigma(M_\phi) \subseteq \sigma(T_\phi)$. Μαλιστα

$$\sigma(M_\phi) = \sigma_a(M_\phi) \subseteq \sigma_a(T_\phi) \subseteq \sigma(T_\phi).$$