



ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Μαρία Μουκταρούδη

Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ

Δ΄Παθολογική Κλινική

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών



1. Πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο
3. Υπογενεϊδίο τρίγωνο
5. Άνω καρωτιδικό τρίγωνο
7. Υπερκλείδιος βόθρος

2. Οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο
4. Υπογνάθιο τρίγωνο
6. Κάτω καρωτιδικό τρίγωνο
8. Ινιακό τρίγωνο

ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αλωπεκία	Απώλεια ή/και ευθρυπτότητα των τριχών της κεφαλής (ή και των φρυδιών)
Οίδημα	Εξαγγείωση υγρού στον διάμεσο χώρο
Τκτερος	Κιτρινωπή χροιά των σκληρών χιτώνων των οφθαλμών, αντιληπτή κυρίως στο κατώτερο τμήμα τους
Γλωσσίτιδα	Αίσθημα άλγους ή καύσου στην επιφάνεια της γλώσσας, επιπέδωση των γλωσσικών θηλών
Χειλίτιδα	Ξηρότητα, άλγος, ρωγμές των χειλέων (ιδίως στις γωνίες)
Διόγκωση σιελογόνων αδένων	Αύξηση του μεγέθους των παρωτίδων, υπογνάθιων ή υπογενειδίων αδένων
Βρογχοκήλη	Διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα
Εξόφθαλμος/ενόφθαλμος	Προεξοχή του βολβού διά της βλεφαρικής σχισμής / εισολκή του οφθαλμού εντός της οφθαλμικής κόγχης
Λάμπον όμμα	Ανάσπαση του άνω βλεφάρου και διεύρυνση της βλεφαρικής σχισμής
Σημείο von Graefe, “Lid lag”	Κατά την προς τα κάτω κίνηση των οφθαλμών υπολείπεται η συνοδός κίνηση των άνω βλεφάρων, με αποτέλεσμα τμήμα των σκληρών να παραμένει ακάλυπτο.
Δακτύλιος των Kayser-Fleischer	Πρασινόφαιη ή κιτρινόφαιη δακτυλιοειδής ταινία στην εξωτερική ζώνη του κερατοειδούς (ηπατοφακοειδής εκφύλιση, νόσος του Wilson)
Διόγκωση λεμφαδένων	Αύξηση του μεγέθους των λεμφαδένων (μονήρης ή γενικευμένη)
Σύνδρομο Horner	Μύση, πτώση βλεφάρου, ενόφθαλμος, ανυδρωσία προσώπου (επί βλάβης των αυχενικών συμπαθητικών γαγγλίων)
Κόρη Argyll Roberston	Κατάργηση του αντανακλαστικού της κόρης στο φως ενώ διατηρείται το αντανακλαστικό της προσαρμογής (επί σύφιλης του κεντρικού νευρικού συστήματος).

