

Ασκήσεις για το μάθημα «Ανάλυση Ι και Εφαρμογές»

Κεφάλαιο 4: Συνέχεια και όρια συναρτήσεων

Α' Ομάδα

1. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

- (α) Αν η $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο x_0 και $f(x_0) = 1$, τότε υπάρχει $\delta > 0$ ώστε: για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ισχύει $f(x) > \frac{4}{5}$.
- (β) Η $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$ είναι συνεχής.
- (γ) Η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται από τις: $f(x) = 0$ αν $x \in \mathbb{N}$ και $f(x) = 1$ αν $x \notin \mathbb{N}$, είναι συνεχής στο x_0 αν και μόνο αν $x_0 \notin \mathbb{N}$.
- (δ) Υπάρχει $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι ασυνεχής στα σημεία $0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ και συνεχής σε όλα τα άλλα σημεία.
- (ε) Υπάρχει $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι ασυνεχής στα σημεία $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ και συνεχής σε όλα τα άλλα σημεία.
- (στ) Υπάρχει συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι συνεχής στο 0 και ασυνεχής σε όλα τα άλλα σημεία.
- (ζ) Αν η $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής σε κάθε άρρητο x , τότε είναι συνεχής σε κάθε x .
- (η) Αν η f είναι συνεχής στο (a, b) και $f(q) = 0$ για κάθε ρητό $q \in (a, b)$, τότε $f(x) = 0$ για κάθε $x \in (a, b)$.
- (θ) Αν $f\left(\frac{1}{n}\right) = (-1)^n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, τότε η f είναι ασυνεχής στο σημείο 0.
- (ι) Αν η $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και $f(0) = -f(1)$ τότε υπάρχει $x_0 \in [0, 1]$ ώστε $f(x_0) = 0$.
- (ια) Αν η $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής, τότε η f παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή στο (a, b) .
- (ιβ) Αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ τότε η f είναι φραγμένη στο $[a, b]$.
- (ιγ) Αν $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ τότε $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \sin \frac{1}{x} = 0$.

Υπόδειξη. (α) Σωστό. Εφαρμόζουμε τον ορισμό της συνέχειας με $\varepsilon = \frac{1}{5} > 0$. Αφού η f είναι συνεχής στο x_0 , υπάρχει $\delta > 0$ ώστε: για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ισχύει

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{5}, \text{ δηλαδή } |f(x) - 1| < \frac{1}{5}.$$

Συνεπώς, για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ισχύει $\frac{4}{5} = 1 - \frac{1}{5} < f(x) < 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$.

(β) Σωστό. Όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της f είναι μεμονωμένα σημεία του, άρα η f είναι συνεχής σε αυτά. Το επιχείρημα είναι το εξής: έστω $m \in \mathbb{N}$ και έστω $\varepsilon > 0$. Επιλέγουμε $\delta = \frac{1}{2}$. Αν $n \in \mathbb{N}$ και $|n - m| < \frac{1}{2}$, τότε, αναγκαστικά, $n = m$. Συνεπώς,

$$|f(n) - f(m)| = |f(m) - f(m)| = 0 < \varepsilon.$$

(γ) Σωστό. Αν $x_0 \notin \mathbb{N}$ τότε υπάρχει $\delta > 0$ ώστε στο $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ να μην περιέχεται φυσικός αριθμός (εξηγήστε γιατί). Τότε, για κάθε $\varepsilon > 0$ και για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ έχουμε $|f(x) - f(x_0)| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon$. Άρα, η f είναι συνεχής στο x_0 .

Έστω τώρα $x_0 \in \mathbb{N}$. Υπάρχει ακολουθία (x_n) η οποία συγκλίνει στο x_0 και η οποία δεν έχει όρους που να είναι φυσικοί αριθμοί (εξηγήστε γιατί). Τότε, $f(x_n) = 1 \rightarrow 1 \neq 0 = f(x_0)$. Σύμφωνα με την αρχή της μεταφοράς, η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

(δ) *Σωστό*. Θεωρήστε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που παίρνει την τιμή 1 στα σημεία $0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ και την τιμή 0 σε όλα τα άλλα σημεία.

(ε) *Σωστό*. Θεωρήστε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως εξής: $f(x) = x$ αν $x = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ και $f(x) = 0$ σε όλα τα άλλα σημεία. Για να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο σημείο 0 χρησιμοποιήστε τον $\varepsilon - \delta$ ορισμό της συνέχειας.

(στ) *Σωστό*. Θεωρήστε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x$ αν $x \in \mathbb{Q}$ και $f(x) = -x$ αν $x \notin \mathbb{Q}$.

(ζ) *Λάθος*. Θεωρήστε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 0$ αν $x \neq 4$ και $f(4) = 1$. Η f είναι ασυνεχής στο $x_0 = 4$ και συνεχής σε κάθε άρρητο x .

(η) *Σωστό*. Θεωρήστε $x \in (a, b)$ και ακολουθία (q_n) ρητών αριθμών από το (a, b) η οποία συγκλίνει στο x . Τέτοια ακολουθία υπάρχει λόγω της πυκνότητας των ρητών στο \mathbb{R} . Αφού η f είναι συνεχής στο x , η αρχή της μεταφοράς δείχνει ότι $f(q_n) \rightarrow f(x)$. Από την υπόθεση έχουμε $f(q_n) = 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, και συνεπώς, $f(x) = 0$.

(θ) *Σωστό*. Έχουμε $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$ και $\frac{1}{2n-1} \rightarrow 0$. Από την υπόθεση, $f\left(\frac{1}{2n}\right) = (-1)^{2n} = 1 \rightarrow 1$ και $f\left(\frac{1}{2n-1}\right) = (-1)^{2n-1} = -1 \rightarrow -1$. Από την αρχή της μεταφοράς, η f είναι ασυνεχής στο σημείο 0.

(ι) *Σωστό*. Αν $f(0) = 0$ τότε παίρνουμε $x_0 = 0$ ή 1. Αν $f(0) \neq 0$, τότε από την $f(0) = -f(1)$ βλέπουμε ότι η f παίρνει ετερόσημες τιμές στα άκρα του $[0, 1]$. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ ώστε $f(x_0) = 0$.

(ια) *Λάθος*. Θεωρήστε την $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x$. Η f είναι συνεχής στο $(0, 1)$, όμως δεν παίρνει μέγιστη ούτε ελάχιστη τιμή στο $(0, 1)$.

(ιβ) *Σωστό*. Ένα από τα βασικά θεωρήματα για συνεχείς συναρτήσεις που έχουν πεδίο ορισμού κλειστό διάστημα.

(ιγ) *Σωστό*. Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, την αρχή της μεταφοράς. Αν $x_n \neq 0$ και $x_n \rightarrow 0$, τότε

$$\left| g(x_n) \sin \frac{1}{x_n} \right| \leq |g(x_n)|.$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, έχουμε $g(x_n) \rightarrow 0$. Από την προηγούμενη ανισότητα έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \sin \frac{1}{x} = 0.$$

2. Έστω $n \in \mathbb{N}$.

(α) Δείξτε ότι η συνάρτηση

$$f(x) = [x] + \left[x + \frac{1}{n} \right] + \dots + \left[x + \frac{n-1}{n} \right] - [nx]$$

είναι περιοδική με περίοδο $1/n$. Δηλαδή, $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

(β) Υπολογίστε την τιμή $f(x)$ όταν $0 \leq x < 1/n$.

(γ) Δείξτε την ταυτότητα

$$[nx] = [x] + \left[x + \frac{1}{n} \right] + \dots + \left[x + \frac{n-1}{n} \right]$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και κάθε $n \in \mathbb{N}$.

Υπόδειξη. (α) Παρατηρήστε ότι

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{1}{n}\right) &= \left[x + \frac{1}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n}\right] + \left[x + \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n}\right] - \left[n\left(x + \frac{1}{n}\right)\right] \\ &= \left[x + \frac{1}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] + [x+1] - [nx+1] \\ &= \left[x + \frac{1}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] + [x] + 1 - [nx] - 1 \\ &= [x] + \left[x + \frac{1}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] - [nx] \\ &= f(x). \end{aligned}$$

(β) Αν $0 \leq x < 1/n$ τότε

$$x, x + \frac{1}{n}, \dots, x + \frac{n-1}{n}, nx \in [0, 1)$$

άρα

$$[x] = \left[x + \frac{1}{n}\right] = \cdots = \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = [nx] = 0.$$

Έπεται ότι $f(x) = 0$.

(γ) Κάθε $x \in \mathbb{R}$ γράφεται στη μορφή $x = m_x \cdot \frac{1}{n} + y_x$ για κάποιους $m_x \in \mathbb{Z}$ και $y_x \in [0, 1/n)$, οπότε, από τα (α) και (β), για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε $f(x) = f\left(m_x \cdot \frac{1}{n} + y_x\right) = f(y_x) = 0$.

3. Έστω $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι υπάρχει $M \geq 0$ ώστε $|f(x) - f(y)| \leq M \cdot |x - y|$, για κάθε $x \in X$ και $y \in X$. Δείξτε ότι η f είναι συνεχής.

Υπόδειξη. Αν $M = 0$ τότε η f είναι σταθερή (γιατί;). Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι $M > 0$.

Έστω $x_0 \in X$ και έστω $\varepsilon > 0$. Επιλέγουμε $\delta = \varepsilon/M > 0$. Αν $x \in X$ και $|x - x_0| < \delta$, τότε $|f(x) - f(x_0)| \leq M|x - x_0| < M\delta = \varepsilon$. Το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, άρα η f είναι συνεχής στο x_0 .

4. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση με $|f(x)| \leq |x|$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

(α) Δείξτε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

(β) Δώστε παράδειγμα μιας τέτοιας f που να είναι ασυνεχής σε κάθε $x \neq 0$.

Υπόδειξη. (α) Παρατηρήστε ότι $|f(0)| \leq 0$, δηλαδή $f(0) = 0$. Έστω (x_n) ακολουθία στο \mathbb{R} με $x_n \rightarrow 0$. Τότε, από την $-x_n \leq f(x_n) \leq x_n$ και το κριτήριο παρεμβολής έπεται ότι $f(x_n) \rightarrow 0 = f(0)$. Από την αρχή της μεταφοράς η f είναι συνεχής στο 0.

(β) Η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ -x & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$ είναι συνεχής μόνο στο σημείο 0 (εξηγήστε γιατί) και ικανοποιεί την $|f(x)| \leq |x|$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

5. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και έστω $a_1 \in \mathbb{R}$. Ορίζουμε $a_{n+1} = f(a_n)$ για $n = 1, 2, \dots$. Αν $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ τότε $f(a) = a$.

Υπόδειξη. Από την $a_n \rightarrow a$ και από την αρχή της μεταφοράς, έχουμε $f(a_n) \rightarrow f(a)$. Από την υπόθεση, $f(a_n) = a_{n+1} \rightarrow a$. Από τη μοναδικότητα του ορίου ακολουθίας, $f(a) = a$.

6. Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις. Δείξτε ότι:

(α) Αν $f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{Q}$, τότε $f(y) = 0$ για κάθε $y \in \mathbb{R}$.

(β) Αν $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{Q}$, τότε $f(y) = g(y)$ για κάθε $y \in \mathbb{R}$.

(γ) Αν $f(x) \leq g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{Q}$, τότε $f(y) \leq g(y)$ για κάθε $y \in \mathbb{R}$.

Υπόδειξη. (α) Έστω $y \in \mathbb{R}$. Μπορούμε να βρούμε ακολουθία (x_n) ρητών αριθμών με $x_n \rightarrow y$. Αφού η f είναι συνεχής, από την αρχή της μεταφοράς έχουμε $0 = f(x_n) \rightarrow f(y)$. Άρα, $f(y) = 0$.

(β) Εφαρμόστε το (α) για την συνεχή συνάρτηση $h = f - g$.

(γ) Έστω $y \in \mathbb{R}$. Μπορούμε να βρούμε ακολουθία (x_n) ρητών αριθμών με $x_n \rightarrow y$. Από την υπόθεση έχουμε $f(x_n) \leq g(x_n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Από την αρχή της μεταφοράς παίρνουμε

$$f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(y).$$

7. Έστω $\alpha, \beta, \gamma > 0$ και $\lambda < \mu < \nu$. Δείξτε ότι η εξίσωση

$$\frac{\alpha}{x - \lambda} + \frac{\beta}{x - \mu} + \frac{\gamma}{x - \nu} = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε καθένα από τα διαστήματα (λ, μ) και (μ, ν) .

Υπόδειξη. Αρχεί να δείξουμε ότι η εξίσωση

$$g(x) = \alpha(x - \mu)(x - \nu) + \beta(x - \lambda)(x - \nu) + \gamma(x - \lambda)(x - \mu) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε καθένα από τα διαστήματα (λ, μ) και (μ, ν) . Η g είναι συνεχής στο $[\lambda, \mu]$ και στο $[\mu, \nu]$. Παρατηρούμε ότι

$$g(\lambda) = \alpha(\lambda - \mu)(\lambda - \nu) > 0,$$

$$g(\mu) = \beta(\mu - \lambda)(\mu - \nu) < 0,$$

$$g(\nu) = \gamma(\nu - \lambda)(\nu - \mu) > 0.$$

Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $\xi_1 \in (\lambda, \mu)$ ώστε $g(\xi_1) = 0$ και υπάρχει $\xi_2 \in (\mu, \nu)$ ώστε $g(\xi_2) = 0$.

8. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του ορίου, δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = 1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) = \frac{a}{2}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Υπόδειξη. (α) Έστω $x \in (-1, 1)$. Μπορούμε να γράψουμε

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} - 1 &= \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} - 1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} ((1 - \sqrt{1+x}) + (1 - \sqrt{1-x})) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \left(\frac{-x}{1 + \sqrt{1+x}} + \frac{x}{1 + \sqrt{1-x}} \right). \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} > 1$, $1 + \sqrt{1+x} > 1$ και $1 + \sqrt{1-x} > 1$. Συνεπώς,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} - 1 \right| &\leq \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \left(\frac{|x|}{1 + \sqrt{1+x}} + \frac{|x|}{1 + \sqrt{1-x}} \right) \\ &\leq 2|x|. \end{aligned}$$

Έστω $\varepsilon > 0$. Αν $0 < |x| < \delta = \varepsilon/2$ τότε $\left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} - 1 \right| < \varepsilon$. Άρα, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = 1$.

(β) Έστω $x > \max\{-a, 0\}$. Μπορούμε να γράψουμε

$$\begin{aligned} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) - \frac{a}{2} &= \frac{a\sqrt{x}}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x}} - \frac{a}{2} \\ &= \frac{a}{2(\sqrt{x+a} + \sqrt{x})} (\sqrt{x} - \sqrt{x+a}) \\ &= -\frac{a^2}{2(\sqrt{x+a} + \sqrt{x})^2}. \end{aligned}$$

Αφού $(\sqrt{x+a} + \sqrt{x})^2 > x$, έχουμε

$$\left| \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) - \frac{a}{2} \right| \leq \frac{a^2}{2x}.$$

Έστω $\varepsilon > 0$. Αν $x > M = a^2/(2\varepsilon) > 0$ τότε $\left| \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) - \frac{a}{2} \right| < \varepsilon$. Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) = \frac{a}{2}.$$

9. Εξετάστε αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια και, αν ναι, υπολογίστε τα.

$$(\alpha) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, \quad (\beta) \lim_{x \rightarrow x_0} [x], \quad (\gamma) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - [x]).$$

Υπόδειξη. (α) Παρατηρήστε ότι $\frac{x^3 - 8}{x - 2} = x^2 + 2x + 4$ για κάθε $x \neq 2$. Αν (x_n) είναι μια ακολουθία στο \mathbb{R} με $x_n \neq 2$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow 2$, τότε $x_n^2 + 2x_n + 4 \rightarrow 2^2 + 2 \cdot 2 + 4 = 12$. Από την αρχή της μεταφοράς, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = 12$.

(β) Αν $x_0 \notin \mathbb{Z}$, τότε $[x_0] < x_0 < [x_0] + 1$, άρα υπάρχει $\delta > 0$ ώστε $[x_0] < x_0 - \delta < x_0 + \delta < [x_0] + 1$. Τότε, η $f(x) = [x]$ είναι σταθερή και ίση με $[x_0]$ σε μια περιοχή του x_0 (εξηγήστε γιατί), άρα $\lim_{x \rightarrow x_0} [x] = [x_0]$. Αν $x_0 \in \mathbb{Z}$, τότε για κάθε $x \in (x_0 - 1, x_0)$ έχουμε $f(x) = [x] = x_0 - 1$ ενώ για κάθε $x \in (x_0, x_0 + 1)$ έχουμε $f(x) = [x] = x_0$. Άρα, $\lim_{x \rightarrow x_0} [x] = x_0 - 1 \neq x_0 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} [x]$. Έπεται ότι το $\lim_{x \rightarrow x_0} [x]$ δεν υπάρχει.

(γ) Από το (β), αν $x_0 \notin \mathbb{Z}$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow x_0} x - \lim_{x \rightarrow x_0} [x] = x_0 - [x_0]$. Αν $x_0 \in \mathbb{Z}$ τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - [x])$ δεν υπάρχει, γιατί τότε θα υπήρχε και το $\lim_{x \rightarrow x_0} [x]$ (εξηγήστε γιατί).

10. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ -x & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$. Δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ και ότι αν $x_0 \neq 0$ τότε δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Υπόδειξη. Χρησιμοποιώντας την $|f(x)| = |x|$ και τον $\varepsilon - \delta$ ορισμό, δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Χρησιμοποιώντας την πυκνότητα των ρητών και των άρρητων δείξτε, με βάση την αρχή της μεταφοράς, ότι αν $x_0 \neq 0$ τότε δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

11. Εξετάστε αν είναι συνεχείς οι ακόλουθες συναρτήσεις:

$$(\alpha) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ με } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{αν } x \neq 0 \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

$$(\beta) f_k : [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R} \text{ με } f_k(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x} & \text{αν } x \neq 0 \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$(\gamma) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ με } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x^2} & \text{αν } x \neq 0 \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

Υπόδειξη. (α) Γνωρίζουμε ότι $\sin x \leq x \leq \tan x$, άρα $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ για $x \in (0, \pi/2)$. Αν (x_n) είναι μια ακολουθία θετικών αριθμών με $x_n \rightarrow 0$, τότε $\cos x_n \rightarrow \cos 0 = 1$. Από το κριτήριο των ισοσυγκλινοσών ακολουθιών, $f(x_n) = \frac{\sin x_n}{x_n} \rightarrow 1 \neq f(0)$. Άρα, η f δεν είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 0$. Η f είναι συνεχής σε κάθε $x_0 \neq 0$.

(β) Η f είναι ασυνεχής στο 0 αν $k = 0$: δοκιμάστε την ακολουθία $x_n = -\frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$. Η f είναι συνεχής στο 0 αν $k \geq 1$: παρατηρήστε ότι $|f(x)| \leq |x|^k \leq |x|$ για κάθε $x \in [-1, 0]$.

(γ) Η f δεν είναι συνεχής στο σημείο 0: για την ακολουθία $x_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}}}$ έχουμε $x_n \rightarrow 0$ και $f(x_n) = \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \rightarrow +\infty$. Η f είναι συνεχής σε κάθε $x_0 \neq 0$.

12. Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

(α) Δείξτε ότι αν $f(x) \leq g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

(β) Δώστε ένα παράδειγμα όπου $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ενώ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

Υπόδειξη. (α) Έστω ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \beta$. Θεωρήστε τυχούσα ακολουθία (x_n) στο \mathbb{R} με $x_n \neq x_0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow x_0$. Τότε, $f(x_n) \leq g(x_n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) \rightarrow \alpha$ και $g(x_n) \rightarrow \beta$. Άρα, $\alpha \leq \beta$.

(β) Θεωρήστε τη συνάρτηση f που ορίζεται από την $f(x) = 0$ και τη συνάρτηση g που ορίζεται από τις $g(x) = x^2$ αν $x \neq 0$ και $g(0) = 5$. Τότε, $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ αλλά $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ (εξηγήστε γιατί).

13. Έστω $X \subset \mathbb{R}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις και έστω $x_0 \in \mathbb{R}$ ένα σημείο συσσώρευσης του X . Υποθέτουμε ότι υπάρχει $\delta > 0$ ώστε η f να είναι φραγμένη στο $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X$ και ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. Δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

Υπόδειξη. Από την υπόθεση υπάρχουν $\delta > 0$ και $M > 0$ ώστε: αν $x \in X$ και $|x - x_0| < \delta$ τότε $|f(x)| \leq M$. Θεωρήστε τυχούσα ακολουθία (x_n) στο X με $x_n \neq x_0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και $x_n \rightarrow x_0$. Θα δείξουμε ότι $f(x_n)g(x_n) \rightarrow 0$, οπότε το ζητούμενο προκύπτει από την αρχή της μεταφοράς.

Έστω $\varepsilon > 0$. Από την υπόθεση έχουμε $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 0$, άρα υπάρχει $n_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ώστε $|g(x_n)| < \frac{\varepsilon}{M}$ για κάθε $n \geq n_1$. Αφού $x_n \rightarrow x_0$, υπάρχει $n_2(\delta) \in \mathbb{N}$ ώστε $|x_n - x_0| < \delta$ για κάθε $n \geq n_2$. Άρα, $|f(x_n)| \leq M$ για κάθε $n \geq n_2$. Θέτουμε $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Τότε, για κάθε $n \geq n_0$ έχουμε

$$|f(x_n)g(x_n)| = |f(x_n)| \cdot |g(x_n)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, άρα $f(x_n)g(x_n) \rightarrow 0$.

14. Έστω $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ συνεχής συνάρτηση. Να δείχθει ότι υπάρχει $x \in [a, b]$ με $f(x) = x$.

Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνεχή συνάρτηση $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται από την $g(x) = f(x) - x$. Παρατηρήστε ότι $g(a) = f(a) - a \geq 0$ και $g(b) = f(b) - b \leq 0$. Αφού $g(a)g(b) \leq 0$, από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $x \in [a, b]$ ώστε $f(x) - x = g(x) = 0$.

15. Έστω $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: $f(x) = x^2$ για κάθε ρητό $x \in (0, 1)$. Να βρεθεί το $f(\frac{\sqrt{2}}{2})$. Αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

Υπόδειξη. Δείχνουμε ότι $f(t) = t^2$ για κάθε $t \in (0, 1)$. Ειδικότερα, θα έχουμε $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$.

Έστω λοιπόν $t \in (0, 1)$. Υπάρχει ακολουθία (q_n) ρητών στο $(0, 1)$ με $q_n \rightarrow t$. Αφού $f(q_n) = q_n^2$ και η f είναι συνεχής στο t , η αρχή της μεταφοράς δείχνει ότι

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n^2 = t^2.$$

16. Έστω $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $f(0) = f(2)$. Δείξτε ότι υπάρχει $x \in [0, 1]$ με $f(x+1) = f(x)$.

Υπόδειξη. Ορίζουμε $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - f(x+1)$. Η g είναι καλά ορισμένη και συνεχής στο $[0, 1]$. Παρατηρήστε ότι

$$g(0) = f(0) - f(1) = f(2) - f(1) = -g(1),$$

άρα $g(0)g(1) \leq 0$. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $x \in [0, 1]$ ώστε

$$f(x) - f(x+1) = g(x) = 0.$$

17. Υποθέτουμε ότι η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και $f(0) = f(1)$. Έστω $n \in \mathbb{N}$. Δείξτε ότι υπάρχει $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ ώστε $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$.

Υπόδειξη. Ορίζουμε $g : [0, 1 - \frac{1}{n}] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{n})$. Η g είναι καλά ορισμένη και συνεχής στο $[0, 1 - \frac{1}{n}]$. Παρατηρήστε ότι

$$g(0) + g\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + g\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(0) - f(1) = 0.$$

Άρα, υπάρχουν $\kappa, \lambda \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ώστε $g\left(\frac{\kappa}{n}\right) \leq 0$ και $g\left(\frac{\lambda}{n}\right) \geq 0$. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει x που ανήκει στο κλειστό διάστημα που έχει άκρα τα $\frac{\kappa}{n}$ και $\frac{\lambda}{n}$ και ικανοποιεί την $f(x) - f(x + \frac{1}{n}) = g(x) = 0$.

18. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και $x_1, x_2 \in [a, b]$. Δείξτε ότι για κάθε $t \in [0, 1]$ υπάρχει $y_t \in [a, b]$ ώστε

$$f(y_t) = tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Υπόδειξη. Η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, άρα παίρνει ελάχιστη τιμή m και μέγιστη τιμή M στο $[a, b]$. Για $i = 1, 2$ έχουμε $m \leq f(x_i) \leq M$, άρα

$$m = tm + (1-t)m \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \leq tM + (1-t)M = M.$$

Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $y_t \in [a, b]$ με $f(y_t) = tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$.

19. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση, και $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$. Δείξτε ότι υπάρχει $y \in [a, b]$ ώστε

$$f(y) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

Υπόδειξη. Η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, άρα παίρνει ελάχιστη τιμή m και μέγιστη τιμή M στο $[a, b]$. Για κάθε $i = 1, \dots, n$ έχουμε $m \leq f(x_i) \leq M$, άρα

$$m \leq \alpha := \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n} \leq M.$$

Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $y \in [a, b]$ με $f(y) = \alpha$.

Β' Ομάδα

20. Δείξτε ότι η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \in \mathbb{Q} \\ x^3 & \text{αν } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ είναι συνεχής μόνο στα σημεία $-1, 0, 1$.

Υπόδειξη. Ας υποθέσουμε ότι η f είναι συνεχής στο $x_0 \in \mathbb{R}$. Υπάρχει ακολουθία (q_n) ρητών αριθμών με $q_n \rightarrow x_0$ και υπάρχει ακολουθία (α_n) αρρήτων αριθμών με $\alpha_n \rightarrow x_0$. Αφού η f είναι συνεχής στο x_0 έχουμε $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x_0$ και $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\alpha_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^3 = x_0^3$. Άρα, $x_0 = x_0^3$. Αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο αν $x_0 = -1, 0$ ή 1 . Δηλαδή, η f είναι ασυνεχής σε κάθε $x_0 \notin \{-1, 0, 1\}$.

Ας υποθέσουμε ότι $x_0 \in \{-1, 0, 1\}$. Τότε, αν θεωρήσουμε τις συνεχείς συναρτήσεις $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = x$ και $h(x) = x^3$, έχουμε $f(x_0) = g(x_0) = h(x_0)$. Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η g είναι συνεχής στο x_0 , υπάρχει $\delta_1 > 0$ ώστε: αν $|x - x_0| < \delta_1$ τότε $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$. Αφού η h είναι συνεχής στο x_0 , υπάρχει $\delta_2 > 0$ ώστε: αν $|x - x_0| < \delta_2$ τότε $|h(x) - h(x_0)| < \varepsilon$. Θέτουμε $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Αν $|x - x_0| < \delta$, τότε:

(i) είτε $x \in \mathbb{Q}$ και $|x - x_0| < \delta \leq \delta_1$, οπότε $|f(x) - f(x_0)| = |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$,

(ii) ή $x \notin \mathbb{Q}$ και $|x - x_0| < \delta \leq \delta_2$, οπότε $|f(x) - f(x_0)| = |h(x) - h(x_0)| < \varepsilon$.

Σε κάθε περίπτωση, $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, και αφού το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, η f είναι συνεχής στο x_0 .

21. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: για κάθε $x \in [a, b]$ ισχύει $|f(x)| = 1$. Δείξτε ότι η f είναι σταθερή.

Υπόδειξη. Η f μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές -1 και 1 . Αν δεν είναι σταθερή, τότε υπάρχουν $x_1 \in [a, b]$ ώστε $f(x_1) = -1$ και $x_2 \in [a, b]$ ώστε $f(x_2) = 1$. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, η f παίρνει τότε όλες τις τιμές $\rho \in [-1, 1]$. Για παράδειγμα, υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε $f(\xi) = 0$. Αυτό οδηγεί σε άτοπο, αφού $|f(\xi)| = 1$ από την υπόθεση.

22. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις που ικανοποιούν την $f^2(x) = g^2(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$. Υποθέτουμε επίσης ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι $g \equiv f$ ή $g \equiv -f$ στο $[a, b]$.

Υπόδειξη. Παρατηρήστε ότι αφού η f δεν μηδενίζεται σε κανένα $x \in [a, b]$ το ίδιο ισχύει και για την g .

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας μπορούμε να υποθέσουμε ότι $f(a) > 0$. Τότε έχουμε $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$ (αν η f έπαιρνε κάπου αρνητική τιμή τότε, από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, θα υπήρχε και σημείο στο οποίο θα μηδενιζόταν).

Ας υποθέσουμε ότι $g(a) > 0$. Όπως πριν, έχουμε $g(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Αφού $f^2(x) = g^2(x)$ για κάθε x , συμπεραίνουμε ότι $g(x) = f(x)$ για κάθε x . Δηλαδή, $g = f$.

Ελέγξτε την περίπτωση $f(a) > 0$ και $g(a) < 0$ με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση από την $f^2 = g^2$ θα προκύψει ότι $g = -f$.

23. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την ιδιότητα $f(x) \in \mathbb{Q}$ για κάθε $x \in [0, 1]$. Δείξτε ότι η f είναι σταθερή συνάρτηση.

Υπόδειξη. Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$, άρα παίρνει ελάχιστη τιμή m και μέγιστη τιμή M στο $[0, 1]$. Αν υποθέσουμε ότι η f δεν είναι σταθερή συνάρτηση, τότε $m < M$ (γιατί;). Γνωρίζουμε ότι υπάρχει άρρητος α ώστε $m < \alpha < M$. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $x \in (0, 1)$ με $f(x) = \alpha$. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με την υπόθεση ότι η f παίρνει μόνο ρητές τιμές.

24. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι υπάρχει $\xi > 0$ ώστε $f(x) \geq \xi$ για κάθε $x \in [a, b]$.

Ισχύει το συμπέρασμα αν αντικαταστήσουμε το διάστημα $[a, b]$ με το διάστημα (a, b) ;

Υπόδειξη. Η f παίρνει ελάχιστη τιμή $f(x_0) > 0$ σε κάποιο $x_0 \in [a, b]$. Αν θέσουμε $\xi = f(x_0)$, τότε $\xi > 0$ και $f(x) \geq f(x_0) = \xi$ για κάθε $x \in [a, b]$.

Αν αντικαταστήσουμε το $[a, b]$ με το (a, b) τότε το συμπέρασμα παύει να ισχύει. Παράδειγμα: η $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x$ είναι συνεχής και $f(x) = x > 0$ για κάθε $x \in (0, 1]$. Όμως, $\inf\{f(x) : x \in (0, 1]\} = \inf(0, 1] = 0$. Άρα, για κάθε $\xi > 0$ υπάρχει $x \in (0, 1]$ ώστε $f(x) = x < \xi$.

25. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις που ικανοποιούν την $f(x) > g(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι υπάρχει $\rho > 0$ ώστε $f(x) > g(x) + \rho$ για κάθε $x \in [a, b]$.

Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνεχή συνάρτηση $f - g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Η $f - g$ παίρνει ελάχιστη τιμή m σε κάποιο $y \in [a, b]$. Από την υπόθεση έχουμε $m = (f - g)(y) = f(y) - g(y) > 0$. Αν θέσουμε $\rho = \frac{m}{2}$, τότε $\rho > 0$ και για κάθε $x \in [a, b]$ έχουμε $f(x) - g(x) \geq m > \rho$.

26. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής σε κάθε σημείο του $[a, b]$. Υποθέτουμε ότι για κάθε $x \in [a, b]$ υπάρχει $y \in [a, b]$ ώστε $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. Δείξτε ότι υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ ώστε $f(x_0) = 0$.

Υπόδειξη. Υποθέτουμε ότι η f δεν μηδενίζεται στο $[a, b]$. Τότε, $|f(t)| > 0$ για κάθε $t \in [a, b]$. Η συνεχής συνάρτηση $|f|$ παίρνει ελάχιστη τιμή στο $[a, b]$. Δηλαδή, υπάρχει $x \in [a, b]$ ώστε

$$|f(t)| \geq |f(x)| > 0 \quad \text{για κάθε } t \in [a, b].$$

Όμως, από την υπόθεση, υπάρχει $y \in [a, b]$ ώστε

$$0 < |f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)| \leq \frac{1}{2}|f(y)|.$$

Δηλαδή, $|f(y)| < 0$, το οποίο είναι άτοπο.

27. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις με $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$. Δείξτε ότι $\max(f) < \max(g)$.

Υπόδειξη. Θεωρούμε $t \in [a, b]$ με $f(t) = \max(f)$. Τότε,

$$\max(f) = f(t) < g(t) \leq \max(g),$$

δηλαδή $\max(f) < \max(g)$.

28. Έστω $f, g : [a, b] \rightarrow [c, d]$ συνεχείς και επί συναρτήσεις. Δείξτε ότι υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε $f(\xi) = g(\xi)$.

Υπόδειξη. Αφού οι f, g είναι επί του $[c, d]$, υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, b]$ ώστε $f(x_1) = d = g(x_2)$. Τότε, για τη συνάρτηση $h = f - g$ έχουμε

$$h(x_1) = f(x_1) - g(x_1) = d - g(x_1) \geq 0$$

και

$$h(x_2) = f(x_2) - g(x_2) = f(x_2) - d \leq 0.$$

Από την $h(x_1)h(x_2) \leq 0$ και από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής έπεται ότι υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε $h(\xi) = 0$, δηλαδή $f(\xi) = g(\xi)$.

29. Δείξτε ότι αν $a, b > 0$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{a} \left[\frac{b}{x} \right] = \frac{b}{a} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{x} \left[\frac{x}{a} \right] = 0.$$

Τι γίνεται όταν $x \rightarrow 0^-$;

Υπόδειξη. (α) Έστω $x > 0$. Παρατηρήστε ότι $\frac{b}{x} - 1 < \left[\frac{b}{x}\right] \leq \frac{b}{x}$ και $\frac{x}{a} > 0$, άρα

$$\frac{b}{a} - \frac{x}{a} < \frac{x}{a} \left[\frac{b}{x}\right] \leq \frac{b}{a}.$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{b}{a} - \frac{x}{a}\right) = \frac{b}{a}$, συμπεραίνουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{a} \left[\frac{b}{x}\right] = \frac{b}{a}$.

Για το δεύτερο όριο, παρατηρήστε ότι αν $0 < x < a$ τότε $\left[\frac{x}{a}\right] = 0$. Άρα, $\frac{b}{x} \left[\frac{x}{a}\right] = 0$ για κάθε $x \in (0, a)$. Έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{x} \left[\frac{x}{a}\right] = 0$.

(β) Έστω $x < 0$. Παρατηρήστε ότι $\frac{b}{x} - 1 < \left[\frac{b}{x}\right] \leq \frac{b}{x}$ και $\frac{x}{a} < 0$, άρα

$$\frac{b}{a} - \frac{x}{a} > \frac{x}{a} \left[\frac{b}{x}\right] \geq \frac{b}{a}.$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{b}{a} - \frac{x}{a}\right) = \frac{b}{a}$, συμπεραίνουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{a} \left[\frac{b}{x}\right] = \frac{b}{a}$.

Για το δεύτερο όριο, παρατηρήστε ότι αν $-a < x < 0$ τότε $-1 < \frac{x}{a} < 0$, άρα $\left[\frac{x}{a}\right] = -1$. Συνεπώς, $\frac{b}{x} \left[\frac{x}{a}\right] = -\frac{b}{x}$ για κάθε $x \in (-a, 0)$. Έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b}{x} \left[\frac{x}{a}\right] = +\infty$.

30. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 1$ αν $x \in \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ και 0 αλλιώς. Εξετάστε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Υπόδειξη. Το όριο δεν υπάρχει. Οι ακολουθίες $a_n = \frac{1}{n}$ και $b_n = \frac{\sqrt{2}}{n}$ συγκλίνουν στο 0. Έχουμε $f(a_n) = 1 \rightarrow 1$ και $f(b_n) = 0 \rightarrow 0$. Αν υπήρχε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \ell$, από την αρχή της μεταφοράς θα είχαμε $f(a_n) \rightarrow \ell$ και $f(b_n) \rightarrow \ell$, δηλαδή $1 = \ell = 0$, το οποίο είναι άτοπο.

31. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T > 0$. Υποθέτουμε ότι υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι η f είναι σταθερή.

Υπόδειξη. Έστω $x \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε την ακολουθία $x_n = x + nT$. Τότε, $x_n \rightarrow +\infty$ και $f(x_n) = f(x)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ (εξηγήστε γιατί). Άρα, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, από την αρχή της μεταφοράς παίρνουμε $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$. Άρα $f(x) = b$. Το $x \in \mathbb{R}$ ήταν τυχόν, άρα η f είναι σταθερή: $f(x) = b$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

32. Έστω $P(x) = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0$ πολυώνυμο με την ιδιότητα $a_0 a_m < 0$. Δείξτε ότι η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει θετική πραγματική ρίζα.

Υπόδειξη. Έστω $x > 0$. Γράφουμε $P(x) = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0 = a_m x^m (1 + \Delta(x))$ όπου

$$\Delta(x) = \frac{a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{a_m x^m}.$$

Παρατηρήστε ότι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta(x) = 0,$$

άρα υπάρχει $M > 0$ ώστε

$$1 + \Delta(x) > 0$$

για κάθε $x \geq M$. Ειδικότερα, οι $P(M)$ και a_m έχουν το ίδιο πρόσημο (εξηγήστε γιατί). Χρησιμοποιώντας και την $P(0) = a_0$, βλέπουμε ότι ο $P(M)P(0)$ είναι ομόσημος με τον $a_0 a_m$, δηλαδή αρνητικός. Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $\rho \in (0, M)$ ώστε $P(\rho) = 0$.

33. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και φθίνουσα συνάρτηση. Δείξτε ότι η f έχει μοναδικό σταθερό σημείο: υπάρχει ακριβώς ένας πραγματικός αριθμός x_0 για τον οποίο

$$f(x_0) = x_0.$$

Υπόδειξη. Αφού η f είναι φθίνουσα, για κάθε $x > 0$ έχουμε $f(x) - x \leq f(0) - x$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(0) - x) = -\infty$. Άρα, υπάρχει $x_1 > 0$ ώστε $f(x_1) - x_1 < 0$.

Όμοια, για κάθε $x < 0$ έχουμε $f(x) - x \geq f(0) - x$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(0) - x) = +\infty$. Άρα, υπάρχει $x_2 < 0$ ώστε $f(x_2) - x_2 > 0$.

Αφού η f είναι συνεχής, εφαρμόζοντας το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής για την $f(x) - x$ στο διάστημα $[x_2, x_1]$ βρίσκουμε $x_0 \in (x_2, x_1)$ ώστε $f(x_0) - x_0 = 0$, δηλαδή $f(x_0) = x_0$.

Για τη μοναδικότητα, παρατηρήστε ότι η συνάρτηση $f(x) - x$ είναι γνησίως φθίνουσα, και συνεπώς, έχει το πολύ μία ρίζα.

34. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Δείξτε ότι η f παίρνει μέγιστη τιμή: υπάρχει $y \in \mathbb{R}$ ώστε $f(y) \geq f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Υπόδειξη. Θέτουμε $\varepsilon = f(0) > 0$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, υπάρχει $M > 0$ ώστε: για κάθε $x > M$ ισχύει $0 < f(x) < f(0)$. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, υπάρχει $N > 0$ ώστε: για κάθε $x < -N$ ισχύει $0 < f(x) < f(0)$.

Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[-N, M]$. Άρα, υπάρχει $y \in [-N, M]$ με την ιδιότητα: για κάθε $x \in [-N, M]$ ισχύει $f(x) \leq f(y)$. Ειδικότερα, αφού $-N < 0 < M$ έχουμε $f(0) \leq f(y)$.

Μπορούμε τώρα εύκολα να δούμε ότι η f παίρνει μέγιστη τιμή στο σημείο y . Θεωρήστε τυχόν $x \in \mathbb{R}$ και διακρίνετε τις περιπτώσεις $x < -N$, $x \in [-N, M]$ και $x > M$.

35. (α) Έστω $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Αν $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \geq 0$ δείξτε ότι η g διατηρεί πρόσημο: ή $g(x) > 0$ για κάθε $x \geq 0$ ή $g(x) < 0$ για κάθε $x \geq 0$.

(β) Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ συνεχής συνάρτηση. Αν $f(x) \neq x$ για κάθε $x \geq 0$, δείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Υπόδειξη. (α) Αφού $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \geq 0$, αν η g δεν διατηρεί πρόσημο, θα υπάρχουν $x_1, x_2 \geq 0$ ώστε $g(x_1) < 0$ και $g(x_2) > 0$. Όμως τότε, εφαρμόζοντας το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής μπορούμε να βρούμε ξ ανάμεσα στα x_1 και x_2 για το οποίο $g(\xi) = 0$. Έτσι οδηγούμαστε σε άτοπο (από την υπόθεση έχουμε $g(\xi) \neq 0$).

(β) Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - x$. Από την υπόθεση έχουμε $f(x) \neq x$ για κάθε $x \geq 0$. Από το (α), η g διατηρεί πρόσημο. Αφού $g(0) = f(0) > 0$, συμπεραίνουμε ότι $g(x) > 0$ για κάθε $x \geq 0$. Συνεπώς, $f(x) > x$ για κάθε $x \geq 0$. Έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

36. Υποθέτουμε ότι η $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Δείξτε ότι η f παίρνει ελάχιστη τιμή, δηλαδή ότι υπάρχει $x_0 \in [a, +\infty)$ με $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in [a, +\infty)$.

Υπόδειξη. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, υπάρχει $M > a$ ώστε $f(x) > f(a)$ για κάθε $x > M$.

Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, M]$, άρα υπάρχει $x_0 \in [a, M]$ ώστε $f(x_0) \leq f(x)$ για κάθε $x \in [a, M]$. Τότε, έχουμε επίσης

$$f(x) > f(a) \geq f(x_0)$$

(η δεύτερη ανισότητα ισχύει διότι $a \in [a, M]$).

Έπεται ότι $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in [a, +\infty)$.

37. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Αν $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$, τότε η f παίρνει μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.

Υπόδειξη. Αν η f είναι σταθερή και $f(x) = \alpha$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f παίρνει προφανώς μέγιστη και ελάχιστη τιμή (την α). Αλλιώς, είτε υπάρχει x_1 ώστε $f(x_1) > \alpha$ ή υπάρχει x_2 ώστε $f(x_2) < \alpha$ (μπορεί φυσικά να συμβαίνουν και τα δύο).

Με την υπόθεση ότι υπάρχει x_1 ώστε $f(x_1) > \alpha$, θα δείξουμε ότι η f παίρνει μέγιστη τιμή. Θέτουμε $\varepsilon = f(x_1) - \alpha > 0$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$, υπάρχει $M > \max\{0, x_1\}$ ώστε: για κάθε $x > M$ ισχύει $f(x) < \alpha + \varepsilon = f(x_1)$. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha$, υπάρχει $N > 0$ ώστε $-N < x_1$ και για κάθε $x < -N$ να ισχύει $f(x) < \alpha + \varepsilon = f(x_1)$. Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[-N, M]$. Άρα, υπάρχει $y \in [-N, M]$ με την ιδιότητα: για κάθε $x \in [-N, M]$ ισχύει $f(x) \leq f(y)$. Ειδικότερα, αφού $-N < x_1 < M$ έχουμε $f(x_1) \leq f(y)$. Μπορούμε τώρα εύκολα να δούμε ότι η f παίρνει μέγιστη τιμή στο σημείο y . Θεωρήστε τυχόν $x \in \mathbb{R}$ και διακρίνετε τις περιπτώσεις $x < -N$, $x \in [-N, M]$ και $x > M$.

Με την υπόθεση ότι υπάρχει x_2 ώστε $f(x_2) < \alpha$, δείξτε ότι η f παίρνει ελάχιστη τιμή.

38. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Δείξτε ότι $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Υπόδειξη. Ο εγκλεισμός $f(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$ είναι προφανής. Θα δείξουμε ότι για κάθε $y \in \mathbb{R}$ υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ ώστε $y = f(x)$, οπότε $\mathbb{R} \subseteq f(\mathbb{R})$.

Έστω $y \in \mathbb{R}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, υπάρχει $x_1 \in \mathbb{R}$ ώστε $x_1 < 0$ και $f(x_1) < y$ (εξηγήστε γιατί). Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, υπάρχει $x_2 \in \mathbb{R}$ ώστε $x_2 > 0$ και $f(x_2) > y$ (εξηγήστε γιατί). Αφού $f(x_1) < y < f(x_2)$ και η f είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$, από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής υπάρχει $x \in (x_1, x_2)$ ώστε $f(x) = y$.

39. Έστω $f : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση γνησίως αύξουσα και συνεχής. Δείξτε ότι

$$f((\alpha, \beta)) = \left(\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \right).$$

Υπόδειξη. Αφού η $f : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής, γνωρίζουμε ότι το $f((\alpha, \beta))$ είναι ένα διάστημα J το οποίο περιέχει το (γ, δ) , όπου $\gamma = \inf_{\alpha < x < \beta} f(x)$ και $\delta = \sup_{\alpha < x < \beta} f(x)$.

Δείξτε πρώτα ότι $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = \gamma$ και $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = \delta$. Για παράδειγμα, η πρώτη ισότητα έπεται από τα εξής:

1. Αν $\alpha < x < \beta$ τότε $f(x) \geq \gamma$, άρα $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \geq \gamma$.

2. Αν $\alpha < y < \beta$, τότε για κάθε $x \in (\alpha, y)$ έχουμε $f(x) < f(y)$, άρα $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \leq f(y)$. Δηλαδή, το $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$ είναι κάτω φράγμα του $\{f(y) : \alpha < y < \beta\}$, οπότε $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \leq \gamma$.

Μένει να δείξουμε ότι το $f((\alpha, \beta))$ δεν περιέχει τα γ και δ (αν αυτά είναι πεπερασμένα). Αυτό όμως είναι συνέπεια του ότι η f είναι γνησίως αύξουσα: για παράδειγμα, αν $\gamma = f(x)$ για κάποιο $x \in (\alpha, \beta)$ τότε

παίρνοντας τυχόν $\alpha < z < x$ θα είχαμε $f(z) < f(x) = \gamma$, που είναι άτοπο αφού ο γ είναι κάτω φράγμα του $f((\alpha, \beta))$.

40. Έστω $a \in [0, \pi]$. Ορίζουμε ακολουθία με $a_1 = a$ και $a_{n+1} = \sin(a_n)$. Δείξτε ότι $a_n \rightarrow 0$.

Υπόδειξη. Δείχνουμε πρώτα με επαγωγή ότι $a_n \in [0, \pi]$ για κάθε $n \geq 1$. Τότε, από την ανισότητα $0 \leq \sin x \leq x$ που ισχύει για $x \in [0, \pi]$, έχουμε ότι, για κάθε $n \geq 1$, $a_{n+1} = \sin(a_n) \leq a_n$. Δηλαδή, η (a_n) είναι φθίνουσα και κάτω φραγμένη από το 0. Έπεται ότι η (a_n) συγκλίνει σε κάποιο $x \in [0, \pi]$. Από την αναδρομική σχέση βλέπουμε ότι, αφού $a_{n+1} \rightarrow x$ και $\sin(a_n) \rightarrow \sin x$, το x ικανοποιεί την εξίσωση $\sin x = x$. Αφού $x \in [0, \pi]$, αναγκαστικά ισχύει $x = 0$ (εξηγήστε γιατί). Δηλαδή, $a_n \rightarrow 0$.

41. Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν $x_n \in [0, 1]$ ώστε $f(x_n) \rightarrow 0$. Τότε, υπάρχει $x_0 \in [0, 1]$ ώστε $f(x_0) = 0$.

Υπόδειξη. Υποθέτουμε ότι η f δεν μηδενίζεται στο $[a, b]$. Δείξτε ότι υπάρχει $\varepsilon > 0$ ώστε $|f(x)| \geq \varepsilon$ για κάθε $x \in [a, b]$ (χρησιμοποιήστε το γεγονός ότι η $|f|$ παίρνει ελάχιστη τιμή). Από την υπόθεση όμως, υπάρχει ακολουθία (x_n) στο $[0, 1]$ ώστε $f(x_n) \rightarrow 0$. Για όλους τελικά τους $n \in \mathbb{N}$ πρέπει να ισχύει $|f(x_n)| < \varepsilon$, το οποίο οδηγεί σε άτοπο.

42. Έστω $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις. Δείξτε ότι

(α) η $f + g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I .

(β) η $f \cdot g$ δεν είναι αναγκαστικά ομοιόμορφα συνεχής στο I , αν όμως οι f, g υποτεθούν και φραγμένες τότε η $f \cdot g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I .

Υπόδειξη. (α) Έστω $\varepsilon > 0$. Αφού η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I , υπάρχει $\delta_1 > 0$ ώστε αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta_1$ τότε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ομοίως, αφού η g είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I , υπάρχει $\delta_2 > 0$ ώστε αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta_2$ τότε $|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Ορίζουμε $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Τότε, αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta$, έχουμε

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (f+g)(y)| &= |(f(x) - f(y)) + (g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Έπεται ότι η $f + g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I .

(β) Αν οι f, g είναι ομοιόμορφα συνεχείς στο I τότε η $f \cdot g$ δεν είναι αναγκαστικά ομοιόμορφα συνεχής στο I : θεωρήστε τις $f, g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = g(x) = x$. Αυτές είναι ομοιόμορφα συνεχείς στο $[0, +\infty)$, όμως η $(f \cdot g)(x) = x^2$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$.

Αν όμως οι ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ υποτεθούν και φραγμένες, τότε η $f \cdot g$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο I . Υπάρχουν $M, N > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M$ και $|g(x)| \leq N$ για κάθε $x \in I$. Έστω $\varepsilon > 0$. Από την ομοιόμορφη συνέχεια των f και g μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ ώστε αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta$ τότε

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{M+N} \quad \text{και} \quad |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{M+N}.$$

Τότε, αν $x, y \in I$ και $|x - y| < \delta$ έχουμε

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - g(y)| + |g(y)| \cdot |f(x) - f(y)| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{M+N} + N \cdot \frac{\varepsilon}{M+N} = \varepsilon. \end{aligned}$$

43. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $M = M(\varepsilon) > 0$ ώστε αν $|x| \geq M$ τότε $|f(x)| < \varepsilon$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Υπόδειξη. Έστω $\varepsilon > 0$. Από την υπόθεση, υπάρχει $M = M(\varepsilon) > 0$ ώστε αν $|x| \geq M$ τότε $|f(x)| < \varepsilon/3$. Επίσης, η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[-M, M]$, οπότε είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[-M, M]$. Άρα, υπάρχει $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ με $\delta < M$, ώστε αν $x, y \in [-M, M]$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/3$.

Θα δείξουμε ότι αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- (i) $x, y \in (-\infty, M]$: τότε, $|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.
- (ii) $x, y \in [M, +\infty)$: τότε, $|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.
- (iii) $x, y \in [-M, M]$: τότε, από την επιλογή του δ έχουμε $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.
- (iv) $x < M < y$: τότε, $x \in [-M, M]$ (διότι $\delta < M$) και $|x - M| < |x - y| < \delta$, άρα $|f(x) - f(M)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Επίσης, $M, y \geq M$ άρα $|f(M)| < \frac{\varepsilon}{3}$ και $|f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Συνεπώς,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f(M)| + |f(M) - f(y)| \\ &\leq |f(x) - f(M)| + |f(M)| + |f(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

- (v) $x < -M < y$: όμοια με την προηγούμενη περίπτωση.

Το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, άρα η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

44. Έστω $a \in \mathbb{R}$ και $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την εξής ιδιότητα: υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και είναι πραγματικός αριθμός. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Υπόδειξη. Έστω $\ell := \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - \ell$. Τότε, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. Άρα, για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $M = M(\varepsilon) > a$ ώστε αν $x \geq M$ τότε $|g(x)| < \varepsilon$. Το επιχείρημα της προηγούμενης άσκησης δείχνει ότι η g είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$. Αφού η σταθερή συνάρτηση $h(x) = \ell$ είναι επίσης ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$, έπεται ότι η $f = g + h$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$.

45. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση. Δείξτε ότι υπάρχουν $A, B > 0$ ώστε $|f(x)| \leq A|x| + B$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Υπόδειξη. Αφού η $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής, για $\varepsilon = 1$ μπορούμε να βρούμε $\delta > 0$ ώστε: αν $x, y \in \mathbb{R}$ και $|x - y| < \delta$ τότε $|f(x) - f(y)| < 1$.

Έστω $x > 0$. Θεωρούμε τον ελάχιστο φυσικό $n = n_x$ για τον οποίο $n_x \frac{\delta}{2} > x$ (αυτός υπάρχει, από την Αρχιμήδεια ιδιότητα και από την αρχή του ελαχίστου). Τότε,

$$(*) \quad (n_x - 1) \frac{\delta}{2} \leq x < n_x \frac{\delta}{2}.$$

Θεωρούμε τα σημεία: $x_0 = 0, x_1 = \frac{\delta}{2}, \dots, x_n = n \frac{\delta}{2}$. Έχουμε $|x_{k+1} - x_k| < \delta$ για κάθε $k = 0, 1, \dots, n-1$ και $|x - x_n| < \delta$. Άρα,

$$|f(x) - f(0)| \leq |f(x) - f(x_n)| + \dots + |f(x_1) - f(x_0)| < n + 1 = n_x + 1 < \frac{2}{\delta}x + 2$$

από την (*). Δηλαδή, για κάθε $x > 0$.

$$|f(x)| \leq \frac{2}{\delta}x + 2 + |f(0)|.$$

Δουλεύοντας με τον ίδιο τρόπο για $x < 0$ δείξτε ότι

$$|f(x)| \leq \frac{2}{\delta}|x| + 2 + |f(0)|$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως, το ζητούμενο ισχύει με $A = \frac{2}{\delta}$ και $B = |f(0)| + 2$.

46. Έστω $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη Άσκηση δείξτε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^n$, $x \in \mathbb{R}$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Υπόδειξη. Έστω $n > 1$. Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^n$, $x \in \mathbb{R}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής. Από την προηγούμενη άσκηση υπάρχουν $A, B > 0$ ώστε $x^n \leq Ax + B$ για κάθε $x > 0$. Τότε,

$$x^{n-1} \leq A + \frac{B}{x}$$

για κάθε $x > 0$. Αφού $n > 1$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-1} = +\infty$. Όμως, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (A + \frac{B}{x}) = A$. Αυτό οδηγεί σε άτοπο.

47. (α) Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι υπάρχει $a > 0$ ώστε η f να είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$.

(β) Δείξτε ότι η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$.

Υπόδειξη. (α) Έχουμε υποθέσει ότι υπάρχει $a > 0$ ώστε η f να είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[a, +\infty)$. Επίσης, η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[0, a]$, άρα είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, a]$. Δείξτε ότι η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$ χρησιμοποιώντας την τεχνική της Άσκησης 43 (διακρίνοντας περιπτώσεις).

(β) Η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$. Αν $x, y \in [1, +\infty)$, τότε

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{1}{2}|x - y|,$$

δηλαδή η f ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz στο $[1, +\infty)$. Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[1, +\infty)$. Τώρα, μπορείτε να εφαρμόσετε το (α).

48. Εξετάστε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι ομοιόμορφα συνεχείς.

(α) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 3x + 1$.

(β) $f : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$.

(γ) $f : (0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x} \sin^2 x$.

(δ) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sin \frac{1}{x}$.

(ε) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$.

(στ) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

(ζ) $f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\cos(x^3)}{x}$.

(η) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x^2+4}$.

(θ) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$.

(ι) $f : [-2, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

(ια) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin x$.

(ιβ) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\cos(x^2)}{x+1}$.

Υπόδειξη. Όλες οι συναρτήσεις είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους.

(α) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 3x + 1$. Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής: είναι Lipschitz συνεχής με σταθερά 3. Για την ακρίβεια,

$$|f(x) - f(y)| = 3|x - y|$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

(β) $f : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$. Η f είναι ομοιόμορφα συνεχής: είναι Lipschitz συνεχής, αφού

$$|f'(x)| = \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{4}$$

στο $[2, +\infty)$.

(γ) $f : (0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x} \sin^2 x$. Η f ορίζεται στο ημιανοικτό διάστημα $(0, \pi]$ και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \sin x = 1 \cdot 0 = 0.$$

Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(δ) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sin \frac{1}{x}$. Η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής, διότι δεν υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x}.$$

(ε) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$. Επεκτείνουμε την f σε συνεχή συνάρτηση στο $[0, +\infty)$, θέτοντας

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$f'(x) = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}.$$

Αν $x \geq 1$ τότε

$$|f'(x)| \leq \left| \sin \frac{1}{x} \right| + \frac{1}{x} \left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq 2.$$

Συνεπώς, η f είναι Lipschitz συνεχής, άρα και ομοιόμορφα συνεχής, στο $[1, +\infty)$. Αφού είναι και συνεχής στο $[0, +\infty)$, είναι ομοιόμορφα συνεχής (από την Άσκηση 47(α)).

(στ) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. Επεκτείνουμε την f σε συνεχή συνάρτηση στο $[0, +\infty)$, θέτοντας

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Αφού

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0,$$

η f είναι ομοιόμορφα συνεχής από την Άσκηση 44.

(ζ) $f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\cos(x^3)}{x}$. Επεκτείνουμε την f σε συνεχή συνάρτηση στο $[1, +\infty)$, θέτοντας

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\cos(x^3)}{x} = \cos(1).$$

Αφού

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x^3)}{x} = 0,$$

η f είναι ομοιόμορφα συνεχής από την Άσκηση 44.

(η) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x^2+4}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2+4} = 0$, η f ικανοποιεί την υπόθεση της Άσκησης 43. Συνεπώς, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(θ) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$, από την Άσκηση 9. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $(-\infty, 0]$, πάλι από την Άσκηση 44. Έπεται ότι είναι ομοιόμορφα συνεχής στο \mathbb{R} (χρησιμοποιήστε την τεχνική της Άσκησης 43).

(ι) $f : [-2, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$. Κάθε συνεχής συνάρτηση ορισμένη σε κλειστό διάστημα είναι ομοιόμορφα συνεχής, άρα η f είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(ια) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x \sin x$. Η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής. Παρατηρούμε ότι η $f'(x) = x \cos x + \sin x$ δεν είναι φραγμένη και ότι παίρνει μεγάλες τιμές στα σημεία της μορφής $2n\pi$ όπου n μεγάλος φυσικός. Ορίζουμε $x_n = 2n\pi$ και $y_n = 2n\pi + \frac{1}{n}$. Τότε, $y_n - x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, αλλά

$$f(y_n) - f(x_n) = (2n\pi + (1/n)) \sin(1/n) = 2\pi \frac{\sin(1/n)}{1/n} + \frac{\sin(1/n)}{n} \rightarrow 2\pi \cdot 1 + 0 = 2\pi \neq 0$$

όταν $n \rightarrow \infty$. Από τον χαρακτηρισμό της ομοιόμορφης συνέχειας μέσω ακολουθιών έπεται ότι η f δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής.

(ιβ) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{\cos(x^2)}{x+1}$. Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, η f είναι ομοιόμορφα συνεχής στο $[0, +\infty)$, από την Άσκηση 44.

Γ' Ομάδα

49. Δείξτε ότι αν $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια συνεχής συνάρτηση με $f(1) = \alpha$, η οποία ικανοποιεί την $f(x+y) = f(x) + f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$, τότε:

(α) $f(n) = n\alpha$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.

(β) $f(\frac{1}{m}) = \frac{\alpha}{m}$ για κάθε $m = 1, 2, \dots$

(γ) $f(x) = \alpha x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Υπόδειξη. Έχουμε υποθέσει ότι η f ικανοποιεί την $f(x+y) = f(x) + f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Παίρνοντας $x = y = 0$ μπορείτε να ελέγξετε ότι $f(0) = 0$. Κατόπιν, για δοσμένο $x \in \mathbb{R}$, παίρνοντας $y = -x$ μπορείτε να ελέγξετε ότι $f(-x) = -f(x)$.

(α) Χρησιμοποιώντας επαγωγή δείχνουμε ότι

$$(*) \quad f(x_1 + \dots + x_m) = f(x_1) + \dots + f(x_m)$$

για κάθε $m \in \mathbb{N}$ και για κάθε $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$. Παίρνοντας $m = n$ και $x_1 = \dots = x_n = 1$ βλέπουμε ότι $f(n) = n\alpha$.

(β) Πάρτε $x_1 = \dots = x_m = \frac{1}{m}$ στην (*).

(γ) Θεωρήστε πρώτα $q \in \mathbb{Q}$, $q > 0$. Γράψτε τον q στη μορφή $\pm(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n})$ - για κατάλληλο πλήθος προσθετέων - και χρησιμοποιήστε το (β) για να δείξετε ότι $f(q) = \alpha q$. Αν $q < 0$ το ζητούμενο έπεται από την $f(-x) = -f(x)$.

Έστω τώρα $x \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε ακολουθία ρητών αριθμών $q_n \rightarrow x$. Αφού η f είναι συνεχής, από την αρχή της μεταφοράς παίρνουμε

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha q_n) = \alpha x.$$

50. Μελετήστε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν } x \notin \mathbb{Q} \text{ ή } x = 0 \\ \frac{1}{q} & \text{αν } x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}, \text{ΜΚΔ}(p, q) = 1. \end{cases}$$

Υπόδειξη. Δείχνουμε πρώτα ότι αν ο $x \in (0, 1]$ είναι ρητός, οπότε γράφεται στη μορφή $x = \frac{p}{q}$ όπου $p, q \in \mathbb{N}$ με $\text{ΜΚΔ}(p, q) = 1$, τότε η f είναι ασυνεχής στο σημείο x . Πράγματι, υπάρχει ακολουθία αρρήτων αριθμών $\alpha_n \in [0, 1]$ με $\alpha_n \rightarrow x$. Τότε, $f(\alpha_n) = 0 \rightarrow 0 \neq \frac{1}{q} = f(x)$, και το συμπέρασμα έπεται από την αρχή της μεταφοράς.

Έστω τώρα ότι ο $x \in [0, 1]$ είναι άρρητος και έστω $\varepsilon > 0$. Θέτουμε $M = M(\varepsilon) = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ και $A(\varepsilon) = \{y \in [0, 1] : f(y) \geq \varepsilon\}$. Αν ο y ανήκει στο $A(\varepsilon)$ τότε είναι ρητός ο οποίος γράφεται στη μορφή $x = \frac{p}{q}$ όπου $p, q \in \mathbb{N}$, $p \leq q$ και $f(y) = \frac{1}{q} \geq \varepsilon$. Το πλήθος αυτών των αριθμών είναι το πολύ ίσο με το πλήθος των ζευγαριών (p, q) φυσικών αριθμών όπου $q \leq M$ και $p \leq q$. Επομένως, δεν ξεπερνάει τον $M(M+1)/2$. Δηλαδή, το $A(\varepsilon)$ είναι πεπερασμένο σύνολο. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε $A(\varepsilon) = \{y_1, \dots, y_m\}$ όπου $m = m(\varepsilon) \in \mathbb{N}$.

Αφού ο x είναι άρρητος, ο x δεν ανήκει στο $A(\varepsilon)$. Άρα, ο αριθμός $\delta = \min\{|x - y_1|, \dots, |x - y_m|\}$ είναι γνήσια θετικός. Έστω $z \in [0, 1]$ με $|z - x| < \delta$. Τότε, $z \notin A(\varepsilon)$ άρα $f(z) < \varepsilon$. Αφού $f(x) = 0$, έπεται ότι $0 \leq f(z) = f(z) - f(x) < \varepsilon$. Το $\varepsilon > 0$ ήταν τυχόν, άρα η f είναι συνεχής στο σημείο x .

Τέλος, δείξτε ότι η f είναι συνεχής στο σημείο 0.

51. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Υποθέτουμε ότι η f είναι συνεχής στο 0 και ότι $f(x/2) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι η f είναι σταθερή.

Υπόδειξη. Έστω $x \neq 0$. Χρησιμοποιώντας την υπόθεση (και με επαγωγή) δείχνουμε ότι

$$f(x) = f(x/2) = f(x/2^2) = \dots = f(x/2^n)$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Έχουμε $\frac{x}{2^n} \rightarrow 0$ και η f είναι συνεχής στο 0. Από την αρχή της μεταφοράς, $f(x/2^n) \rightarrow f(0)$. Αφού $f(x) = f(x/2^n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, η ακολουθία $(f(x/2^n))$ είναι σταθερή, με όλους τους όρους της ίσους με $f(x)$. Έπεται ότι $f(x) = f(0)$ και, αφού το $x \neq 0$ ήταν τυχόν, η f είναι σταθερή.

52. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $f(\frac{m}{2^n}) = 0$ για κάθε $m \in \mathbb{Z}$ και $n \in \mathbb{N}$. Δείξτε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Υπόδειξη. Έστω $x \in \mathbb{R}$. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, ο ακέραιος $m_n = \lfloor 2^n x \rfloor$ ικανοποιεί την $m_n \leq 2^n x < m_n + 1$. Άρα,

$$\frac{m_n}{2^n} \leq \frac{2^n x}{2^n} = x < \frac{m_n + 1}{2^n} = \frac{m_n}{2^n} + \frac{1}{2^n}.$$

Δηλαδή, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{2^n}$. Από την αρχή της μεταφοράς,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{m_n}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

53. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την ιδιότητα $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και κάθε $n \in \mathbb{N}$. Δείξτε ότι η f είναι σταθερή.

Υπόδειξη. Από την υπόθεση έπεται ότι $f(0) = f(\frac{m}{n})$ για κάθε $m \in \mathbb{Z}$ και κάθε $n \in \mathbb{N}$ (εξηγήστε γιατί). Έστω $x \in \mathbb{R}$. Αν $m_n(x) = \lfloor nx \rfloor$, τότε $m_n(x) \in \mathbb{Z}$ και $m_n(x) \leq nx < m_n(x) + 1$. Άρα,

$$\frac{m_n(x)}{n} \leq x < \frac{m_n(x)}{n} + \frac{1}{n}.$$

Παρατηρήστε ότι $f\left(\frac{m_n(x)}{n}\right) = f(0)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και ότι $x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n(x)}{n}$. Από τη συνέχεια της f στο σημείο x συμπεραίνουμε ότι

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{m_n(x)}{n}\right) = f(0).$$

Το x ήταν τυχόν, άρα η f είναι σταθερή.

54. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτησης. Ορίζουμε $A = \{x \in [a, b] : f(x) = 0\}$. Αν $A \neq \emptyset$, δείξτε ότι $\sup A \in A$ και $\inf A \in A$.

Υπόδειξη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακολουθία (x_n) στο A με $x_n \rightarrow \sup A$. Η f είναι συνεχής, άρα $f(x_n) \rightarrow f(\sup A)$ από την αρχή της μεταφοράς. Όμως $x_n \in A$, άρα $f(x_n) = 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Έπεται ότι $f(\sup A) = 0$, δηλαδή $\sup A \in A$.

Με παρόμοιο τρόπο δείχνουμε ότι $\inf A \in A$.

55. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T > 0$: δηλαδή, $f(x+T) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ ώστε $f(x) = f(x + \sqrt{2})$.

Υπόδειξη. Η f παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή στο κλειστό διάστημα $[0, T]$. Δηλαδή, υπάρχουν $x_1, x_2 \in [0, T]$ ώστε $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ για κάθε $x \in [0, T]$. Αφού η f είναι περιοδική με περίοδο T , μπορούμε να ελέγξουμε ότι η ανισότητα

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (χρησιμοποιήστε το γεγονός ότι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ υπάρχει $k \in \mathbb{Z}$ ώστε $x+kT \in [0, T]$, και από την περιοδικότητα της f , $f(x) = f(x+kT)$).

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(x) - f(x + \sqrt{2})$. Τότε, $g(x_1) = f(x_1) - f(x_1 + \sqrt{2}) \leq 0$ και $g(x_2) = f(x_2) - f(x_2 + \sqrt{2}) \geq 0$. Χρησιμοποιώντας το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, βρίσκουμε x ανάμεσα στα x_1 και x_2 ώστε $g(x) = 0$, δηλαδή $f(x) = f(x + \sqrt{2})$.

56. Έστω $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτησης. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν $a < b$ και ακολουθίες (x_n) , (y_n) στο $[0, +\infty)$ με $x_n \rightarrow +\infty$, $y_n \rightarrow +\infty$ και $f(x_n) \rightarrow a$, $f(y_n) \rightarrow b$. Δείξτε ότι: για κάθε $c \in (a, b)$ υπάρχει ακολουθία (z_n) στο $[0, +\infty)$ με $z_n \rightarrow +\infty$ και $f(z_n) \rightarrow c$.

Υπόδειξη. Έστω $c \in (a, b)$. Αφού $x_n \rightarrow +\infty$, $y_n \rightarrow +\infty$ και $f(x_n) \rightarrow a$, $f(y_n) \rightarrow b$, μπορούμε να βρούμε γνησίως αύξουσα ακολουθία φυσικών (k_n) ώστε:

$$(*) \quad x_{k_n} > n, y_{k_n} > n \text{ και } f(x_{k_n}) < c < f(y_{k_n}).$$

Δείξτε το επαγωγικά. Για το επαγωγικό βήμα παρατηρήστε ότι όλοι τελικά οι όροι των (x_m) , (y_m) ικανοποιούν καθεμιά από τις $x_m > n+1$, $y_m > n+1$, $f(x_m) < c < f(y_m)$ (εξηγήστε γιατί) άρα υπάρχει $k_{n+1} > k_n$ ώστε να ισχύουν όλες μαζί για τους $x_{k_{n+1}}$, $y_{k_{n+1}}$.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, βρίσκουμε z_n ανάμεσα στα x_{k_n} και y_{k_n} ώστε $f(z_n) = c$. Επιπλέον, αφού $x_{k_n}, y_{k_n} > n$, έχουμε $z_n > n$. Συνεπώς, $z_n \rightarrow +\infty$ και $f(z_n) = c \rightarrow c$.

57. Έστω $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ και $x_0 \in (a, b)$. Δείξτε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 αν και μόνο αν για κάθε μονότονη ακολουθία (x_n) σημείων του (a, b) με $x_n \rightarrow x_0$ ισχύει $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Υπόδειξη. (\Leftarrow) Ας υποθέσουμε ότι η f δεν είναι συνεχής στο x_0 . Υπάρχει $\varepsilon > 0$ ώστε: για κάθε $n \in \mathbb{N}$ μπορούμε να βρούμε μονότονη ακολουθία $y_n \in (a, b)$ ώστε $y_n \rightarrow x_0$ και $|f(y_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$. Αυτό δικαιολογείται ως εξής: αν έχουμε βρει τον x_n , παρατηρούμε ότι αναγκαστικά $x_n \neq x_0$ και επιλέγουμε x_{n+1} ώστε $|x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$, $|x_{n+1} - x_0| < \frac{1}{n+1}$ και $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| \geq \varepsilon$. Τότε, η ακολουθία $(|x_n - x_0|)$ είναι γνησίως φθίνουσα και συγκλίνει στο 0. Αν άπειροι όροι της (x_n) είναι μικρότεροι από τον

x_0 , η ακολουθία (y_n) αυτών των όρων είναι γνησίως αύξουσα και συγκλίνει στο x_0 , οπότε ικανοποιεί τον ισχυρισμό. Αν όχι, υπάρχουν άπειροι όροι της (x_n) που είναι μεγαλύτεροι από τον x_0 και η ακολουθία που σχηματίζουν είναι γνησίως φθίνουσα και συγκλίνει στον x_0 .

Τέλος, από την $|f(y_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$ έχουμε $f(y_n) \not\rightarrow f(x_0)$. Αυτό είναι άτοπο από την υπόθεση.

Η κατεύθυνση (\Rightarrow) προκύπτει άμεσα από την αρχή της μεταφοράς.

58. (α) Έστω $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Αν $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a + t_n) = L$ για κάθε γνησίως φθίνουσα ακολουθία (t_n) με $t_n \rightarrow 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

(β) Σωστό ή λάθος; Έστω $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Αν $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a + \frac{1}{n}) = L$ τότε $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Υπόδειξη. (α) Με απαγωγή σε άτοπο: αν δεν ισχύει η $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, τότε υπάρχει $\varepsilon > 0$ με την εξής ιδιότητα: για κάθε $\delta > 0$ υπάρχει $x \in (a, +\infty)$ με $a < x < a + \delta$ και $|f(x) - L| \geq \varepsilon$. Εφαρμόζοντας το παραπάνω με $\delta = 1$ βρίσκουμε $x_1 \in (a, +\infty)$ με $a < x_1 < a + 1$ και $|f(x_1) - L| \geq \varepsilon$. Εφαρμόζοντας το παραπάνω με $\delta = \min\{1/2, x_1 - a\}$ βρίσκουμε $x_2 < x_1$ με $a < x_2 < a + \frac{1}{2}$ και $|f(x_2) - L| \geq \varepsilon$. Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, ορίζουμε γνησίως φθίνουσα ακολουθία $t_n = x_n - a$ με $t_n \rightarrow 0$ και $|f(a + t_n) - L| \geq \varepsilon$. Αυτό είναι άτοπο.

(β) *Λάθος.* Θεωρήστε τη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ που παίρνει την τιμή 1 στα σημεία $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ και την τιμή 0 σε όλα τα άλλα σημεία. Το $\lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n) = 1$, όμως το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ δεν υπάρχει.

59. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως αύξουσα συνάρτηση. Υποθέτουμε ότι η f είναι συνεχής σε κάποιο $x_0 \in (a, b)$. Δείξτε ότι το $f(x_0)$ είναι σημείο συσσώρευσης του $f([a, b])$.

Υπόδειξη. Θεωρούμε γνησίως αύξουσα ακολουθία (x_n) στο (a, b) με $x_n \rightarrow x_0$. Τέτοια ακολουθία υπάρχει, διότι το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του (a, b) . Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $f(x_n) < f(x_0)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, και αφού η f είναι συνεχής στο x_0 , η αρχή της μεταφοράς δείχνει ότι $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. Η ακολουθία $(f(x_n))$ έχει όρους στο $f([a, b])$, όλοι της οι όροι είναι διαφορετικοί από το $f(x_0)$ και $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. Από τον ακολουθιακό χαρακτηρισμό του σημείου συσσώρευσης συνόλου, το $f(x_0)$ είναι σημείο συσσώρευσης του $f([a, b])$.

60. Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με την ιδιότητα $|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Δείξτε ότι η f είναι επί.

Υπόδειξη. Από την υπόθεση, αν $f(x) = f(y)$ έχουμε $0 = |f(x) - f(y)| \geq |x - y|$, άρα $x = y$. Δηλαδή, η f είναι 1-1. Έπεται ότι η f είναι γνησίως μονότονη.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. Τότε, αν $x > 0$ έχουμε $f(x) - f(0) = |f(x) - f(0)| \geq x$, δηλαδή

$$f(x) \geq f(0) + x, \quad x > 0.$$

Όμοια, αν $x < 0$ έχουμε $f(0) - f(x) = |f(x) - f(0)| \geq |x| = -x$, δηλαδή

$$f(x) \leq f(0) + x, \quad x < 0.$$

Από τις παραπάνω σχέσεις έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής έπεται ότι η f είναι επί (εξηγήστε γιατί).

61. Έστω $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ συνεχείς συναρτήσεις. Υποθέτουμε ότι η f είναι αύξουσα και $g \circ f = f \circ g$. Δείξτε ότι οι f και g έχουν κοινό σταθερό σημείο: υπάρχει $y \in [0, 1]$ ώστε $f(y) = y$ και $g(y) = y$. [Υπόδειξη: Ξέρουμε ότι υπάρχει $x_1 \in [0, 1]$ με $g(x_1) = x_1$. Αν ισχύει και η $f(x_1) = x_1$, έχουμε τελειώσει. Αν όχι, θεωρήστε την ακολουθία $x_{n+1} = f(x_n)$, δείξτε ότι είναι μονότονη και ότι όλοι οι όροι της είναι σταθερά σημεία της g . Το όριό της θα είναι κοινό σταθερό σημείο των f και g (γιατί;).]

Υπόδειξη. Από το θεώρημα σταθερού σημείου (δείτε και την Άσκηση 8) γνωρίζουμε ότι υπάρχει $x_1 \in [0, 1]$ ώστε $g(x_1) = x_1$. Ορίζουμε αναδρομικά μια ακολουθία (x_n) στο $[0, 1]$ θέτοντας $x_{n+1} = f(x_n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Παρατηρήστε ότι $g(x_n) = x_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Πράγματι, αυτό ισχύει για $n = 1$ και αν $g(x_m) = x_m$ τότε, χρησιμοποιώντας την $f \circ g = g \circ f$ έχουμε

$$g(x_{m+1}) = g(f(x_m)) = (g \circ f)(x_m) = (f \circ g)(x_m) = f(g(x_m)) = f(x_m) = x_{m+1}.$$

Αν για κάποιο $n \in \mathbb{N}$ έχουμε $f(x_n) = x_n$ τότε το x_n είναι κοινό σταθερό σημείο των f και g .

Υποθέτουμε λοιπόν ότι $x_{n+1} = f(x_n) \neq x_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Ειδικότερα, $x_2 = f(x_1) \neq x_1$. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας υποθέτουμε ότι $x_2 > x_1$ (αν $x_2 < x_1$ δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο). Τότε, $x_3 = f(x_2) > f(x_1) = x_2$ (γιατί η f είναι αύξουσα και έχουμε υποθέσει ότι $x_{n+1} \neq x_n$ για κάθε n). Επαγωγικά δείχνουμε ότι η (x_n) είναι γνησίως αύξουσα. Αφού $x_n \leq 1$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, έπεται ότι $x_n \rightarrow x_0$ για κάποιο $x_0 \in [0, 1]$. Η συνέχεια της f στο x_0 δείχνει ότι

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x_0.$$

Από την άλλη πλευρά, η συνέχεια της g στο x_0 δείχνει ότι

$$g(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

Άρα, το x_0 είναι κοινό σταθερό σημείο των f και g .

62. Έστω $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με την εξής ιδιότητα: για κάθε $x_0 \in [a, b]$ υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Τότε, η f είναι φραγμένη.

Υπόδειξη. Από την υπόθεση, για κάθε $x_0 \in [a, b]$ υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Άρα, υπάρχουν $\delta_{x_0} > 0$ και $M_{x_0} > 0$ ώστε $|f(x)| \leq M_{x_0}$ για κάθε $x \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0}) \cap [a, b]$ (εφαρμόστε τον ορισμό του ορίου με $\varepsilon = 1$). Τώρα, μπορείτε να μιμηθείτε την απόδειξη του βασικού θεωρήματος ότι «κάθε συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού κλειστό διάστημα είναι φραγμένη».